

## Iris graminea (Kosatec trávovitý)

synonyma: Chamaeiris graminea, Chamaeiris graminea subsp. pseudocyperus, Iris adamii, Iris bayonnensis, Iris compressa, I. subsp. sylvatica, I. var. bayonnensis, I. var. latifolia, I. var. pseudocyperus, I. var. sylvatica, Iris lamprophylla, Iris nikitensis, Iris pseudocyperus, Iris pseudograminea, Iris suavis, Iris sylvatica, Limniris graminea, Xiphion gramineum, Xyridion gramineum

čeleď: Iridaceae

oblasti: Bulharsko, Česká republika, Dagestán, Francie, Gruzie, Itálie, Jugoslávie, Krym, Maďarsko, Malá Asie (Anatolie), Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Z Rusko

Roste od Španělska po západní Rusko. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 30 (i 60)cm. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Lodyha je 2řízně zploštělá až 2křídla a je kratší než přízemní listy. Listy jsou čárkovité až úzce kopinaté, dlouhé (0,3 -) 0,35 - 0,7 (i 1)m, široké 0,5 - 1,5cm, po odkvětu rozprostřené po zemi. Kvete modře růžově fialovými aromatickými květy po 1 - 10ti ks o průměru 8cm s bílými žilkami, vnější korunní lístky jsou vejčité, zakulacené, dlouhé 3 - 5cm, na bázi uprostřed bílé, vnitřní lístky jsou dlouhé 2 - 5cm a na bázi hnědé. Plodem je tobolka délky 3 - 4cm obsahující hruškovitá semena. Vydává meruňkové aroma. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Achterhoffii'
- 'Adami'
- 'Colchica'
- 'Graminea Lamprophylla'
- 'Graminea Sylvatica'
- 'Graminea Latifolia'
- 'Gravenia'
- 'Hort's Variety'
- 'Pseudocyperus'

Vyhovují mu sušší až vlhké trávníky, křovité stráně, louky a pastviny v polostínu s dobře propustnou půdou s neutrálním až mírně kyselým pH. Odolává teplotám do -20°C.

Množí se dělením nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>