

# Furcraea foetida

synonyma: *Agave commelyni*, *Agave foetida*, *Agave gigantea*, *Agave madagascariensis*, *Aloe foetida*, *Fourcroya gigantea*, *Funium piliferum*, *Furcraea atroviridis*, *Furcraea barillettii*, *Furcraea commelyni*, *Furcraea gigantea*, *Furcraea gigantea* var. *mediopicta*, *Furcraea madagascariensis*, *Furcraea viridis*, *Furcraea watsoniana*

čeleď: Asparagaceae

oblasti: Afrika, Asie, Brazílie, Florida, Guyana, Havajské ostrovy, Indický oceán, Jižní Amerika, JV USA, Kanárské ostrovy, Kapverdy, Karibik, Makaronésie, Maskarény, Pakistán, Polynésie, Réunion, S Jižní Amerika, Severní Amerika, Střední Amerika, Střední Asie, Střední Severní Amerika, SZ Afrika, Tichý oceán, USA, V Jižní Amerika

Roste v Karibiku a na severu Jižní Ameriky. Patří mezi stálezelené sukulentní trvalky a polokeře. Stonek buď není, nebo je pouze velmi krátký. Listy jsou tuhé, mečovité, špičaté, zvlněné, světlezelené, na vrchní straně hladké, na spodní mírně drsné, dlouhé 1 - 1,8 (i 2,4)m, široké 10 - 15 (i 20)cm, při bázi 6 - 7 (i 10)cm. Kvete zelenavými až béžovými květy délky 4cm a 6ti okvětními lístky o délce 2,5 - 3,3cm a šířce 1 - 1,4 (i 1,8)cm v až 7,5 (i 12)m pyramidální latě. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var.  
mediopicta
- béžově pruhy na listech

Vyhovují jí skály, útesy, svahy, pastviny, atp. s dobře propustnou půdou a plným sluncem nebo polostínem. Odolává krátkodobému suchu a dolává mrazům -4 až -7°C.

Množí se pacibulkami nebo semeny.

<http://www.rostliny.net/>