

Beaumontia

čeleď: Apocynaceae

Jedná se o polostálezelené stromy nebo vysoké popínavé keře pocházejících z Himálaje a indomalajsie. Větve při poranění roní lepkavou mizu. Listy jsou velké, křížmostojné, párovité, kožovité. Kvete velkými bílými aromatickými květy s laločnatými korunními lístky ve vrcholcích. Plodem je měchýřek.

Minimální teplota pěstování je 7 - 10°C. Potřebuje dobře propustnou půdu a plné světlo.

Množí se semeny nebo polodřevitými řízkami.

Beaumontia brevituba

oblasti: Guangxi, Hainan

Roste v Číně v provinciích Guangxi a Hainan v podobě liány. Dorůstá délky až 12m. Mladé větve jsou světležluté nebo šedé, ochlupené, později olysávají. Listy jsou úzce bovejšité, báze klinovitá, vrchol špičatý až ocasovitý, délka dosahuje 7 - 25cm a šířka 3 - 11cm. Řapíky mají délku 1 - 3cm. Kvete ve vrcholcích o délce 13 - 22cm tvořeném 3 - 6ti květy. Mají stopky délky až 6cm, okvětní lístky jsou světležluté, široce eliptické až obvejčité, bílé, dlouhé 4 - 5,5cm a široké 3,5 - 5cm. Květy mají v průměru 12cm a trubka je dlouhá 6 - 8,5cm. Plodem je měchýřek délky 16cm, průměru 4cm a obsahuje 1,5cm hnědá semena.

Beaumontia grandiflora

synonyma: *B. longifolia*

oblasti: Bangladéš, Bhútán, Guangxi, Indie, Laos, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Thajsko, V Himálaj, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně, Bangladéši, Myanmaru, Indii, Laosu, Bhútánu, Nepálu, Thajsku a Vietnamu v podobě stálezelené dřevité liány o délce až 6 (i 20)m. Větve jsou tmavěhnědé, rezavě ochlupené. Listy jsou vstřícné, úzce obvejčité až široce eliptické, zašpičatělé, v mládí ochlupené, tmavězelené, dlouhé (10 -) 15 - 30cm, široké 7 - 18cm, žilnatinu tvoří 8 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,25 - 2,5 (i 3)cm. Kvete v 3 - 19tičetných vrcholcích, listeny jsou světlezelené, stopky mají délku 2,5 - 4,5cm, kališní lístky jsou obkopinaté, ochlupené, dlouhé 3,5cm, často tmavěčervené nebo hnědočervené, zvonkovitá koruna má délku 7,5 - 12,5 (i 15)cm, korunní lístky jsou bílé, béžové nebo světležluté, v počtu 5ks, laloky jsou dlouhé 2,5cm, zašpičatělé, trubka má délku 6,5 - 13cm a okraj má v průměru pouze 1cm. Plodem je měchýřek délky 22 - 31cm, průměru 5 - 6cm a obsahuje mnoho zploštělých semen.

Beaumontia jerdoniana

Beaumontia khasiana

synonyma: *B. shanica*, *B. yunnanensis*

oblasti: Indie, Myanmar (Barma), Střední Asie, Yunnan

Roste v jihozápadním Yunnanu, Indii a Myanmaru v podobě liány. Dorůstá délky až 15m. Větve jsou hustě hnědě ochlupené. Listy jsou eliptické až obvejčité, řídce ochlupené, olysávají, spodní strana je samatová, celková délky 8 - 25cm a šířka 5 - 14cm. Řapíky mají délku 1 - 4cm. Kvete v 9 - 13tičetném ochlupeném vrcholíku o velikosti 13 - 20cm. Květy vyrůstají na 3,5 - 6cm stopkách, mají bílou barvu, trubku délky 1 - 2,7cm, zvonkovitý tvar s široce vejčitými laloky délky 2,5 - 4cm. Semeníky jsou ochlupené.

Beaumontia longituba

Beaumontia macrantha

synonyma: *B. rosea*, *Muantum roseum*, *Vallaris macrantha*

Beaumontia multiflora

synonyma: *B. campanulata*

Beaumontia murtonii

synonyma: *B. fragrans*

oblasti: Čína, Kambodža, Laos, Malajsie, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Kambodži, Laosu, Malajsii, Thajsku a Vietnamu v podobě stálezelené dřevnaté liány. Dorůstá délky až 20m. Mladé větve jsou světlešedé nebo tmavěhnědé, bývají rezavě ochlupené a olysávají. Listy mají úzce obvejčitý až široce eliptický tvar, žilnatinu tvoří 11 - 18 párů žilek, mají délku 10 - 30cm a šířku 3 - 15cm. Řapíky mají délku 1 - 3cm. Kvete v 6 - 12tičetném vrcholíku na 3 - 5cm stopkách. Květy jsou bílé, široce zvonkovité, trubka má délku 4 - 6,5cm, lem je široký 5,5cm a jeho laloky mají délku 1,9 - 3cm. Plodem je kulatý měchýřek délky 1,4 - 1,8cm a šířky 3 - 5cm. Obsahuje úzce eliptická semena délky 2cm.

Beaumontia pitardii

synonyma: *B. campanulata*

oblasti: Guangxi, Vietnam, Yunnan

Roste v jižním Yunnanu a Vietnamu v podobě liány.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1599>

<https://www.rostliny.net/>