

Abrus precatorius (Soterek obecný)

synonyma: Abrus abrus, Abrus cyaneus, Abrus maculatus, Abrus minor, Abrus pauciflorus, A. var. novo-guineensis, Abrus squamulosus, Abrus tunguensis, Glycine abrus

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Austrálie, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Indie, Jemen, JV Asie, Pákistán, Portoriko, Srí Lanka, Tropická Afrika

Roste v tropické Asii, Americe a Africe. Jedná se o popínavou bylinnou liánu. Stonek je větvený, holý (i řídce bíle ochlupený). Palisty jsou čárkovité, dlouhé 3,5 - 6mm. Listy jsou střídavé, sudozpeřené, dlouhé 5 - 10cm, řapíky dlouhé 0,6 - 1,2cm, tvoří je 8 - 13 (i 20)ti párů lístků, vlastní lístky jsou eliptické, dlouhé 1 - 2cm, široké 0,4 - 0,8cm a krátce řapíčkaté. Květenstvím je 3 - 8cm dlouhý hrozen, vlastní květy mají zvonkovitý drobně 4zubý kalich délky 2,5mm, koruna je světle růžovofialová a pavéza dlouhá 1cm. Plodem je lusk délky 2 - 3,5 (i 4,2)cm obsahující (2 -) 3 - 5 (i 6) eliptických, lesklých semen červené barvy délky 7 - 8mm s černým koncem na straně stopky.

Vyskytuje se v křovinách, okrajích toků, polí, cest, atp. v narušené půdě.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>