

Acoelorrhaphe

synonyma: Acoelorrhaphe

čeleď: Arecaceae

Existuje pouze 1 druh.

Acoelorrhaphe wrightii

synonyma: Acanthosabal caespitosa, A. arborescens, Acoelorrhaphe arborescens, Acoelorrhaphe pinetorum, Acoelorrhaphe wrightii f. inermis, Acoelorrhaphe wrightii var. novogeronensis, Brahea psilocalyx, Copernicia wrightii, Paurotis androsana, Paurotis arborescens, Paurotis psilocalyx, Paurotis schippii, Paurotis wrightii, Serenoa arborescens

oblasti: Belize, Florida, Guatemala, Honduras, JV Mexiko, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Nikaragua

Roste v trsech ve střední Americe na jihovýchodě Mexika, v Karibiku, na Bahamách a jižní Floridě. Dorůstá výšky 5 - 7 (i 9)m a šířky i 8m. Vytváří 2 - 15 nebo i více kmínků pokrytých prstencovými jizvami po odumřelých listech. Mají v průměru 5 - 15cm. Koruna je tvořená z 10 - 16ti listů. Listy jsou dlانيتě dělené, světlezelené, čepele dlouhé 0,6 - 0,9 (i 2)m, spojené do 1/2 jejich délky, na spodní straně stříbřité, řapík má oranžovou barvu, ostře zubaté okraje a délku 1 - 1,2m. Báze je tvořená hustým tmavěhnědými vlákny. Kvete v až 1m vzpřímeném květenství přesahujících délkou i listy a vlastní květy jsou bílobéžové. Plody jsou oranžové, přecházejí do černé, velikosti 0,5 - 1,2cm.

Potřebuje pravidelně zaplavovaná místa, teplo a plné slunce (snáší i polostín). Substrát by měl být neutrální nebo slabě kyselý, těžký nebo písčité, ale určitě bohatý na živiny. Toleruje i zasolené půdy a vítr.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=764>

<https://www.rostliny.net/>