

Acnistus

čeleď: Solanaceae

Acnistus arborescens

synonyma: A. aggregatus, A. benthamii, A. campanulatus, A. cauliflorus, A. cerasus, A. floccosus, A. floribundus, A. geminifolius, A. grandiflorus, A. guayaquilensis, A. lehmannii, A. macrophyllus, A. miersii, A. plumieri, A. pringlei, A. punctatus, A. ramiflorus, A. sideroxyloides, A. virgatus, Atropa arborea, Atropa arborescens, Atropa sideroxyloides, Atropa solanacea, Brachistus oblongifolius, Brachistus physocalycius, Brachistus riparius, Capsicum oblongifolium, Cestrum campanulatum, Cestrum caulinorum, Cestrum kohauti, Cestrum macrostemon, Dunalia arborescens, Dunalia arborescens var. campanulata, Dunalia campanulata, Dunalia macrophylla, Ephaiola odorata, Eplateia arborescens, Fregirardia riparia, Lycium aggregatum, Lycium arborescens, Lycium guayaquilense, Lycium macrophyllum, Lycium ovale, Pederlea aggregata, Pederlea arborescens, Pederlea cestroides

oblasti: Jižní Amerika, Portoriko

Roste v podobě nižšího stromu nebo keře. Dorůstá výšky až 10m. Střídavé jednoduché eliptické listy mají bázi úzkou nebo do V, zúženou na konci, okraj může být zvlněný, na délku mají 15 - 30cm a na šířku 5 - 15cm. Ochlupené jsou pouze v mládí, podobně jako stonky. Kvete v hroznech pod listy. Květní trubka je dlouhá 1cm. Svým vzhledem se podobá malému durmanu.

<https://www.rostliny.net/>