

Jasminum nudiflorum (Jasmín nahokvětý)

čeleď: Oleaceae

oblasti: Francie, Gansu, Georgia, Japonsko, Maryland, Německo, New Jersey, Shaanxi, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Tibetu, Číně a Japonsku v podobě opadavého poléhavé keře s rozložitým metlovitým habitem. Dorůstá výšky 1 - 1,8 (i 3)m a šířky 1,5m. Větve jsou převislé, hranaté, zelené, délky 0,3 - 3 (i 5)m a mohou se i pnout. Listy jsou vstřícné, zelené, řapíkaté, 3četné nebo jednoduché, řapíky dlouhé 0,3 - 1cm, vlastní listy jsou pak eliptické, obkopinaté až vejčité (i prakticky kulaté), tmavězelené, dlouhé 0,7 - 2,2 (i 3), široké 0,4 - 1,3cm, lístky vejčité až podlouhlé (i obvejčité), báze klínovitá, centrální lístek dlouhý 1 - 3cm, široký 0,3 - 1,1cm, postranní dlouhé 0,6 - 2,3cm, široké 0,2 - 1,1cm a spodní strana je světlezelená. Kvete samostatnými nevonnými žlutými květy o průměru 1,5 - 3cm s trubkovitou korunou na 2 - 3mm stopce, kalich je zelený s 5 - 6ti kopinatými laloky délky 4 - 6mm, koruna žlutá, trubka dlouhá 0,8 - 2cm a má 5 - 6 laloků délky 0,8 - 1,3cm. Plody jsou vejčité nebo eliptické, dlouhé 6mm a široké 3 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. aureum - květy zlatožluté
- 'Aureum' - listy žluté
- 'Mystique' - listy se stříbrobílými okraji
- 'Nanum' - zakrslý kompaktní pomalu rostoucí habitus
- var. nudiflorum/J. angulare/J. sieboldianum - Gansu, Sichuan, Shaanxi, Xizang a Yunnan; vzpřímený nebo plazivý habitus; délka 0,3 - 5m; větve v mládí hranaté, mírně křídlaté; květy mají trubku délky 0,8 - 2cm; plody eliptické, dlouhé 6mm, široké 3mm
- var. pulvinatum/J. pulvinatum - Sichuan, Xizang, Yunnan; keř; výška 0,3 - 1,2m; větve bohaté, propletené, na vrcholu bezlisté, později přecházející v trny; květy mají trubku koruny délky 0,8 - 1,4cm; plody vejčité na max. 1,5cm stopce, dlouhé 6mm a široké 3 - 4mm

Vyhovují mu křovinaté svahy a horské rokle. Dokáže u nás růst i venku, při tužších zimách větve namrzají, ale dobře regeneruje. Sází se na plné slunce. Na půdu není náročný, ideální je propustná, hlinitopísčítá a bohatá na živiny s neutrálním pH. Pro bohaté kvetení je nutný každoroční silný řez prováděný na jaře po odkvětu.

Množí se řízkováním a odkopky.

<https://www.rostliny.net/>