

Adenanthera

čeleď: Fabaceae

Rostou v tropické Asii a na ostrovech Tichého oceánu v podobě beztrnných opadavých stromů. Palisty jsou malé a opadavé. Listy jsou 2x zpeřené a vyrůstají ve spirále. Vlastní lístky jsou téměř vstřícné. Kvete v hroznu nebo latě bílými nebo nažloutlými oboupohlavnými nebo mnohomanželnými květy na krátké stopce. Kalich je zvonkovitý, krátce 5tízubý, tvořený 5ti okvětními lístky. Plodem je rovný, srpovitý nebo zkroucený, řemenovitý nebo čárkovitý kožený zaškrcovaný lusk.

Adenanthera abrosperma

synonyma: *A. abrosperma* var. *falcata*

oblasti: Austrálie, Queensland, SV Austrálie

Roste jako endemit Queenslandu v podobě stromu o výšce 5 - 14m. Mladé větve mohou být ochlupené. Zpeřené listy jsou tvořeny 2 - 5ti páry primárních dílů. Lístky vyrůstají po 6 - 16ti, jsou téměř vstřícné, podlouhlého oválného nebo obvejčitého tvaru délky 0,8 - 3,5cm a šířky 0,4 - 1,5cm. Kvete v klasu o délce 4 - 8cm. Květy jsou téměř přisedlé, béžové, později žlutooranžové, okvětní lístky jsou dlouhé 2 - 3,5mm. Plodem je čárkovitý rovný nebo zakřivený dřevitý lusk délky až 15cm a šířky 1 - 2cm. Obsahuje černá semena.

Adenanthera aglaosperma

Adenanthera bicolor

oblasti: Asie, J Asie, Srí Lanka, Střední Asie

Roste na Srí Lance.

Adenanthera borneensis

oblasti: Asie, Borneo, Indonésie, JV Asie, Malesie, Velké Sundy

Adenanthera forbesii

Adenanthera intermedia

synonyma: *Mimosa pavonina*, *Mimosa punctata*, *Mimosa virgata*

oblasti: Asie, Filipíny, JV Asie, Malesie

Roste na Filipínách.

Adenanthera kostermansii

Adenantha malayana

Adenantha mantaroa

Adenantha marina

Adenantha microsperma

synonyma: *A. microsperma* var. *luteoseminalis*, *A. pavonina* var. *luteoseminalis*, *A. pavonina* var. *microsperma*, *A. tamarindifolia*

oblasti: Asie, Čína, Indočína, Indonésie, JV Asie, Kambodža, Laos, Malajsie, Malesie, V Asie, Vietnam

Roste v Číně, Kambodži, Indonésii, Laosu, Malajsii, Thajsku a Vietnamu v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 5 - 20m. Mladé větve jsou krátce ochlupené. Ochlupené jsou i řapíky. Zpeřené listy tvoří 3 - 5 primárních párů. Lístky jsou střídavé a ve 4 - 7 párech, mají malé řapíky, čepel podlouhlou až vejčitou, z obou stran drobně ochlupenou, délku 2,5 - 3,5cm a šířku 1,5 - 2,5cm. Kvete v jednoduchých horznech v paždí listů nebo latnatě na koncích větví. Květy jsou bílé nebo žluté, mají krátkou stopku a okvětní lístky délky 2,5 - 3,5mm. Plodem je úzký podlouhlý lusk délky 10 - 20cm a šířky 1,2 - 1,4cm. Obsahuje kulatá až eliptická semena délky 5 - 8mm a šířky 4 - 7mm.

Adenantha novo-guineensis

oblasti: Asie, JV Asie, Malesie, Nová Guinea

Adenantha pavonina

synonyma: *A. gersenii*, *A. polita*, *Corallaria parvifolia*

oblasti: Americké Panenské ostrovy, Brazílie, Florida, Havajské ostrovy, Honduras, Jamajka, Jižní Amerika, JV USA, Karibik, Kostarika, Kuba, Malé Antily, Panenské ostrovy, Portoriko, S Jižní Amerika, Severní Amerika, Střední Amerika, Střední Severní Amerika, Tichý oceán, Tobago, Trinidad, USA, V Jižní Amerika, Velké Antily, Venezuela

Roste v tropech celého světa v podobě stromu. Introdukována byla i do Ameriky. Dorůstá výšky 4 - 27m. Listy mají vřetenou délky 15 - 25 (i 40)cm, primárních dílů je 2 - 6 párů, lístky tvoří 8 - 19 párů, jsou podlouhle vejčité, eliptické nebo oválné, zaobledné, přitiskle chlupaté na obou stranách, mají délku 1,5 - 4cm a šířku 1 - 2,5cm. Kvete drobnými nažloutlými květy v hroznovitém květenství délky 8 - 20cm. Květy jsou žluté až oranžové, okvětní lístky eliptické, dlouhé 3mm. Plodem je lusk délky 15 - 22cm, šířky 1,5cm a obsahuje 10 - 15 černých lesklých semen o průměru 7 - 8mm.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=1355>

<http://www.rostliny.net/>