

Leucospermum conocarpodendron

čeleď: Proteaceae

oblasti: Západní Kapsko

Roste v okolí Cape Town ve Western Cape v JAR. Kvete žlutými květy. Plodem je nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. conocarpodendron - vyskytuje se na žulových (vzácně pískovových) skalách na Stolové hoře; kmínek průměru 15 - 40cm s korkem tloušťky 3 - 5cm; výška 3 - 5m, šířka 3 - 6m; šedé přisedlé listy vejčitého, eliptického nebo obvejčitého tvaru se 3 - 10ti zoubky na konci, šedé ochlupení; květe po (1 -) 2 - 3ks v kulovitých až vejčitých strboulech o průměru 7 - 9 (i 10)cm
- subsp. viridum - roste na východ podél pobřeží; polokulovitý keř nebo i stromek s kmenem do 40cm v průměru s 5cm vrstvou korku; výška 5 - 6m; přisedlé listy vejčité, eliptické či obvejčité, zakončené 3 - 10ti načervenalými zobuky, tmavězelené a ochlupené, dlouhé 6 - 11,5cm, široké 2,5 - 6cm; květe po 1 - 3ks v kulovitých nebo vejčitých strboulech o průměru 7 - 9cm

Vyhovují mu pískovce s mlžnou deštivou zimou a suchým teplým létem

Množí se semeny, které musí projít ohněm.

<https://www.rostliny.net/>