

Crotalaria pallida

synonyma: *Crotalaria brownei*, *Crotalaria fertilis*, *Crotalaria hookeri*, *Crotalaria mucronata*, *Crotalaria pisiformis*, *Crotalaria saltiana*, *Crotalaria siamica*, *Crotalaria striata*, *Crotalaria striata* f. *latifoliolata*, *Crotalaria striata* var. *acutifolia*, *Crotalaria tinctoria*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Čína, JV Asie, Střední Amerika, Tropická Afrika

Roste v Číně, tropické a subtropické Asii, Africe a Americe v podobě keříku nebo byliny. Větve jsou žebernaté, hustě přitiskle ochlupené. Palisty jsou jehlicovité, drobné a opadávají. Listy jsou 3četné, mají 2 - 4cm řapíky, vlastní lístky jdou podlouhlé až eliptické či obvejčité s široce klínovitou bází a tupým koncem, spodní strana je ochlupená, mají vyniklou žilnatinu, řapíčky délky 1 - 2mm, celkovou délku 3 - 7cm a šířku 1,5 - 4cm. Kvete v hroznovitém 25cm květenství složeném z 10 - 50ti květů žluté barvy s červenorůžovofialovými proužkováním. Pavéza je zakulacená až eliptická o průměru 1cm, křídla jsou podlouhlá, dlouhá 8mm a člunek je dlouhý 1,2cm. Plodem je podlouhlý v mládí ochlupený lusk délky 3 - 5cm, šířky 5 - 8mm a obsahuje 20 - 30 semen.

<https://www.rostliny.net/>