Urera (Drásalka)

čeleď: Urticaceae

Existuje více než 35 druhů. Rostou v tropické Americe, Africe, Austrálii a na tichomořských ostrovech podobě keře, stromu nebo liány. Obvykle mývají žahavé chloupky. Palisty opadávají nebo jsou srostlé. Listy jsou střídavé, řapíkaté, okraje mohou být zubaté nebo laločnaté. Žilnatina je zpeřená nebo 3 - 5tinervá. Květy jsou obvykle dvoudomé, drobné, seskupené do řidkých vrcholičnatých lat nebo vrcholíků. Samčí jsou 4 - 5tičetné, samičí 4četné. Plodem je nažka. Nejznámějším druhem je U. baccifera.

Urera acuminata
synonyma: Urtica acuminata

Urera alceifolia

oblasti: Guatemala, Honduras, J Mexiko, Kostarika, Panama

Roste v jižním Mexiku, Hondurasu, Kostarice, Panamě a Guatemale v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky až 6m s řidkým větvením. Na povrchu obvykle bývají žahavé chloupky. Listy mají řapíky, čepel podlouzle eliptickou až vejčitou se špičkou, úzce zaoblenenou až špičatou bází, mělce vroubkovaným nebo zubatým zvlněným okrajem, délkou do 25cm, šířkou do 12cm a se žahavými chloupky podél žeber. Spodní strana je bledší než vrchní zelená. Kvete až 8cm latami na starém dřevě v hustých svazečcích drobných květů. Plody jsou oranžovožluté o průměru 2 - 3mm.

Urera aurantiaca
synonyma: U. aurantiaca var. scandens

Urera baccifera (Drásalka bobulovitá)
synonyma: Calostima aculeata, U. armigera, U. baccifera var. horrida, U. horrida, U. rugosa, U. viridisetosa, Urtica armigera, Urtica baccifera, Urtica horrida

oblasti: Kuba, Mexiko, Portoriko, S Jižní Amerika

Roste v Jižní a střední Americe v podobě dvoudomé keře nebo malého stromu nebo i dřevnatějící byliny. Dorůstá výšky 1 - 4 (i 7)m. Nevytváří mnoho větví, ale větve jsou za to tlusté. Kmínky jsou hustě pokryté krátkými žahavými chlupovitými ostny. Listy mají dlouhý řapík, zubatý okraj, tvar okrouhle vejičtý až dlouze vejčitý se zaoblenou nebo srdčitou bází, špičkou nakonci a hrubě zubatým až mělce laločnatým okrajem, jsou tlusté, dlouhé až 25 (i 35)cm a široké do 12,5 (i 15)cm. Mají veliké žahavé žlázy, před nimiž nechrání ani silný oděv. Způsobují krátkodobou prudkou bolest. Kvete narůžovělými až fialovými květy v ve větvených vrcholících. Plody jsou sukulentní, dlouhé 3 - 5mm, barvy bílé nebo růžové. Extrakt z rostliny účinkuje proti zánětům a bolestem. Plody slouží jako potrava pro ptáky.

Vyhovují ji světliny tropických lesů, nemá ráda stín.

Urera cameroonensis

synonyma: U. woodii

oblasti: Kamerun

Urera capitata

Urera caracasana
synonyma: U. acuminata, U. alceifolia, U. capitata var. pavonii, U. caracasana var. miquelii, U. caracasana var. mitis, U. caracasana var. subpeltata, U. corallina, U. jacquinii, U. jacquinii var. corallina, U. jacquinii var. miquelii, U. jacquinii var. subpeltata, U. jacquinii var. ulmifolia, U. mitis, U. subpeltata, U. subpeltata var. morifolia, Urtica alceifolia, Urtica caracasana, Urtica corallina, Urtica mitis, Urtica tilliifolia, Urtica ulmifolia

oblasti: Portoriko, Venezuela

Roste v tropické Americe v podobě keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky až 10m. Větve jsou tlusté, protažené. Žilky listů a květenství mají žahavé chloupky. Listy jsou střídavé, široce vejčité až kulaté, okraj je vroubkovaně zubatý se špičatým nebo tupým koncem, srdčitou bází, zelenou barvou, délkou 15 - 30cm a šířkou do 25cm. Kvete dvoudomými (vzácně jednodomými) květy v úžlabních vrcholících. Kvlatní květy mají průměr 2 - 3mm a 4 okvětní lístky. Plodem je 1 - 3mm nažka oranžovočervené barvy.

Urera chlorocarpa (Drásalka zelenoplodá)

oblasti: Portoriko

Urera eggersi (Drásalka Eggersova)

Urera elata
synonyma: U. killipiana, Urtica elata

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale v podobě většího keře nebo nižšího stromu. Dorůstá výšky až 6m. Květve jsou tlusté. Žahavé chloupky se téměř nevyskytují. Listy jsou řapíkaté, tvaru vejčitého se špičkou na konci, zaoblenou nebo tupou bází, vykrajovaně vroubkovaným nebo i zvlněným okrajem, zelenou barvou, na spodní straně krátké chloupky a délkou až 25cm. Kvete ve vrcholíku na starém dřevě bez stopky nebo se stopkou. Plody mají délku 2 - 3mm a barvu oranžovočervenou.

Urera expansa

oblasti: Jamajka

Patří mezi endemity Jamajky.

Urera glabra

synonyma: U. konaensis, U. sandvicensis, U. sandvicensis var. kauaiensis, U. sandvicensis var. mollis

oblasti: Havajské ostrovy

Listy mají vejčitý tvar s krátce srdčitou bází, pilovým okrajem a špičkou. Na spodní straně je výrazná načervenalá žilnatina. Kvete bílozelenými kvítky.

Urera henriquesii

Urera hypselodendron

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě popínavé dřevné rostliny o délce 2 - 15m. Často vistí v giralndách na větvích. Borka je korkovitá. Listy mají eliptický nebo vejčitý tvar s pilovitým okrajem, zaoblenou nebo klínovitou bází, špičatým koncem, ochlupeným povrchem, délkou 5 - 16cm a šířkou 2 - 10cm. Kvete obvykle na starém dřevě nazelenalými květy v růžovooranžových květenstvích o délce 2 - 8cm.

Urera kaalae

oblasti: Havajské ostrovy

Patří mezi endemity ostrova O'ahu na Havajských ostrovech.

Vyskytuje se v nadmořských výškách 300 - 760m.

Urera killipiana

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale v podobě většiho keře nebo nižšího stromu. Výška bývá 3 - 4,5m. Žahavé chloupky jsou v květenstvích nebo na větvích. Listy jsou řapíkaté, tvaru eliptického až široce vejčitého, na konci se špičkou, zaoblenou nebo tupou bází, zvlněným zubatým okrajem, délkou 22cm a šířkou 13cm. Kvete dvoudomými květy ve vrcholíku na starém dřevě se stopkou. Plody nepřesahují velikost 1mm.

Urera laciniata (Drásalka kopinatá)

synonyma: U. girardinioides, Urtica girardinioides

oblasti: Bolívie, Kostarika, Peru, Venezuela

Roste v Kostarice, Venezuele, Peru a Bolívii v podobě stromovité dvoudomé byliny. Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve jsou štětinaté až trnité. Listy mají hluboce zastřihované zašpičatělé laloky, které mohou být ještě zubaté. Spodní strana je na žilkách trnitá a olysává. Dorůstají délky i šířky 15 - 35cm. Kvete v až 20cm dlouhém vrcholíku. Vlastní květy jsou seskupené do klubíček. Plodem je zakulacená 2mm nažka.

Urera lobata (Drásalka laločnatá)

Urera mannii
synonyma: Scepocarpus mannii

Urera nitida
synonyma: U. baccifera var. angustifolia, U. denticulata, Urtica nitida

Urera obovata (Drásalka obvejčitá)

Urera repens
synonyma: Laportea repens

Urera sansibarica

oblasti: Zanzibar

Roste v Africe v podobě liány. Dorůstá délky více než 3m. Borka má hnědočervenou barvu, odlupuje se a na povrchu jsou žahavé chloupky. Listy mají vejčitý nebo eliptický tvar se srdčitou nebo uťatou bází, špičkou na konci, pilovým okrajem, délkou 7 - 15cm a šířkou 5 - 10cm. Jsou bělavě ochlupené. Kvete v až 10cm latách.

Urera simplex
synonyma: U. altissima, U. boliviensis, U. eggersii, U. rzedowskii, U. tuerckheimii

Urera sinuata

Urera thonneri

Urera trinervis
synonyma: Elatostema trinerve, U. acuminata var. cameroonensis, U. cameroonensis

oblasti: Afrika

Roste v Africe v podobě popínavé rostliny nebo i malého stromu. Dorůstá délky až 10m. Borka je hnědočervená nebo nazelenalá. Listy vyrůstají ve spirále, jsou eliptické, vejčité, srdčité nebo až okrouhlé o délce 6 - 20cm, šířce 3 - 8cm, s 3četnou žilnatinou. Okraj je zvlněný a řapíky mají délku 2,5 - 6cm. Kvete zelenobílými kvítky v kratších větvených květenstvích. Plodem je malý oříšek v oranžovém obalu.

Urera tuerckheimii

oblasti: Belize, Guatemala

Roste v Guatemale a Blize. Větve jsou hustě porostlé žahavými chlpuky. Listy mají 3nervou žilnatinou, tvar vejčitěkopinatý se špičkou, zubatým okrajem, hrbolkatakou horní stranou, délkou 6,5 - 7,5cm, šířkou 2 - 2,6cm. Kvete jednodobými kulovitými 1,5mm květy na krátké stopce.

Urera verrucosa

synonyma: U. caracasana var. tomentosa, Urtica verrucosa

Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3316

https://www.rostliny.net/