

# Plectocomia

čeleď: Araceae

## Plectocomia assamica

oblasti: Arunáčalpradéš, Ásám, Bhútán, Yunnan

## Plectocomia billitonensis

oblasti: Indonésie

Roste na ostrově Belitung.

## Plectocomia bractealis

oblasti: Ásám

Roste v Indii.

## Plectocomia dransfieldiana

oblasti: Malajsie

Roste v Malajsii.

## Plectocomia elmeri

oblasti: Mindanao

Roste na Filipínách.

## Plectocomia elongata

synonyma: Rotang maximus

oblasti: Borneo, Filipíny, Indočína, Jáva, Sumatra

Roste v jihovýchodní Asii.

## Plectocomia himalayana

synonyma: P. montana

oblasti: Arunáčalpradéš, Ásám, Bengálsko, Himálaj, Laos, Nepál, Sikkim, Thajsko, Yunnan

Pochází z Indie. Patří mezi šplhavé a popínavé palmy. Stonky dorůstají délky až 27m a na povrchu mají trny.

Snáší i mráz do -6,5°C.

### Plectocomia khasiana

oblasti: Ásám

Roste v Indii.

### Plectocomia longistigma

oblasti: Jáva

Roste na Javě.

### Plectocomia lorzingii

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

### Plectocomia macrostachya

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste na Myanmaru.

### Plectocomia microstachys

oblasti: Hainan

Roste pouze v Číně.

### Plectocomia mulleri

synonyma: P. minor, P. rigida

oblasti: Borneo, Malajsie

Roste na Borneu a Malajsii.

### Plectocomia pierreana

synonyma: P. barthiana, P. cambodiana, P. kerriana

oblasti: Guangdong, Guangxi, Kambodža, Laos, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste ve Vietnamu, Kambodži, Laosu, Thajsku a Číně.

### Plectocomia pygmaea

oblasti: Kalimantan

Roste na Borneu.

<https://www.rostliny.net/>