

Taeniatherum

čeleď: Poaceae

Taeniatherum caput-medusae

synonyma: *Cuviera aspera*, *Cuviera bobartii*, *Cuviera caput-medusae*, *Cuviera caput-medusae* var. *aspera*, *Cuviera crinita*, *Elymus asper*, *Elymus caput-medusae*, *Elymus caput-medusae* f. *pubivaginitus*, *Elymus caput-medusae* subsp. *bobartii*, *Elymus caput-medusae* subsp. *crinitus*, *Elymus caput-medusae* var. *asper*, *Elymus caput-medusae* var. *bobartii*, *Elymus caput-medusae* var. *crinitus*, *Elymus caput-medusae* var. *typicus*, *Elymus crinitus*, *Elymus crinitus* var. *major*, *Elymus crinitus* var. *microstachyus*, *Elymus crinitus* var. *minor*, *Elymus crinitus* var. *siculus*, *Elymus crinitus* var. *sinaicus*, *Elymus intermedius*, *Elymus platatherus*, *Hordelymus asper*, *Hordelymus caput-medusae*, *Hordelymus caput-medusae* subsp. *asper*, *Hordelymus caput-medusae* subsp. *crinitus*, *Hordeum asperum*, *Hordeum bobartii*, *Hordeum caput-medusae*, *Hordeum caput-medusae* subsp. *asperum*, *Hordeum caput-medusae* subsp. *bobartii*, *Hordeum caput-medusae* subsp. *crinitum*, *Hordeum caput-medusae* var. *asperum*, *Hordeum crinitum*, *Hordeum intermedium*, *Hordeum intermedium* var. *intermedium*, *Hordeum oligostachyum*, *Leptothrix caput-medusae*, *Leptothrix crinita*, *T. asperum*, *T. caput-medusae* subsp. *asper*, *T. caput-medusae* subsp. *crinitum*, *T. caput-medusae* var. *crinitum*, *T. crinitum*, *T. crinitum* var. *caput-medusae*

oblasti: Andalusie, Austrálie, Connecticut, Idaho, Írán, Itálie, Izrael, Kalifornie, Katalánsko, Kavkaz, Maďarsko, Montana, Nevada, New York, Oregon, Pennsylvania, Portugalsko, S Afrika, Střední Asie, Utah, Washington

Roste od Španělska a Portugalska přes severní Afriku po Kavkaz a západní a střední Asii. Zavlečený byl druhotně do střední Evropy, Austrálie a Severní Ameriky. Jedná se o jednoletku nebo ozimu. Dorůstá výšky 10 - 40 (i 60)cm. Stébla jsou tuhá, poléhavá až vystoupavá. Listy mají šířku 1 - 3mm a mohou být roztroušeně ochlupené. Kvete v panáku bez ostí dlouhém do 5mm, osti délky 2,5 - 7,5cm. Plevy mají délku 1,5 - 4cm.

Vyhovují mu sušší louky, okraje lesů a cest, rumiště, atp.

Taeniatherum crinitum

oblasti: Írán, Kazachstán

Další informace:

<http://botany.cz/cs/taeniatherum-caput-medusae/>

<https://www.rostliny.net/>