

Ficus thonningii

synonyma: *Ficus annobonensis*, *Ficus basarensis*, *Ficus bequaertii*, *Ficus bongoensis*, *Ficus burkei*, *Ficus butaguensis*, *Ficus chlamydodora*, *Ficus cognata*, *Ficus crassipedicellata*, *Ficus cyphocarpa*, *Ficus dekdekena*, *Ficus dinteri*, *Ficus dissocarpa*, *Ficus dusenii*, *Ficus erici-rosenii*, *Ficus eriocarpa*, *Ficus galpinii*, *Ficus goetzei*, *Ficus hochstetteri*, *Ficus iteophylla*, *Ficus kagerensis*, *Ficus mabifolia*, *Ficus mammigera*, *Ficus medullaris*, *Ficus neriifolia*, *Ficus neurocarpa*, *Ficus persicifolia*, *Ficus petersii*, *Ficus phillipsii*, *Ficus psilopoga*, *Ficus pubicosta*, *Ficus rhodesiaca*, *Ficus rokko*, *Ficus ruficeps*, *Ficus rupicola*, *Ficus ruspolii*, *Ficus schimperi*, *Ficus schinziana*, *Ficus spragueana*, *Ficus tropophyton*, *Urostigma acrocarpum*, *Urostigma dekdekena*, *Urostigma hochstetteri*, *Urostigma schimperi*, *Urostigma thonningii*

čeleď: Moraceae

oblasti: Florida, Havajské ostrovy, Makaronésie, Portoriko

Pochází z Afriky. Roste v podobě stálezeleného stromu, někdy jako epifyt. Dorůstá výšky 6 - 21m. Borka je šedá. Listy jsou eliptické nebo obvejčité, tupé nebo zaoblené (i tupě špičaté), holé nebo jemně ochlupené, dlouhé 3 - 13cm, široké 1,5 - 6cm, báze klínovitá nebo tupá (i téměř srdčitá) a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 3 (i 6)cm. Plodí v paždí listů nebo i pod listy, jsou přisedlé nebo mají až 1cm stopky, plody žluté nebo červené, kulovité až eliptické, hladké nebo bradavičnaté, holé nebo drobně ochlupené, široké 0,7 - 1,4cm a bazální listeny jsou vytrvávající a dlouhé 2 - 4mm.

<https://www.rostliny.net/>