

Andrachne (Homulinec)

synonyma: Eraeliss, Thelypotzium

čeleď: Phyllanthaceae

Roste v Severní i Jižní Americe, jižní Evropě, severní Africe a jižní Asii v podobě trvalých bylin nebo polokeřů či keřů. Dorůstají výšky do 1m Listy jsou jednoduché, střídavé, celokrajné, široké 2 - 5cm.

Vyhovuje ji prostředí polopouští.

Andrachne afghanica

oblasti: Afganistán

Andrachne aspera

synonyma: A. aspera var. glandulosa, A. aspera var. maritima

oblasti: Etiopie, Írán, Kamerun, Makaronésie, Maroko, Pákistán, Somálsko, Súdán, Turecko

Roste od Kapverdských ostrovů a Maroka přes severní Afriku po Pákistán, dále v Turecku, Kamerunu, Súdánu, Etiopii a Somálsku jako trvalka nebo polokeř. Listy jsou dlouhé 0,3 - 1 (i 1,2)cm, široké 0,4 - 1,3 (i 1,7)cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Kvete samostatnými květy, samčí mají 2mm stopku, korunní lístky jsou eliptické, kratší kališních, mají bělavou barvu, samičí mají 3 - 5mm stopku, kališní lístky jsou kopinaté, dlouhé 2 - 2,5mm a zelenou barvu. Plody jsou zploštělé, zakulacené a 3úhlé, průměru 3 - 4mm a obsahují semena velikosti 1,5mm světle žlutohnědé barvy.

Andrachne brittonii

synonyma: Securinega abeggii

Andrachne buschiana

oblasti: Írán

Andrachne colchica (Homulinec kolchický)

oblasti: Gruzie, Írán, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie)

Roste na Kavkaze a v severním Turecku. Patří mezi jednodomé rostliny. Roste v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 1m. Mladé větve jsou tenké, sivozelené a holé. Střídavé listy mají dlouze vejčitý tvar délky 2m a celokrajný okraj. Samčí květy vyrůstají v úžlabních svazečcích, samičí jsou samostatné. Obojí jsou žlutozelené. Plodem je tobolka s pouzdry.

Vyhovují mu sušší křoviny, sutě, plné slunce a dobře propustný substrát.

Množí se podzemními výběžky, semeny a bylinnými řízky.

Andrachne cordifolia (Homulinec srdčitý)

oblasti: Himáchalpradéš, Nepál, Pákistán, Paňdžáb (indický), Uttarpradéš

Roste v Pákistánu, Indii a Nepálu v podobě keře. Dorůstá výšky (0,6 -) 1 - 1,5 (i 2,5)m. Větve mohou být v mládí řídce ochlupené. Listy jsou vejčitě 3úhlé až eliptické, dlouhé (1 -) 2 - 5 (i 8)cm, široké (0,5 -) 1 - 2 (i 4)cm, na bázi zakulacené až uťaté nebo mírně srdčité, žilnatinu tvoří 3 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2,5 (i 4)cm. Samčí květy vytvářejí chudší květenství, mají 0,5 - 1cm stopku, kališní lístky jsou mírně vejčité, zakulacené, dlouhé 2,5 - 3mm, korunní lístky jsou lžičkovité, dlouhé 2mm, samičí květy vyrůstají samostatně, mají (2 -) 3 - 4cm stopku, kališní lístky kulaté až eliptické, dlouhé 2mm, široké 1,5mm, za plodu dlouhé 3 - 4 (i 5)mm, široké 2,5 (i 4)mm. Plody jsou kulovitě 3laločné, dlouhé 3 - 5mm, široké 6 - 7mm a obsahují světlehnědá semena délky 3mm a šířky 2mm.

Andrachne ephemera

Andrachne fedtschenkoi

synonyma: A. hapladena, A. rotundifolia, A. rupestris

oblasti: Írán, Tádžikistán, Turkmenistán

Roste v Tádžikistánu a Turkmenistánu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 3 - 10cm. Vytváří mnoho nitkovitých řídce olistěných lodyh. Listy jsou jasně zelené, vejčitékulaté, mírně sbíhavé, dlouhé 0,2 - 1,1cm. Kvete bílými květy po 1 - 3ks v paždí listů.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Andrachne filiformis

oblasti: Zakavkazsko

Roste v zakavkazsku v podobě polokeře. Dorůstá výšky 7 - 20cm. Lodyhy jsou hnědožlutě zbarvené a jednoduché. Listy jsou jasně zelené, eliptického tvaru se špičkou až hrotem a klínovitou bází. Kvete samostatnými zelenobílými až 5mm květy v paždí listů na nitkovité stopce.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Andrachne fragilis

Andrachne fruticulosa

oblasti: Írán

Andrachne merxmuelleri

Andrachne microphylla

synonyma: A. ciliatoglandulosa, Croton microphyllus, Phyllanthidea microphylla, Phyllanthus ciliatoglandulosus

Andrachne minutifolia

Andrachne pulvinata

Andrachne pusilla

oblasti: Tádžikistán

Roste v Tádžikistánu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 5 - 12cm. Lodyhy jsou hustě olistěné. Vlastní listy jsou světlé, barvy sivozelené, tvaru zakulaceného až eliptického s tupým (někdy i hrotitým) koncem a klínovitou nebo uťatou bází. Kvete samostatnými bílými květy v paždí listů.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Andrachne pygmaea

oblasti: Kyrgyzstán

Roste v Kyrgyztánu. Vytváří mnoho lodyh. Listy mají eliptický až vejčitěkulatý tvar s klínovitou bází a tupým koncem, barva je sivozelená a dorůstají délky 3 - 5mm. Kvete po 1 - 2ks.

Andrachne ramosa

Andrachne reflexa

Andrachne schweinfurthii

synonyma: Securinea schweinfurthii

oblasti: Jemen

Patří mezi endemity Jemenu.

Andrachne stenophylla

oblasti: Írán, Turkmenistán

Roste v Íránu a Turkmenistánu v podobě polokeře. Dorůstá výšky 3 - 14cm. Vytváří mnoho tenkých šedozelených drsných lodyh olistěných především v horní části. Listy mají eliptický tvar se špičkou, sivozelenou barvu a délku 3 - 7mm. Kvete samostatnými květy bílé barvy.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Andrachne telephioides

synonyma: *A. asperula*, *A. cretica*, *A. nummulariifolia*, *A. pojarkoviae*, *A. rotundifolia*, *A. telephioides* subsp. *oreocretensis*, *A. telephioides* var. *brevifolia*, *A. telephioides* var. *rotundifolia*, *A. virescens*, *A. vvedenskyi*, *Eraclissa hexagyna*, *Telephioides procumbens*

oblasti: Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Kazachstán, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Pákistán, Řecko, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Somálsko, Srbsko, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste od Kapverdských ostrovů přes středozeří po Pákistán a na jih do Somálska jako trvalka. Stonek je bohatě olistěný a na bázi dřevnatí. Listy jsou mírně vejčité, zakulacené až přišpičatělé, dlouhé 0,2 - 1 (i 1,2)cm, široké 1,5 - 6 (i 8)mm, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2 (i 4)mm. Kvete samostatnými samčími a samičími květy, samčí mají 1mm stopku, kališní lístky obvejčité, žlutozelené, dlouhé 1,3mm, korunní lístky jsou obkopinaté, bílé, dlouhé 1mm, samičí květy mají 2 - 3mm stopku, kališní lístky obvejčité, dlouhé 2mm a tmavězelené s bělavými okraji. Plody jsou zploštělé, průměru 2 - 4mm a obsahují světle žlutohnědá semena velikosti 1,5 - 2mm.

Andrachne virgatenuis

Další informace:

<http://botany.cz/cs/andrachne-colchica/>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/s/kvResult.asp-C=PHYLLANTHACEAE&Rod=Andrachne.htm>

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Homulinec>

<https://www.rostliny.net/>