

## Rhynchospora alba (Hrotnosemenka bílá)

synonyma: *Dichromena alba*, *Phaeocephalum album*, *Phaeocephalum album* var. *marcum*, R. f. *laeviseta*, R. var. *kiusiana*, *Rhynchospora luquillensis*, *Schoenus albus*, *Scirpus albus*, *Triodon albus*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní Karolína, Kalifornie, Kamčatka, Karpaty, Kavkaz, Labrador, Maďarsko, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Quebec, Rhode Island, Rumunsko, Sachalin, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Střední Rusko, Švýcarsko, Tennessee, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v celé Evropě s výjimkou středozemí a nejsevernějších částech. Roste také v Severní Americe a Asii v strsech. Pod zemí vytváří max. krátké oddenkovité výběžky. Lodyha dorůstá výšky 10 - 40 (i 70)cm, je přímá (i mírně křivolaká) a křehká. Přízemní listy jsou úzké, dlouhé max. do 1/2 lodyhy, lodyžní listy jsou ještě kratší. Kvete bílými květy ve vretenovitém klásku s podpůrným listenem o stejné nebo kratší délce než má kvetenství, plevy jsou bílé, později nahnědlé a korunní lístky mají 9 - 13 štětinek kratších nažky. Patří mezi ohrožené druhy C2.

Vyhovují ji půdy bohaté na živiny, ideálně rašelinné a slatinné se stálým dostatkem vody.

<https://www.rostliny.net/>