

Scirpoides (Kamýšek)

synonyma: Holoschoenus

čeleď: Poaceae

Roste v Evropě, západní Asii, Africe a Austrálii. Patří mezi jednodomé trvalky a byliny. Pod zemí vytvářejí krátké oddenky. Lodyhy mají kulatý průřez. Listy vysutají pouze při bázi a jsou obvykle redukované pouze na pochvy, pouze nejvyšší mohou mít kratší čepel. Květy jsou oboupohlavné, seskupené do klásků a klásky skládají kulovité hlávky. Plodem je nažka, obvykle se 3mi hranami.

Scirpoides burkei

synonyma: Scirpus burkei

Scirpoides dioeca

Scirpoides dioecus

synonyma: Isolepis dioeca, S. dioeca, Scirpus dioecus, Scirpus schinzii

Scirpoides holoschoenus (Kamýšek obecný)

synonyma: Holoschoenus romanus, Holoschoenus romanus subsp. holoschoenus, Holoschoenus vulgaris, Isolepis holoschoenus, Isolepis holoschoenus var. australis, Isolepis holoschoenus var. romanus, Scirpus holoschoenus

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arabský poloostrov, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Egypt, Francie, Gruzie, Írán, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Kentucky, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Maďarsko, Makaronésie, Maroko, Moldávie, Německo, New York, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, S Itálie, Sardínie, Sibiř, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie

Roste v jižní, střední a východní Evropě, severní Africe, západní a střední Asii v trsech jako trvalka a zavlečen byl i na Kanárské ostrovy a Severní Ameriky. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,5 - 1 (i 1,5)m. Pod zemí vytváří plazivý trsnatý oddenek bez výběžků. Lodyha je jednoduchá, přímá, kulatá, drobně rýhovaná a sivozelená. Listy mají hnědé pochvy, spodní bez čepele, nejvyšší má čepel úzce šídlovitou až čárkovitou, 1/2oblou a na okraji drsnou. Úzce vejčité klásky o délce 3 - 4mm jsou seskupené do kulovitých 1 - 7 (i 20)tičetných hlávek o průměru (0,3 -) 0,8 - 1,2cm, jedna je přisedlá, ostatní stopkaté, listen pod květenstvím je protáhlý ve směru lodyhy, přesahuje květenství až o 30cm, plevy jsou obvejčité a tmavěhnědé se zeleným centrálním proužkem. Plodem je obvejčitá 3hranná hnědočerná nažka délky 1mm. Patří mezi ohrožené druhy C2. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. australis - jižní Morava, Slovensko
- subsp. globifera
- subsp. holoschoenus (Kamýšek obecný pravý)
- subsp. thunbergii

Vyhovují mu vlhké písčité a slatinné louky, příkopy, atp.

Scirpoides varius

Další informace:

<http://botany.cz/cs/scirpoides-holoschoenus/>

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Kam%C3%BD%C5%A1ek>

<https://www.rostliny.net/>