

Adenostyles (Havez)

čeleď: Asteraceae

Roste v teplejších oblastech severní polokoule, zejména v Evropě, méně pak v Asii jako trvalka.

Adenostyles alliariae (Havez česnáčková)

synonyma: *A. albida*, *A. albida* subsp. *kerner*, *A. albida* var. *kerner*, *A. albifrons*, *A. alpina* subsp. *alliariae*, *A. hirsuta*, *A. kerner*, *A. petasites*, *Cacalia albida*, *Cacalia albifrons*, *Cacalia alliariae*, *Cacalia hirsuta*, *Cacalia petasites*, *Cacalia tomentosa*, *Eupatorium albifrons*

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Kavkaz, Německo, Polsko, Pyreneje, Rakousko, Švýcarsko, Ukrajina, V Alpy, V Karpaty

Roste v horách západní a střední Evropy. Dorůstá výšky 0,6 - 1,2 (i 1,5)m. Lodyha je přímá, tlustá, rýhovaná a větvená. Přízemní listy mají až 25cm dlouhý rýhovaný řapík, čepel 3úhelníkovou až srdčitou s ostře laločnatě zubatým okrajem, mají délku do 30cm a šířku do 40cm, spodní strana je bíle vlnatá, lodyžní listy mají kratší řapíky a čepel také 3úhlesrdčitou. Kvete v drobných bohatých úborech ze 3 - 4 (i 6)ti trubkovitých oboupohlavných růžovofialových až červenofialových 4cípých 1,2cm dlouhých květů složených do chocholičnaté laty. Plodem je vejčitá nažka s bílým víceřadým chmýrem. Patří mezi ohrožené druhy C4. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alliariae*
- subsp. *hybrida*
- subsp. *pyrenaica*

Vyhovuje ji horské subalpínské nivy, okraje potoků, prameniště, vlhčí trávníky, lesní světliny, atp. s vyšší vzdušnou vlhkostí. Půda by měla být bohatá na živiny, hlinitá až mírně štěrkovitá.

Adenostyles alliariifolia

synonyma: *Cacalia alliariifolia*

Adenostyles alpina

synonyma: *A. alpina* var. *australis*, *A. alpina* var. *glabra*, *A. calcarea*, *A. crassifolia*, *A. glabra*, *A. glabra* var. *australis*, *A. glabra* var. *calcarea*, *A. polyantha*, *A. stenotricha*, *A. viridis*, *Adenostylium hybridum*, *Cacalia alpina*, *Cacalia cordiformis*, *Cacalia glabra*, *Cacalia hybrida*, *Cacalia reniformis*, *Calcalia alpina*, *Epatitis obliqua*, *Eupatorium viride*

oblasti: Alpy, Itálie, Německo, Švýcarsko

Pochází z hor jižní Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 30 - 80cm. Přízemní listy jsou kulaté se srdčitou bází, v průměru mají 12 - 14cm a okraj je hluboce pilovitý. Kvete růžovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *alpina*
- subsp. *australis*/A. *australis* - endemit Itálie
- subsp. *macrocephala* - endemit Itálie
- subsp. *nebrodensis* - endemit Itálie

Adenostyles briquetii

Adenostyles dubia

synonyma: *Adenostylium dubium*

Adenostyles leucophylla

synonyma: *A. alliariae* subsp. *hybrida*, *A. alpina* var. *leucophylla*, *A. candidissima*, *A. hybrida*, *A. intermedia*, *A. petasites* subsp. *hybrida*, *A. tomentosa*, *A. villarsii*, *Cacalia leucophylla*, *Cacalia tomentosa*, *Cacalia tomentosa* var. *hybrida*

oblasti: Itálie, J Alpy, Německo, Švýcarsko

Roste v Alpách při pobřeží moře. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 20 - 50 (i 80)cm. Lodyha je přímá, větvená až v rámci květenství. Listy jsou řapíkaté, trojúhelníkovité až kulaté se srdčitou bází nebo ledvinovité, ostře zubaté a bíle plstnaté. Kvete růžovými květy v okoličnatých úborech po 12 - 24ks.

Vyhovuje jí plné slunce nebo polostín a vlhké dobře propustné půdy. Vyskytuje se na horských loukách, pastvinách, kamenitých svazích, při horských potocích, atp. na silikátovém podkladu.

Adenostyles macrophylla

Adenostyles platyphylloides

synonyma: *A. rhombifolia* subsp. *platyphylloides*

Adenostyles rhombifolia

synonyma: *Senecio rhombifolius*

Adenostyles similiflorus

Adenostyles x canescens

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kytky/K2166.php>

<http://botany.cz/cs/adenostyles-alliariae/>

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/havez>

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=521>

<https://www.rostliny.net/>