

# Chaenorhinum (Hledíček)

čeleď: Plantaginaceae

Roste ve středozeří. Může jednat podle druhu o jednoletku i trvalku. Listy má vstříčné, čárkovité až kopinaté či zakulacené.

## Chaenorhinum calycinum

synonyma: *Antirrhinum calycinum*, *Antirrhinum rytidocarpum*, *Antirrhinum rytidospermum*, *C. persicum*, *C. rytidospermum*

oblasti: Írán, Kazachstán

## Chaenorhinum cryptarum

## Chaenorhinum flexuosum

synonyma: *Antirrhinum flexuosum*, *Chaenarrhinum flexuosum*, *C. organifolium* subsp. *flexuosum*, *C. organifolium* var. *maroccanum*

## Chaenorhinum foroughii

## Chaenorhinum glareosum

synonyma: *C. crassifolium* subsp. *glareosum*, *Linaria crassifolia* subsp. *glareosa*, *Linaria organifolia* var. *glareosa*

oblasti: Andalusie

Roste v jihozápadní Evropě ve Španělsku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10 (i 20)cm. Listy jsou vejčité až kulaté, dlouhé 0,4 - 1,2cm, široké 2,5 - 7mm v barvě světlezelené. Kvete růžovými květy se žlutým pruhem velikosti 1,7 - 2,6cm, trubkou délky 1 - 1,2cm, šířkou 6 - 6,5mm, ostruha dlouhá 4 - 6mm, široká 1,3 - 2mm a jsou seskupané do chocholičnatého 3 - 8mičetném hroznů. Plodem je tobolka délky 3,5 - 4,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Blue Dreams'
- 'Blue Eyes'
- 'Summer Skies'

Vyhovují mu skalní pukliny, štěrky, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostíh.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

## Chaenorhinum grandiflorum

synonyma: *C. hians*, *C. rubrifolium* var. *carthaginense*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky (2 -) 4 - 20cm. Spodní listy jsou dlouhé 0,4 - 1,5 (i 1,9)cm, široké 1,3 - 8mm. Květenství je (1 -) 3 - 20tičetné, květy mají korunu délky 1,1 - 1,5cm, trubka je dlouhá 3 - 6,5mm, široká 2 - 3mm, ostruha je dlouhá 4 - 6,5mm a široká 0,5 - 0,6mm. Plodem je tobolka délky 2,5 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *carthaginense* - květy mají trubku délky 4 - 6,5mm; tobolka dlouhá 3,5 - 4mm
- subsp. *grandiflorum* - květy mají trubku délky 3 - 4mm; tobolka je dlouhá 2,5 - 3mm

### Chaenorhinum grossecostatum

### Chaenorhinum huber-morathii

### Chaenorhinum johnstonii

synonyma: *C. jacquemontii*, *C. podlechii*

### Chaenorhinum litorale (Hledíček pobřežní)

synonyma: *Antirrhinum litorale*, *C. aschersonii*

oblasti: Balkánský poloostrov, Írán

Pochází z Balkánského poloostrova. Dorůstá výšky 30 - 50cm. Kvete v hustém hroznu, květy mají max. 2x delší stopku než je délka kalicha - tj. za plodu 3 - 9mm, koruna je bleděmodrá, dlouhá 6,5 - 9mm, ostruha je vakovitá a dlouhá do 2mm. Plodem je vejčitá tobolka kratší délky, než je délka koruny.

Vyhovují mu rumišťe a železniční násypy.

### Chaenorhinum macropodum

synonyma: *C. longipedunculatum*

oblasti: Andalusie

Roste v jihozápadní Evropě ve Španělsku v trsech. Dorůstá výšky 15 - 35cm. Lodyhy jsou žláznatě ochlupené. Přízemní listy mají kopinatý tvar, lodyžní jsou užší, ochlupené, dlouhé 0,4 - 2,8cm a široké 1,5 - 9mm. Kvete růžovofialovými květy délky (1,6 -) 1,7 - 2,6cm s fialovými pruhy a žlutým nebo bílým patrem, trubkou délky 0,7 - 1cm, šířkou 3,5 - 5,5mm, ostruhou délky 5 - 8mm, šířkou 1,3 - 1,7mm v 6 - 12tičetném květenství. Plodem je tobolka délky 4,5 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *degenii* - semena délky 0,5 - 0,7mm a šířky 0,3 - 0,4mm
- subsp. *macropodum* - semena délky 0,75 - 1mm a šířky 0,5 - 0,6mm

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá sušší dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

## Chaenorhinum minus (Hledíček menší)

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Alžírsko, Andalusie, Arkansas, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Delaware, Finsko, Francie, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Itálie, JZ Rusko, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kréta, Krym, Libanon, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Manitoba, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Moldávie, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Rusko, Západní Virginie

Dorůstá výšky (1 -) 5 - 35 (i 40)cm. Lodyha je větvená, hustě žláznatá. Listy jsou přisedlé, kopinaté, dlouhé 0,5 - 2 (i 3)cm a široké 2 - 6mm. Kvete v 5 - 30tičetném hroznu, květy mají stopku 3 - 4x delší než je délka kalicha (za plodu (0,5 -) 0,8 - 2cm) a koruna je bleděfialová, tlamovitá, dlouhá (5,5 -) 6 - 8 (i 9,5)mm, trubka je dlouhá 2 - 3mm, široká 2,5mm, ostruha má délku 1,5 - 2,5 (i 3)mm a šířku 0,7 - 1,2mm. Plodem je prakticky kulatá tobolka délky 4 - 5 (i 6)mm, šířky 3 - 4,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. anatolicum
- subsp. idaeum

Vyhovují mu hory, náspy, pole, rumišťe, atp.

## Chaenorhinum organifolium

synonyma: Anarrhinum crassifolium, Antirrhinum organifolium, Antirrhinum villosum, Chaenarrhinum organifolium, C. brasianum, C. burnatii, C. crassifolium var. capitatum, C. lapeyrousianum, C. montserratiorum, C. organifolium subsp. cotiellae, C. organifolium subsp. lapeyrousianum

oblasti: Andalusie, Baleáry, Itálie, JV Evropa, Katalánsko, Portugalsko, S Afrika

Roste v jihovýchodní a jihozápadní Evropě a severní Africe v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Lodyha je poléhavá. Listy mají zelenou barvu, jsou kopinaté až kulaté. Kvete růžovofialovými květy s oranžovou skvrnou na spodním pysku a délkou 0,9 - 2cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. cadevallii
- subsp. crassifolium - Baleáry, Španělsko; řapíkaté obkopinaté nebo kopinaté tupé listy, dlouhé 0,5 - 1,7cm, široké 2 - 5mm; květenství 8 - 25tikvěté, koruna velikosti 1 - 1,7cm, trubka délky 3,5 - 5,5mm, šířky 3 - 5mm, ostruha dlouhá 2 - 5mm, široká 0,9 - 1,5mm; tobolka délky 2 - 3mm
- subsp. flexuosum
- subsp. organifolium
- subsp. rodriguezii
- subsp. segoviense - Portugalsko, Španělsko; řapíkaté obkopinaté nebo úzce kopinaté špičaté listy hustě ochlupené, zelené; květenství 12 - 20tikvěté, bílé nebo světlemodré květy

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá sušší dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízkami nebo dělením.

## Chaenorhinum raveyi

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky (3 -) 5 - 15 (i 30)cm. Spodní listy jsou dlouhé (0,4 -) 0,7 - 1,5cm, široké (2 -) 3,5 - 6mm. Květenství je (1 -) 3 - 8mičetné, koruna má délku 1,5 - 1,8 (i 2)cm, trubka je dlouhá 4 - 7mm, široká 4 - 4,5mm, ostruha je dlouhá 4 - 6mm a široká 1,2 - 1,8mm. Plodem je tobolka délky 3 - 5mm.

## Chaenorhinum reticulatum

### Chaenorhinum robustum

synonyma: *C. serpyllifolium* subsp. *robustum*

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 6 - 30cm. Spodní listy jsou dlouhé 1 - 2,2cm, široké 5 - 8mm, květenství je 3 - 7 (i 12)tičetné, kališní lístky jsou úzce eliptické, koruna má délku 1,4 - 1,8cm, trubka je dlouhá 4 - 4,2mm, široká 4 - 4,5mm, ostruha je dlouhá 3,5 - 4,5mm a široká 1,3 - 1,8mm. Plodem je tobolka délky 3 - 4mm.

### Chaenorhinum rubrifolium

synonyma: *Linaria rubrifolia*

oblasti: Andalusie, Írán, Itálie, Katalánsko

Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *formenterae*
- subsp. *gerense*
- subsp. *raveyi*
- subsp. *rubrifolium* - výška (2,5 -) 5 - 18cm; spodní listy dlouhé 0,65 - 1,95cm, široké 0,3 - 1,4cm; květenství 5 - 10 (i 25)tičetné, koruna délky 0,7 - 1,1 (i 1,3)cm, trubka dlouhá 4,2 - 4,5mm, široká 2 - 2,2mm, ostruha dlouhá (2,5 -) 3 - 4 (i 5)mm, široká 0,5 - 0,7mm; tobolka dlouhá 3 - 5mm

### Chaenorhinum rupestre

synonyma: *Chaenarrhinum exile*, *C. exile*, *C. rubrifolium* f. *rupestre*

### Chaenorhinum semiglabrum

synonyma: *C. segoviense* subsp. *semiglabrum*

### Chaenorhinum semispeluncarum

### Chaenorhinum serpyllifolium

synonyma: *C. origanifolium* subsp. *serpyllifolium*

oblasti: Katalánsko

### Chaenorhinum suttonii

### Chaenorhinum tenellum

synonyma: Anarrhinum tenellum, Antirrhinum tenellum, Linaria tenella

oblasti: Španělsko

Roste ve Španělsku v trsech. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Lodyha je poléhavá. Listy jsou řapíkaté, vstřícné, vejčité až kulaté se špičatým nebo tupým koncem a uťatou bází, povrch je hustě ochlupený, zelený. Kvete bílými 6 - 8mm květy v 5 - 20tičetném květenství.

Vyhovují mu skalní pukliny, štěrkovitá půda bohatá na živiny a stín.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

### Chaenorhinum tuberculatum

### Chaenorhinum villosum

synonyma: Antirrhinum oppositiflorum, Antirrhinum villosum, Chaenarrhinum macrocalyx, C. granatense, C. macrocalyx, C. villosum subsp. granatensis, Linaria villosa

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Francie, Maroko, Portugalsko

Roste v Alžírsku, Francii, Španělsku, Portugalsku a Maroku v trsech. Dorůstá výšky 15 - 45cm. Lodyhy jsou poléhavé, větvené, hustě žláznatě ochlupené. Listy mají kulatý až obvejčitý tvar, délku 0,6 - 2,2 (i 2,5)cm a šířku 0,3 - 1cm. Kvete růžovofialovými nebo bleděžlutými květy délky 1 - 1,9cm s fialovým žilkováním, trubkou délky 5,5 - 6,5mm, šířkou 4 - 5,5mm, ostruhou délky 1,5 - 4mm, šířkou 0,7 - 1,5mm v 5 - 25tičetném květenství. Plodem je tobolka délky 1,5 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. granatense
- subsp. villosum

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná sušší půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízkem nebo dělením.

### Chaenorhinum yildirimlii

<https://www.rostliny.net/>