

Myosotis scorpioides (Pomněnka bahenní)

synonyma: *Myosotis palustris*

čeleď: Boraginaceae

oblasti: Alabama, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste v Evropě a Asii, rozšířila se i do Severní Ameriky. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 15 - 30 (i 80)cm. Stonek je hranatý. Listy mají dlouze kopinatý tvar, jsou ochlupené a přisedlé. Kvete světlemodrými květy o průměru 0,4 - 1cm se žlutobílým středem a s 5ti okvětními lístky na vzpřímeném stonku ve vijanu bez listenů. Plodem je tvrdka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *lamottiana*
- subsp. *laxiflora* (Pomněnka bahenní volnokvětá) - hlavní stonek holý nebo přitiskle ochlupený, postranní stonky mohou být odstále ochlupené, stonky vystoupavé až poléhavé a kořenující
- subsp. *palustris* - hlavní stonek odstále ochlupený a přímý, u báze může být kořenující; listy oboustranně ochlupené
- subsp. *scorpioides* (Pomněnka bahenní pravá)
- subsp. *tuxeniana*

Vyhovují ji břehy tekoucích i stojatých vod nebo podmáčená místa s dostatkem živin.

<https://www.rostliny.net/>