

Erechtites (Starčekovec)

čeleď: Asteraceae

Pocházejí z Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu. Některé druhy občas bývají považovány jako druhy rodu *Senecio*.

Erechtites glomeratus

synonyma: *E. arguta*, *E. argutus*, *E. glomerata*, *Senecio argutus*, *Senecio glomeratus*

oblasti: Austrálie, Kalifornie, Nový Zéland, Oregon, Washington

Pochází z Austrálie a Nového Zélandu. Dorůstá výšky 1,5 - 2m. Listy mají délku do 15cm a jsou hluboce laločnaté. Kvete v úboru, střed je žlutý, okvětní lístky tmavě tečkované. Plodem je nažka s chmýrem.

Erechtites goyazensis

synonyma: *E. missionis* var. *lanceolatus*, *E. missionum* var. *lanceolatus*, *Senecio goyazensis*

Erechtites hieraciifolius (Starčekovec jestřábníkolistý)

synonyma: *E. agrestis*, *E. cacalioides*, *E. carduifolius*, *E. carduifolius* var. *latifolius*, *E. hieracifolia* var. *cacalioides*, *E. hieraciifolius* f. *minor*, *E. hieraciifolius* var. *carduifolia*, *E. praealtus*, *E. sulcata*, *Gynura aspera*, *Gynura malasica*, *Neoceis carduifolia*, *Neoceis hieraciifolia*, *Senecio cacalioides*, *Senecio carduifolius*, *Senecio hieraciifolius*, *Senecio hieraciifolius* var. *giganteus*, *Sonchus agrestis*, *Sonchus brasiliensis*, *Sonchus occidentalis*

oblasti: Alabama, Arkansas, Bolívie, Brazílie, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Fujian, Georgia, Guizhou, Havajské ostrovy, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, JV Asie, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Korea, Louisiana, Maďarsko, Maine, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portoriko, Quebec, Rakousko, Rhode Island, Rumunsko, S Argentina, Severní Karolína, Sichuan, Slovensko, Slovinsko, Tchaj-wan, Tennessee, Texas, Ukrajina, Venezuela, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Yunnan, Západní Virginie

Roste v Severní i Jižní Americe, zavlečen byl i do Evropy a Asie. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5 (i 2)m. Povrch bývá ochlupený. Pod zemí vytváří tence vřetenovitý kořen. Lodyha je přímá, dutá, řídce ochlupená nebo lysá, bohatě olistěná a náchylná na zlomení. Přízemní listy mají dlouze obvejčitou čepel s dlouhým křídlatým řapíkem. Před kvetením zasychají. Lodyžní střední listy jsou pak přisedlé až objímavé, podlouhlé až obkopinaté, mají zúženou nebo mělce srdčitou bázi, dlouhé do 15cm a široké 3,5cm. Horní listy jsou pouze čárkovité až čárkovitěkopinaté s objímavou bází a zvláště spodní ochlupenou stranou. Kvete ve válcovitých stopkatých úborech o délce 1,2 - 1,7cm, průměru 6 - 7mm seskupených v chocholičnaté latě. Plodem je dlouze čárkovitá 2 - 3mm nažka s 1,2 - 1,4cm bílým chmýrem.

Vyhovují mu okraje lesů, průseky, atp.

Množí se semeny.

Erechtites ignobilis

Erechtites leptanthus

synonyma: Senecio leptanthus

Erechtites minimus

synonyma: E. minima

oblasti: Austrálie, Kalifornie, Nový Zéland, Oregon, Washington

Pochází z Austrálie a Nového Zélandu. Zavlečen byl ale např. i na západní pobřeží USA. Patří mezi jednoletky nebo krátce žijící trvalky. Dorůstá výšky až 2m. Pod zemí vytváří hluboký oddenek. Listy jsou kopinaté s ostře zubatým okrajem. Dorůstají délky až 20cm. Kvete ve válcovitých úborech se žlutými květy.

Erechtites missionis

Erechtites missionum

Erechtites runcinatus

Erechtites valerianifolia

synonyma: Cacalia prenanthoides, Crassocephalum valerianifolium, E. ambigua, E. organensis, E. petiolata, E. valerianifolia f. depauperata, E. valerianifolia f. organensis, E. valerianifolia f. reducta, E. valerianifolia var. organensis, E. valerianifolius, Senecio albiflorus, Senecio lactuoides, Senecio valerianifolius

oblasti: Havajské ostrovy, Portoriko

Erechtites valerianifolius

Další informace:

<http://botany.cz/cs/erechtites-hieraciifolius/>

<http://www.floracr.unas.cz/floraCR/starckovec.htm>

<http://www.kvetenacr.cz/clanky/hledase-erechtites-hieraciifolia.asp>

<https://www.rostliny.net/>