

# Argyrocytus (Stříbrocist)

čeleď: Fabaceae

Existuje pouze 1 druh.

## Argyrocytus battandieri (Stříbrocist Batandierův)

synonyma: Adenocarpus battandieri, Cytisus battandieri

oblasti: Atlas, Maroko

Pochází z pohoří Atlas v Maroku v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky i šířky 3 - 3,5 (i 5)m. Povrch je stříbřitě chlupatý. Borka je tmavězelená. Listy jsou husté, 3četné s až 5cm řapíky, vlastní lístky jsou vejčité eliptické, obvejčité nebo vejčité podlouhlé, tmavězelené, hedvábně ochlupené, dlouhé 4 - 7 (i 11)cm. Kvete sytě žlutými až 2m květy ve vzpřímených hroznech o délce 5 - 15cm. Plodem je vzpřímený zploštělý přímý ochlupený lusk délky 5cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Yellow Tail' - stříbrozelené listy; dlouhlé hrozny květů

Vyhovuje mu plné slunce, sušší vzduch a dobře propustná půda.

Množí se semeny nebo řízky.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=388>

<https://www.rostliny.net/>