

Celtis caucasica (Břestovec kavkazský)

synonyma: *Celtis arcata*, *Celtis australis* subsp. *caucasica*, *C. subsp. caudata*, *C. var. caudata*, *Celtis inglisii*

čeleď: Ulmaceae

oblasti: Afghánistán, Irák, Írán, Kašmír, Kavkaz, Kazachstán, Malá Asie (Anatolie), Nepál, Pákistán, Tán-šan

Roste na Kavkaze, Malé Asii a střední Asii v podobě opadavého stromu. Dorůstá výšky 4 - 15 (i 25)m. Větve jsou přvislé, v mládí ochlupené a hnědé nebo načervenalé. Listy jsou zkoseně vejčité až obvejčité, špičaté, hrubě zubaté, kožovité, v mládí štětinaté, drsné, na podzim červené, dlouhé (3 -) 4 - 10cm, široké (2 -) 2,5 - 5cm, spodní strana ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,2cm. Květy jsou drobné a bledězelené. Plody jsou žluté až červenohnědé, kulaté, široké 7 - 8mm a mají (1 -) 1,5 - 2 (i 2,5)cm stopku.

Je zimovzorný.

<https://www.rostliny.net/>