

Celtis paniculata (Břestovec latnatý)

synonyma: *Celtis ingens*, *Celtis opaca*, *Celtis palauensis*, *Dicera lanceolata*, *Solenostigma paniculata*

čeleď: Ulmaceae

oblasti: Austrálie, Borneo, Malé Sundy, Nová Guinea, Nová Kaledonie, Tichý oceán

Roste v jihovýchodní Asii, Austrálii a tichomoří v podobě stromu. Dorůstá výšky 12 - 36m při průměru kmene do 70cm. Borka je hladká až jemně rýhovaná a hnědá. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou vejčité, špičaté, tlusté, dlouhé 4 - 5mm a široké 3 - 4mm. Listy jsou eliptické až mírně vejčité, kožovité, tupě až zakulaceně špičaté, dlouhé 5 - 15cm, široké 2,5 - 7cm, báze úzce zakulacená, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek, zbytek je síťovitý a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květy jsou 5tičetné, květenství je samčí nebo samičí (i smíšené), úžlabní až prakticky vrcholové, bohatě větvené, 5 - 60tikvěté, drobně ochlupené, listeny jsou vejčité, špičaté, dlouhé 2mm, široké 1mm, samčí květenství je dlouhé do 4cm, latnaté, 30 - 60tikvěté, samčí květy jsou prakticky přisedlé, velikosti 1 - 1,5mm, laloky jsou dlouhé 1 - 1,5mm, široké 0,5mm, smíšená i samičí květenství jsou hroznovitá, 5 - 10tičetná, samičí květy jsou vejčitěkuželovité, dlouhé 2mm, široké 1mm, laloky vejčité, špičaté, dlouhé 0,5 - 1mm a široké 0,5mm. Plody jsou vejčité, modré až růžovofialovočerné, dlouhé 0,7 - 1,2cm a mají stopku délky 2 - 6mm.

<https://www.rostliny.net/>