

Celtis tenuifolia (Břestovec jemnolistý)

synonyma: *Celtis americana*, *Celtis fuscata*, *Celtis georgiana*, *Celtis grandidentata*, *Celtis longifolia*, *Celtis occidentalis* subsp. *georgiana*, *Celtis occidentalis* subsp. *tenuifolia*, *Celtis occidentalis* var. *georgiana*, *Celtis occidentalis* var. *grandidentata*, *Celtis pumila* var. *georgiana*, *Celtis salicifolia*, *C. var. georgiana*, *C. var. soperi*, *C. var. tenuifolia*

čeleď: Ulmaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA v podobě keře (i stromu) s obvykle 1/2kulatým od země řídce větveným habitem. Dorůstá výšky 5 - 8 (i 10)m. Listy jsou vejčité až kopinaté, tupé nebo špičaté, občas s několika krátkými zuby, drsné, tmavě šedozelené, dlouhé 2 - 8cm a spodní strana je také šedozelená. Plody jsou tmavěoranžové až hnědé, široké 5 - 9mm, mají 0,3 - 1,3cm stopku, pecky béžové, dlouhé 5 - 7mm a široké 5 - 6mm.

<https://www.rostliny.net/>