

Bactris acanthocarpa

čeleď: Arecaceae

oblasti: Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Francouzská Guyana, Guyana, Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste v Jižní Americe v podobě trsnaté až 1kmenné palmy. Kmeny bývají krátké, podzemí, občas dorůstají výšky až 1m při průměru 3 - 6m. Listy vyrůstají po 5 - 15ks, pochvy, řapíky a vřete mají husté černé trny délky do 15cm, čepel tvoří 3 - 33 párů úzce kopinatých asymetricky vyrůstajících lístků. Květenství tvoří 10 - 46 větví. Plody jsou široce obvejčité, krátce trnité, oranžové nebo červené a průměru 1 - 1,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *exscapa*

- var. *trailiana*/B. *trailiana* - Kolumbie, Venezuela, Guyany, Brazílie a Bolívie; 1 kmen zpravidla podzemní kmen, vzácně s výškou až 2m a průměrem 7cm; listy vyrůstají po 7 - 10ti ks, jsou jednoduché, pochvy, řapíky a vřetena mají řídké černé trny délky do 5cm; květenství má 23 nitkovitých větví; plody široce obvejčité, červenooranžové, průměru 1,5cm a drobně černě trnité

<https://www.rostliny.net/>