

Crataegus azarolus (Hloh středozeemský)

synonyma: *Azarolus crataegoides*, *Azarolus crataegoides* var. *dulcis*, *Azarolus crataegoides* var. *florifera*, *Azarolus crataegoides* var. *intermedia*, *Azarolus crataegoides* var. *macrocarpa*, *Azarolus crataegoides* var. *malus*, *Azarolus crataegoides* var. *pyriformis*, *Azarolus crataegoides* var. *torulosa*, *Azarolus maroccana*, *C. var. ruscinonensis*, *Crataegus oxyacantha* var. *azarolus*, *Crataegus ruscinonensis*, *Lazarolus oxyacanthoides*, *Mespilus azarolus*, *Mespilus azarolus* var. *erythrocarpa*, *Pyrus azarolus*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Arménie, Egypt, Gruzie, Írán, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Sinajský poloostrov, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste v jižní Evropě, severní Africe a západní Asii v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky i šířky 3 - 7 (i 10)m v rozložitém habitu s 1/2kulatou korunou. Borka je šedohnědá, rozpukaná. Větve jsou trnité, v mládí slabě plstnaté. Palisty jsou srpovité, hrubě pilovité a dlouhé 0,5 - 1cm. Střídavé listy jsou 2x laločnaté, celkového vejčitého tvaru, délky (1,5 -) 3 - 7 (i 8)cm, jako mladé jsou oboustranně ochlupené, horní strana je lesklá, zelená a spodní strana na žilkách ochlupená. Květenstvím je plstnatá chocholičnatá 3 - 18tičetná lata, vlastní květy jsou bílé o průměru 1 - 1,5 (i 2)cm, stopky plstnaté, kališní lístky jsou 3úhlé, špičaté, dlouhé 2 - 3mm a korunní lístky jsou dlouhé 4 - 6mm. Plodem je červenooranžová až žlutá prakticky kulatá bobule o průměru (1 -) 2 - 2,5 (i 3)cm a obsahuje 1 - 3 pečičky. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aronia*
- var. *chlorocarpa*
- 'Julietta' - plody červené, aromatické
- var. *pontica*
- var. *sinaica*/C. *macrosperma*/C. *sinaica* - výška 2 - 5m; větve mají silné trny délky do 3,5cm; listy zelené, občas i celokrajné, zpravidla mírně 3laločné; květenství 5 - 8mičetné; plody eliptické, načervenalé a dlouhé 6 - 7mm
- 'White Italian' - plody bílé

<https://www.rostliny.net/>