

## Crataegus flabellata (Hloh vějířovitý)

synonyma: *Crataegus blandita*, *Crataegus coccinea* var. *flabellata*, *Crataegus crudelis*, *Crataegus densiflora*, *C. var. densiflora*, *C. var. grayana*, *Crataegus grayana*, *Mespilus flabellata*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v na východě Severní Ameriky v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 8m. Větve jsou zprohýbané a v mládí holé. Trny jsou mírně hákovité a dlouhé 3 - 10cm. Listy jsou vejčité až kosočtvercovité, 2x pilovité, v mládí ochlupené, dlouhé 3 - 7cm, mají 3 - 6 párů špičatých ostře laločnatých laloků a řapíky jsou dlouhé 1 - 3cm. Květenství je 5 - 15tikvěté, vlastní květy mají průměr 1,5 - 2cm, kališní cípy jsou celokrajné, drobně pilovité a mají 10 - 20 tyčinek. Plody jsou kulovité nebo eliptické, červené, průměru 0,8 - 1,2cm a mívají 2 - 3 pečičky. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *grayana* - květy mají 20 tyčinek; plody kulaté

<https://www.rostliny.net/>