

Rhus aromatica (Škumpa aromatická)

čeleď: Anacardiaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe v podobě poléhavého až plazivého přízemního hustého keře. Dorůstá výšky 1 (i 4)m. Větve jsou v mládí jemně ochlupené, později hnědočervené. Listy jsou 3četné, aromatické, na podzim žlutočervené, vlastní lístky jsou dlouhé 2,5 - 9cm, postranní vejčité, přisedlé, centrální vejčitý až obvejčitý, hrubě vroubkovaně pilovitý až hluboce 3laločný, dlouhý 7cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je lata z klasů délky 0,5 - 6cm, vlastní květy jsou žluté, korunní lístky jsou drobné a dlouhé 1,5 - 3mm. Plody jsou kulovité, jemně ochlupené, suché, červené a široké 6 - 9mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aromatica*/var. *illinoensis*/*Schmaltzia creanata*
- 'Grow-low'/'Grow Low' - široký, nízký, půdokryvný habitus; výška 60 - 90cm; listy zelené, lesklé, na podzim červenooranžové; plody červené a ochlupené
- 'Konza' - nízký kompaktnější habitus
- 'Laciniata' - lístky vejčitékopinaté
- var. *serotina* - vzpřímený habitus; lístky na spodní straně mohou být ochlupené; květy žluté, aromatické
- var. *simplicifolia* - postranní lístky malé (občas i menší než 1/2 délky centrálního anebo i delší než 2,5cm); plody široké 7 - 8mm

<https://www.rostliny.net/>