

# Sinarundinaria (Rákosovec čínský)

synonyma: Fargesia

čeleď: Poaceae

Roste Číně a Himálaji jako bambus. Z každé uzliny vyrůstá několik větví. Listy jsou holé, mají 2 - 4 páry žilek, pochvy jsou štětinaté a na zimu téměř všechny listy opadávají. Květenstvím je vrcholová lata.

Množí se dělením trsů.

Potřebuje polostín, chráněné místo a dostatek vody.

## Sinarundinaria murielae

synonyma: Arundinaria murielae, Arundinaria spathacea, Fargesia murielae, Fargesia spathacea, Thamnocalamus spathaceus

oblasti: Střední Čína

Pochází z Číny. Dorůstá výšky 3m. Kmínky jsou žluté, v mládí ochlupené. Listy jsou zašpičatělé, dlouhé 7 - 12cm, široké 1 - 1,5cm, řapíkaté, pochvy holé a brvité. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Elias' - kompaktní později kupkovitý habitus; výška 50 - 60cm, šířka 1m; pomalý růst
- 'Jumbo' - mohutný hustý vysoký vzpřímený habitus; listy sytě zelené
- 'Simba' - kompaktní hustý habitus; výška 1,25 - 2m; rozrůstá se do šíře

## Sinarundinaria nitida (Sinarundinarie lesklá)

synonyma: Arundinaria nitida, Fargesia nitida, Fargesia spathacea, Thamnocalamus nitidus

oblasti: Himálaj, Z Čína

Pochází z Číny a Himálaje. Dorůstá výšky 2,5 - 3 (i 6)m. Stébla jsou vzpřímená, hnědočerná, ve 4. roce bezlistá, pochvy jsou načernalé, jemně ochlupené a se zprohýbanými štětinami. Listy jsou zelené až tmavězelené, dlouhé 4 - 11cm, široké 0,6 - 1,2cm, spodní strana je šedozelená a žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek. Květenství je listnaté. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Nymphenburg' - výška 2,5m, převislý

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=634>

<https://www.rostliny.net/>