

## Ribes aureum (Meruzalka zlatá)

synonyma: Chrysobotrya aurea, Chrysobotrya intermedia, Chrysobotrya lindleyana, Chrysobotrya odorata, Chrysobotrya revoluta, Coreosma longiflora, Coreosma longifolia, Coreosma odorata, R. var. longiflorum, R. var. tenuiflorum, Ribes flavum, Ribes fragrans, Ribes longiflorum, Ribes odoratum, Ribes odoratum var. intermedium, Ribes palmatum, Ribes tenuiflorum

čeleď: Grossulariaceae

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Čína, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Tennessee, Texas, Utah, V Sibiř, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste v USA, Kanadě a východní Asii v podobě vzpřímeného opadavého zpravidla vystoupavého keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 1 - 2 (i 3)m. Větve jsou v mládí žlutohnědé a ochlupené. Borka je hnědočervená, později našedlá a odlupuje se. Listy jsou střídavé, jednoduché, široce 3úhle vejčité až obvejčité nebo ledvinité, 3 (i 5)laločné, na vrcholu hrubě zubaté, zelené, oboustranně lesklé, tuhé, dlouhé i široké 3 - 5 (i 7)cm, báze široce klínovitá až mírně uťatá nebo prakticky srdčitá, spodní strana je hustě žláznatá, řídce ochlupená, řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm a na podzim nabývají odstínů žluté, oranžové a červené. Květenstvím je (1 -) 5 - 12 (i 18)tikvětý hrozen délky (4 -) 5 - 6 (i 7)cm, vlastní květy jsou obouphlavné, žlutozelené, průměru (1 -) 1,6 - 2cm, korunní lístky zpravidla načervenalé, listeny dlouhé do 1,2cm, kališní lístky jsou dlouhé 4 - 7,8mm, široké 2 - 3,5mm, korunní lístky jsou dlouhé 2 - 4mm a široké 1 - 1,8mm. Plodem je jedlá, růžovofialovočervená, hnědá až černá kulovitá bobule průměru 0,5 - 1cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Crandall' - plody průměru do 1,5cm
- 'Golden Current'
- var. gracillimum/R. gracillium - Kalifornie; bohatě větvený keře; větve v mládí šedé, později hnědé; listy vejčité až prakticky kulaté, 3laločné, zubaté, na bázi zpravidla klínovité, řapíky slabé, délky čepele; hrozny 5 - 15tikvěté, dlouhé do 5cm, krátce stopkaté, listeny vejčité až eliptické, dlouhé 5 - 9mm, květy žlutočervené, kališní lístky eliptické, dlouhé 3 - 4mm, korunní lístky obvejčité; plody žluté
- 'Chrysococcum'/var. chrysococcum - plody žluté až žlutooranžové
- 'Leiobotrys'/R. leiobotrys - větve v mládí holé, občas řídce žláznaté; kališní cípy zpětně ohnuté; plody černé
- 'Xanthocarpum' - plody žluté až naoranžovělé

Nepotřebuje žádnou specifickou půdu, pouze nesmí být suchá. Ideální je neutrální až kyselá, vlhká a bohatá na živiny. Dokáže prosperovat i ve stínu.