

Ribes cynosbati

čeleď: Grossulariaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě v podobě široce 1/2kulatého keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Větve bývají v mládí slabé, mírně převislé a mají 1 - 3dílné slabé ostny délky 1cm. Listy jsou kulaté, zastřižovaně pilovité, ochlupené, 3 - 5tilaločné, široké 3 - 5cm, báze uťatá nebo srdčitá, laloky vroubkovaně zubaté nebo zastřižované a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 3,5cm. Květenstvím je 2 - 3četný hrozen, listeny jsou malé, vejčité, vlastní květy mají kališní lístky hnědozelené, podlouhlé a korunní lístky obvejčité. Plodem je kulatá až eliptická červená jedlá bobule průměru 1cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. inerme/var. inerme - plody bez štětín

<https://www.rostliny.net/>