

Rubus acuminatus

synonyma: *Rubus betulinus*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Čína, Nepál, Sikkim, Vietnam

Roste v Číně, Indii, Nepálu a Vietnamu v podobě popínavého keře. Ostny jsou řídké a zahnuté. Palisty jsou šídlovité, opadavé a dlouhé 5mm. Listy jsou vejčité, ocasovité, dlouhé 6 - 13cm, široké 3 - 6cm, báze zakulacená nebo uťatá a řapíky jsou dlouhé 1,2 - 1,6cm. Květenstvím je chudě větvená vrcholová lata nebo hrozen délky 6 - 15cm, vlastní květy mají 0,8 - 2cm stopku, listeny šídlovité, dlouhé 6mm, kališní cípy 3úhlé, dlouhé 4 - 5mm, na okraji ochlupené, korunní lístky jsou bílé, délky kališních. Plody jsou červené, schované v kalichu a tvoří je 5 - 8 peckoviček. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *acuminatus*/*R. betulinus* - stopky květů a kalich zpravidla holé; okraj listu ostře pilovitý
- var. *puberulus* - stopky květů a kalich vně drobně ochlupený, okraj listu hrubě pilovitý

<https://www.rostliny.net/>