

Calendula arvensis (Měsíček rolní)

synonyma: *Calendula aegyptiaca*, *Calendula alata*, *C. subsp. aegyptiaca*, *C. subsp. bicolor*, *C. subsp. hydruntina*, *C. subsp. macroptera*, *C. subsp. malacitana*, *C. subsp. micrantha*, *C. subsp. sublanata*, *Calendula ceratosperma*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Estonsko, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Makedonie, Manitoba, Maroko, Moldávie, Německo, Polsko, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Velká Británie

Roste v jižní a střední Evropě jako jednoletka. Dorůstá výšky (5 -) 10 - 25 (i 60)cm. Lodyžní listy jsou střídavé, podlouhlé až mírně kopinaté, na bázi přisedlé, uťaté až klínovité, řídce mělce zubaté s nezvlněnými okraji. Kvete žlutými až světle oranžovými květy v úboru o průměru (1 -) 1,5 - 2 (i 2,5)cm. Plodem je nažka, vnější jsou úzké, dovnitř zahnuté, na hřbetě dlouze ostnitě, nápadně zobánkaté, střední jsou kratší, podkovovitě zahnuté, křídlaté, na hřbetě krátce osténkaté nebo hrbolkaté, vnitřní nejmenší, prakticky stočené do prstence, nekřídlaté, na hřbetě hrbolkaté. Léčivé účinky nejsou tak výrazné jako u *C. officinalis*. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *arvensis* (Měsíček rolní pravý)
- var. *bicolor*

- subsp. *macroptera*

Vyhovují mu narušená místa.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>