

Cotoneaster insignis (Skalník výborný)

synonyma: *Cotoneaster arborescens*, *Cotoneaster insignoides*, *Cotoneaster lindleyi*, *Cotoneaster nummularia*, *Cotoneaster nummularia* var. *lindleyi*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Afganistán, Himálaj, Indie, Írán, Turkestán

Roste ve střední Asii, Íránu, Afghánistánu, Indii a Himálaji v podobě opadavého nebo poloopadavého keře nebo nízkého stromu. Dorůstá výšky 4 - 6m. Větve jsou vystoupavé nebo polopřevislé, hnědé, s lenticelami, v mládí ochlupené až bíle plstnaté. Listy jsou papírovité, na sterilních větvích široce obvejčité až zakulacené, konec může být zakulacený, uťatý nebo zahrocený, báze je zakulacená nebo klínovitá, horní strana mírně vrásčitá, zelená nebo světlezelená, matná, mírně lesklá. olysávající, žilnatinu tvoří 5 - 7 mírně zapuštěných párů žilek, spodní strana je bledězelená, v mládí šedožlutě plstnatá, řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,1cm. Květenství je 4 - 25tičetné. Květy mají 4 - 7mm stopky, pohárkovitou chlupatou češuli, špičaté kališní lístky s bělavým okrajem a fialovým koncem, poupata jsou bílá, koruna má velikost 0,8 - 1cm, okvětní lístky jsou rozložené a bílé. Plody jsou kulovité, zploštělé, červenofialovočerné, modravě ožíněné, velikosti 7 - 9mm.

<https://www.rostliny.net/>