

Cotoneaster integerrimus (Skalník celokrajný)

synonyma: Cotoneaster cotoneaster, Cotoneaster integerrima, C. var. erythrocarpus, Cotoneaster intermedius, Cotoneaster villosus, Cotoneaster vulgaris, Cotoneaster vulgaris var. erythrocarpus, Cotoneaster vulgaris var. haematocarpus, Cotoneaster zabelii, Gymnopyrenium vulgare, Mespilus cotoneaster, Ostinia cotoneaster

čeleď: Rosaceae

oblasti: Balkánský poloostrov, Česká republika, Finsko, Hebei, Heilongjiang, Írán, Itálie, Katalánsko, Kavkaz, Korea, Krym, Malá Asie (Anatolie), Německo, Polsko, Qinghai, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, V Karpaty, Vnitřní Mongolsko, Xinjiang

Roste v Evropě, Číně, Koreji a Rusku v podobě opadavého vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1,5 (i 3)m. Větve jsou hnědočervené, v mládí žlutozelené a plstnaté. Listy jsou drobné, vejčitě kulovité až široce špičaté, zašpičatělé, na špičce mohou být jemně pilovité, dlouhé 1,5 - 4 (i 5,5)cm, široké 1 - 3,8cm, báze zakulacená, žilnatinu tvoří 4 - 6 hluboce zapuštěných páru žilek, spodní strana hustě ochlupená a řapíky jsou dlouhé 2 - 8mm. Květenstvím je 2 - 7četný chocholík. Květenstvím je 1 - 5tikvětý chocholík v paždí listů, vlastní květy mají 0,3 - 1,5cm stopku, jsou pohárkovité, růžové, zvonkovité, 5tičetné, kališní lístky jsou tupé, korunní lístky jsou vzpřímené a dlouhé 2 - 3mm. Plodem je převislá zploštěle kulovitá červenooranžová, červená nebo až fialová malvička o průměru 0,5 - 0,6 (i 1,1)cm obsahující 2 - 4 semena a zdužnatělý kalich. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Centennial' - výška 20 - 30cm, šířka do 4,5m; tmavé modrozelené listy; červené bohaté plodenství

Vyhovují mu doubravy, křoviny, skalnaté prudší jižní svahy, ideálně s vápenitým podkladem. Má rád teplo a světlo.

<https://www.rostliny.net/>