

Cotoneaster laxiflorus

čeleď: Rosaceae

oblasti: Mongolsko, S Asie, S Čína, Sibiř

Roste na Sibiři, v Mongolsku a Číně v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 2 - 2,5m. Větve jsou vzpřímené, rozkladité, hnědé, s lenticelami, v mládí chlupaté. Listy jsou papírovité až téměř kožovité, na sterilních větvích široce eliptické, špičaté nebo tupé, báze je tupá, okraj může být zvlněný, horní strana je zelená, mírně svrasklá, matná, v mládí řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek, spodní strana je šedozelená, hustě huňatá, řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm, celková délka je 3,4 - 6,2cm a šířka 2,5 - 4cm. Květenství je převislé, 10 - 30tičetné, volné. Květy mají 0,5 - 2cm stopky, včetně češule délku 5 - 6mm, češule je nálevkovitá, holá, kališní lístky tupé nebo špičaté, holé, okraj huňatý, okvětní lístky vzpřímené až polorozložené, růžové. Plody jsou kulovité nebo obvejčité, červené, ožíněné, holé, velké 0,7 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>