

Cotoneaster lucidus (Skalník lesklý)

synonyma: *Cotoneaster acutifolius*, *Cotoneaster acutifolius* var. *lucidus*, *Cotoneaster acutifolius* var. *typicus*, *Cotoneaster nigrus* var. *acutifolius*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Kolorado, Polsko, S Asie, V Sibiř, Wisconsin

Roste na východní Sibiři v podobě opadavého hustě větveného keře. Dorůstá výšky až 3m. Větve jsou vystoupavé, polopřevislé, v mládí chlupaté, zelenošedé až hnědé. Listy bývají 2řadé, vejčité až eliptické, špičaté, báze je klínovitá nebo tupá, horní strana lesklá, zelená, mírně vrásčitá, téměř holá, spodní strana bílozelená, řídce ochlupená, olysává, řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm a celková délka je 2 - 7cm. Květenství je 3 - 12 (i 15)tičetné. Květy mají 0,5 - 1,2cm stopky, bělorůžovou barvu, kalich holý nebo řídce ochlupený, kališní lístky špičaté, holé. Plody jsou černé, kulovité, vejčité nebo eliptické, lesklé, neojíněné, velké 0,8 - 1cm a obsahují 3 - 4 pecky.

<https://www.rostliny.net/>