

Cotoneaster nebrodensis (Skalník plstnatý)

synonyma: *Cotoneaster parnassicus*, *Cotoneaster polyanthemus*, *Cotoneaster tomentosus*, *Mespilus tomentosa*, *Pyrus nebrodensis*

čeleď: Rosaceae

oblasti: Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko, Švýcarsko

Patří mezi endemity Itálie, ale rozšířil se i jinde ve střední a jižní Evropě v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2 (i 3)m. Větve jsou až 2m dlouhé, vzpřímené, vystoupavé nebo rozkladité, zelenohnědé až hnědé, s lenticelami, v mládí plstnaté. Listy jsou téměř okrouhlé, eliptické nebo široce vejčité, na konci tupé (vzácně špičaté), báze tupá, okraj celokrajný, na horní strana v mládí bíle plstnaté, později tmavězelené, na spodní strana na okraji žlutošedě nebo nazelenale plstnaté, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů, žilek, řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm, celková délka je 2 - 6,5cm a šířka 1,5 - 4,8cm. Květenstvím je 2 - 15tičetný chocholičnatý hrozen. Květy jsou zvonkovité, bledě růžové až téměř bílé, stopky mají délku 0,8 - 1cm, okvětní lístky jsou bílé. Plody jsou kulovité nebo obvejčité, červené, hustě bíle ochlupené, v průměru mají 0,6 - 1,2cm a obsahují 3 - 5 pecek.

<https://www.rostliny.net/>