

Rheum (Reveň)

čeleď: Polygonaceae

Pochází z východní Asie. Listy vyrůstají na dlouhém dužnatém řapíku, který je kulatý a z jedné strany sploštělý. Listy mají velké rozměry s výraznou žilnatinou a jejich kraje jsou různým způsobem vykrajované nebo zvlněné. Kvete mohutnými laty složenými z hroznů. Květy mají barvu bílou nebo červenou v kombinaci se zelenou. Plodem je křídlatá nažka.

Rheum acuminatum

synonyma: R. orientalexizangense

Rheum alexandrae

Rheum altaicum

synonyma: R. rhaponticum

Rheum australe (Reveň jižní)

synonyma: R. emodii

oblasti: Nepál

Pochází z Nepálu. Řapík má oblý, hranatý a zbrázděný. List má téměř pravidelný kruhový tvar, u řapíku výrazně srdčitý. Kraj je zvlněný, svrasklý. Spodní strana žilkování je červená.

Rheum compactum (Reveň směstnaná)

synonyma: R. nutans, R. orientale

oblasti: Altaj, J Sibiř, Kazachstán

Pochází z jižní Sibiře. Řapík je na rubu zbrázděný. List má plstnatý povrch u řapíku srdčitý.

Rheum cordatum

oblasti: Kazachstán

Rheum delavayi

synonyma: R. strictum

Rheum forrestii

Rheum glabricaule

Rheum globulosum

Rheum hotaoense

Rheum hybridum (Reveň zvrhlá)

Řapík je polooblý, na vrchní straně brázditý. List je oválný, u řapíku srdčitý.

Rheum inopinatum

Rheum kialense

synonyma: R. micranthum, Rumex cacaliifolius

Rheum laciniatum

Rheum lhasaense

Rheum likiangense

synonyma: R. ovatum

Rheum lucidum

synonyma: R. korshinskyi

Rheum macrocarpum

synonyma: R. ferganense, R. lobatum, R. nuratavicum, R. plicatum, R. vvedenskyi, R. zergericum

Rheum maculatum

Rheum maximowiczii

oblasti: Ťan-šan

Rheum moorcroftianum

Rheum nanum

synonyma: R. cruentum, R. leucorrhizum

Rheum nobile

Má vysoký svíčkovitě tvarovaný hroznový bílý květ.

Rheum officinale

Rheum officinalis (Reveň lékařská)

Rheum palaestinum

oblasti: Palestina

Rheum palmatum (Reveň dlanitá)

synonyma: R. potaninii, R. qinlingense

oblasti: SZ Čína

Pochází ze severozápadní Číny. Patří mezi trvalky. Dokáže dorůst až do 2 - 3m výšky. Kveté na vysokých stonkách drobnými zelenočervenými květy podobnými šťovíku. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Atrosanguineum'
- var. tanguticum - výška 1,5m, kvete červenými květy

Vyhovuje ji humózní a vlhká půda, která by na zimu naopak neměla koncentrovat vodu. Odolává mrazům do -15°C.

Kořeny se používají k léčebným účelům při léčení zánětů žaludeční a střevní sliznice nebo při menstruačních poruchách. Nesmí se používat u těhotných nebo kojících žen.

Rheum persicum

oblasti: Írán

Rheum przewalskyi

Rheum pumilum

Rheum racemiferum

Rheum reticulatum

Rheum rhabarbarum (Reveň kadeřavá)

synonyma: Rhabarbarum verum, R. franzenbachii, R. franzenbachii var. mongolicum, R. undulatum, R. undulatum var. longifolium

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Illinois, Indiana, Kansas, Kolorado, Maine, Manitoba, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mongolsko, Německo, New Hampshire, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, S Asie, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Roste v Mongolsku a střední Asii jako samosprašná trvalka. Dorůstá výšky 0,3 - 0,9 (i 2)m. Kořeny dokáží dosáhnout hloubky až 2m. Listy jsou přízemní, zkadeřené, dlouhé 30 - 40cm, mají zelené nebo načervenalé řapíky, které se využívají v kuchyni jako náplň do buchet nebo na koláče. Kvete žlutými květy v mohutné latě. Plodem je 3křídlá a 3boká nažka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Cyclop'
- 'Dawes Challenge'
- 'Holštýnská krev'
- 'Jara' - červené řapíky
- 'The Sutton' - zelené řapíky
- 'Viktoria'

Vyhovuje ji vlhká hlinitá až těžká vápenitá půda bohatá na živiny. Při sklizni se listy vylamují a rostlině jich ponecháme zhruba 2/3ks.

Množí se dělením trsů nebo semeny.

Rheum rhaponticum (Reveň tupolistá)

oblasti: Balkánský poloostrov, Bulharsko, J Sibiř

Pochází z jižní Sibiře z oblasti Rapontika a možná z Bulharska. Řapík je polooblý, na spodní straně sploštělý a vrchní zbrázděný. Listy jsou okrouhlé a hluboce srdčité až široce vejčité.

Rheum rhizostachyum

synonyma: R. aplostachyum

Rheum rhomboideum

Rheum ribes

oblasti: Írán, Turecko

Rheum spiciforme

synonyma: R. scaberrimum

oblasti: Kyrgyzstán, Ťan-šan

Rheum subacaule

Rheum subanceolatum

Rheum tanguticum

synonyma: R. palmatum f. rubiflora, R. palmatum subsp. dissectum, R. tanguticum var. viridiflorum

Rheum tataricum

synonyma: R. caspicum, R. songaricum

oblasti: Kazachstán

Rheum tibeticum

Rheum turkestanicum

synonyma: R. megalophyllum, R. renifolium, R. rupestre, R. turanicum

oblasti: Írán

Rheum undulatum (Reveň čeřitá)

oblasti: J Sibiř, Mongolsko, Střední Asie, V Sibiř

Pochází z jižní Sibiře. Dorůstá výšky 1,5m. Listy jsou mohutné, vejčité až 3úhlé, mírně bublinaté, široké až 50cm, řapík má polooblý tvar a spodní strana je chlupatá.

Rheum uninerve

Rheum webbianum

Rheum wittrockii

oblasti: Kazachstán, Ťan-šan

Rheum x hybridum

Rheum yunnanense

Další informace:

<http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/326356-rheum>

<https://www.rostliny.net/>