

Camellia furfuracea

synonyma: *Camellia bolovenensis*, *C. var. furfuracea*, *C. var. lutea*, *Camellia oblata*, *Camellia parafurfuracea*, *Camellia polypetala*, *Camellia pubisepala*, *Camellia suaveolens*, *Thea bolovenensis*, *Thea furfuracea*, *Theopsis furfuracea*

čeleď: Theaceae

oblasti: Guangdong, Guangxi, Laos, Vietnam

Roste v Číně, Laosu a Vietnamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 7m. Větvě jsou šedožluté až šedohnědé. Listy jsou vejčité, eliptické, podlouhlé nebo obvejčité, zašpičatělé, drobně pilovité až zvlněně zubaté, tmavězelené, lesklé, dlouhé 8 - 15cm, široké 3 - 5,5cm, báze klínovitá, spodní strana světlezelená, hnědě tečkovaná a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květy úžlabními nebo prakticky vrcholovými samostatnými nebo párovými prakticky přisedlými květy o průměru 2 - 3,5cm, mají 9 - 10 listenců i kališních lístků, jsou 1/2kulaté až kulaté, kožovité, na okraji blanité, dlouhé 0,2 - 1cm, korunních lístků je 7 - 10ks, jsou obvejčité, zakulacené, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 1 - 1,5cm a na bázi v délce 2 - 4mm srostlé. Plodem je kulovitá až 1/2kulatá tobolka o průměru 2 - 4cm a obsahuje tmavěhnědá 1/2kulatá semena o průměru 1,1 - 1,8cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *furfuracea*/var. *lutea*/*C. oblata*/*C. parafurfuracea*/*C. polypetala*/*C. pubisepala*/*Thea bolovenensis*/*Thea furfuracea* - Čína, Laos, Vietnam; listy eliptické, zašpičatělé, na bázi klínovité a řapíky dlouhé 0,6 - 1cm
- var. *latipetiolata*/*C. latipetiolata* - Guangdong, Guangxi; listy eliptické, zašpičatělé, kožovité, na bázi zakulacené až mírně srdčité a řapíky dlouhé 5mm
- var. *shanglinensis* - Guangxi; listy mírně vejčité, zahnutě zašpičatělé, kožovité, dlouhé 7,5 - 11,5cm, široké 3,5 - 5cm a báze široce klínovitá až prakticky zakulacená

<https://www.rostliny.net/>