

Abutilon pictum

synonyma: Abutilon pleniflorum, Abutilon pseudostriatum, Abutilon striatum, Abutilon striatum f. palmatifidum, Abutilon thompsonii, Abutilon venosum, Abutilon venosum var. brevicalyx, Abutilon venosum var. lanatum, Sida picta, Sida striata

čeleď: Malvaceae

oblasti: Argentina, Brazílie, Uruguay

Pochází z Brazílie, Uruguaye a Argentiny. Roste v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky až 5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou úzké, dlouhé 8mm. Listy jsou 3 - 5 (i 7) laločnaté, pilovité, zelené, řídce ochlupené, dlouhé 5 - 15cm a řapíky jsou dlouhé 3 - 5cm. Kvete žlutočervenými převislými květy o průměru 3cm s 5ti okvětními lístky délky 2 - 4cm na 7 - 10cm dlouhé stopce. Plody nejsou známy. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aureomaculatum' - listy mají žluté skvrnky
- 'Gold Dust' - listy jsou bledězelené, hustě žlutě tečkované
- 'Goldprince' - zakrslý; listy mají béžové skvrny
- 'Pleniflorum' - listy mohou být skvrnitě; plnokvětý
- 'Thompsonii' - listy žlutě skvrnitě; květy mají červené žilkování

<https://www.rostliny.net/>