

Asplenium trichomanes (Sleziník červený)

čeleď: Aspleniaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Aljaška, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Černá Hora, Česká republika, Dánsko, Delaware, Estonsko, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Grónsko, Gruzie, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, JZ Rusko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kavkaz, Kentucky, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Kyrgyzstán, Labrador, Libanon, Litva, Lotyšsko, Louisiana, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Makedonie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Moldávie, Montana, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Palestina, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Z Rusko, Západní Virginie

Roste v Evropě, Asii a Kanadě. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Listy vytvářejí stálezelenou nebo poloopadavou růžici listů, vlastní list má délku (5 -) 8 - 25 (i 30)cm, je 2 - 4x zpeřený, vřeteno je po celé délce tmavohnědě až červenohnědě, lesklé a mírně křídlaté, vlastní lístky jsou vstřícné i střídavé a přisedlé. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. hastatum (Sleziník červený hrálovitý) - téměř nezužující se čepel, listy dlouhé 2,5 - 15cm tvořící nálevkový trs, lístky trojúhelníkové, okrouhlé až hrálovité; vápencové zdi a skalky
- subsp. inexpectans (Sleziník červený vápencový) - nezúžená čepel, délka listů 7- 12cm, stejně velké lístky; vápencové skalky a sutě
- subsp. moravicum
- subsp. pachyrachis
- subsp. quadrivalens
- subsp. trichomanes (Sleziník červený pravý) - čepel se zužuje, okrouhlé lístky velikosti 2,5 - 7cm; nevápnnité horniny
- subsp. pachyrachis (Sleziník červený zakřivený) - zakřivené listy přitisklé k zemi, lístky 2 - 4x delší než široké; vápencové skalky, patří mezi chráněné druhy C1
- subsp. quadrivalens (Sleziník červený tmavohnědý) - čepel zúžená spíše pouze při vrcholu, eliptické lístky délky 0,4 - 1,2cm

Vyhovují mu stíněné štěrbiny skal, zdi a sutí, ideálně vápencové. Dokáže růst jak v polostínu, tak na slunci. Ideální teplota pěstování je 20 - 25°C, v zimě by neměla klesnout pod 18°C. Zálivu potřebuje bohatou společně s vyšší vlhkostí vzduchu. Zmírníme ji jenom v době zimy. Hnojíme 2x měsíčně.