

Ixora (Pobyška)

čeleď: Rubiaceae

Roste v Africe, Asii, Karibiku, Jižní Americe, Madagaskaru a Tichomoří v podobě stálezeleného keře nebo nízkého stromu. Palisty bývají srostlé, zpravidla uvnitř žláznaté a mohou být opadavé. Listy jsou zpravidla vstřícné (i v 3četných přeslenech), eliptické až kopinaté, mohou být řapíkaté a zpravidla kožovité. Květenství je přisedlé až stopkaté, vrcholové (i úžlabní), chocholík nebo lata složená z menších bílých, žlutých, oranžových, růžových nebo červených stopkatých květů se slabou dlouhou trubkou, 4 (i 5)ti laloky, kalich je 4zubý, trubkovitý a vytrvalý. Plodem je mírně dužnatá kulovitá, eliptická nebo vejčitá peckovice obsahující 1 - 2 černá nebo červená semena. Vyšlechtilo se také velké množství kultivarů. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Sunkist' - keř; výška až 0,6 (i 1)m; listy kopinaté až mírně obvejčité, lesklé, zelené; kompaktní chocholičnatý vrcholík, květy růžově žluté, později červené, koruna má trubku délky 2,2 - 3,3cm

Vyhovuje jí plné slunce nebo polostín a dobře propustná půda bohatá na živiny. Teplotním minimem je 13 - 16°C.

Množí se semeny nebo 1/2dřevitými řízkami.

Ixora accedens

Ixora aciculiflora

Ixora ackeringae

synonyma: Pavetta ackeringae

Ixora acuminata

oblasti: JV Asie, Portoriko

Roste v tropické Asii v podobě keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou eliptické a dlouhé do 20cm. Květenstvím je chocholičnatý až téměř hlávkovitý vrcholík, vlastní květy jsou bílé a koruna má trubku délky 2 - 3,5cm.

Ixora acuminatissima

synonyma: I. gaillardii

Ixora acuminatus

Ixora acuticauda

Ixora aegialodes

Ixora agasthyamalayana

Ixora aggregata

synonyma: I. congesta, I. congesta var. maritima, I. micheliana

Ixora agostiniana

Ixora alba

synonyma: I. loureiroi

Ixora albersii

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii v podobě stromu. Dorůstá výšky 3,5 - 10m. Borka je hnědožlutá a korkovitá. Palisty mají uťatý okraj, délku 2 - 4mm a šídlový lalok délky 1 - 2,5mm. Listy jsou eliptické až mírně obvejčité, zašpičatělé (i zakulacené nebo špičaté), mírně lesklé, dlouhé 3,5 - 11cm, báze je tupá až špičatá a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1cm. Květenstvím je chocholík o průměru 2,5 - 4,5cm na 1,5 - 3,7cm stopce, vlastní květy mají max. 1mm stopku, listy podpírající květenství jsou eliptické až kulaté, dlouhé 3 - 5,8cm, široké 1,1 - 3,3cm, báze zakulacená (i tupá), řapíky dlouhé 1 - 2,5mm, listence 3úhlé až šídlovité, vlastní květy mají kalich s trubkou délky 2mm, laloky úzce 3úhlé až mírně šídlovité, dlouhé 1 - 1,3mm, koruna vně červená, uvnitř bílá nebo růžová, trubka dlouhá 1,3 - 2,2cm, laloky kopinaté až úzce vejčité, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 6,5 - 8mm a široké 3 - 4mm. Plody jsou široké 1,1cm a obsahují semena o průměru 7mm.

Ixora alejandroi

Ixora aluminicola

Ixora amapaensis

Ixora amherstiensis

Ixora amplexicaulis

Ixora amplexifolia

synonyma: I. coleopoda

Ixora amplidentata

Ixora ampliflora

Ixora amplifolia

Ixora andamanensis

Ixora aneimenodesma

Ixora aneityensis

Ixora angustilimba

Ixora aoupinieensis

Ixora aphylla

Ixora apoda

synonyma: Lachnastoma apodum

Ixora araguaiensis

Ixora archboldii

Ixora arestantha

Ixora asme

Ixora athroantha

oblasti: Západní Bengálsko

Roste v Indii v podobě keře nebo stromu. Borka je šedohnědá. Palisty jsou široce vejčité a dlouhé 0,8 - 1cm. Listy jsou podlouhlé až úzce eliptické, zašpičatělé, dlouhé 18 - 45cm, široké 7 - 15cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 3cm. Květenství je husté, kompaktní, dlouhé 6 - 9cm, široké 5 - 10cm, listeny čárkovité až nitkovité, dlouhé 0,5 - 1,2cm, listence dlouhé 2mm, koruna má

trubku délky 1 - 2mm, cípy délky 1 - 5mm, koruna je aromatická, bílá, trubka dlouhá 2,8 - 4,4cm, laloky podlouhlé a dlouhé 6 - 9mm.

Ixora auricularis

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 6m. Palisty jsou vejčité až široce 3úhlé, osinaté a dlouhé 0,7 - 1,8cm. Listy jsou střídavé, přisedlé, obkopynaté, úzce eliptické až mírně obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 10 - 23cm, široké 5 - 9cm, báze je srdčitě ouškatá a žilnatinu tvoří 10 - 13 párů žilek. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, široké 0,6 - 1,5cm, má 3 - 5cm stopku, na bázi se zakrnělými listy délky 3cm, listence jsou úzce kopinaté, dlouhé 1mm, vlastní květy mají max. 3mm stopku, kalich s hlubokými laloky, koruna je růžově fialově červená, trubka má délku 2 - 3cm, laloky jsou úzce obkopynaté, špičaté, dlouhé 7 - 7,2mm a široké 3 - 3,5mm. Plodem je kulovitá peckovice o průměru 6 - 8mm.

Ixora auriculata

Ixora aureorea

Ixora backeri

Ixora bahiensis

Ixora baileyana

synonyma: Lasianthus graciliflorus

Ixora balakrishnii

synonyma: I. roxburghii, I. villosa, I. villosa var. chevalieri

oblasti: Sikkim, Západní Bengálsko

Roste v Indii v podobě keře. Kmínky jsou ochlupené. Borka je šedě hnědá. Palisty jsou dlouhé 0,8 - 1,7cm. Listy jsou podlouhlé až úzce obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 11 - 32cm, široké 4 - 12cm, báze je klínovitá, spodní strana ochlupená, horní listy jsou přisedlé a spodní mají až 8mm řapík. Květenství je dlouhé 9 - 11cm, široké 9 - 15cm, listeny jsou dlouhé 2 - 5mm, kalich má trubku délky 1mm, koruna je aromatická, bílá, trubka dlouhá 2,3 - 2,6cm a laloky dlouhé 4 - 5mm. Plodem je peckovice šířky 5 - 7mm.

Ixora balansae

Ixora baldwinii

Ixora balinensis

Ixora bancana

Ixora banjoana

Ixora barbata

oblasti: Asie

Roste v tropické Asii v podobě keře. Dorůstá výšky až 2m. Listy jsou eliptické a dlouhé 15 - 20cm. Květenství je řídké, rozkladité, vlastní květy jsou bílé a koruna má trubku délky 2,3 - 3,2cm.

Ixora barberae

Ixora bartlingii

Ixora batesii

Ixora batuensis

Ixora bauchiensis

Ixora beckleri

oblasti: Nový Jižní Wales

Roste v Austrálii.

Ixora beddomei

Ixora bemangidiensis

Ixora betongensis

Ixora bibracteata

Ixora biflora

synonyma: I. biflora var. fleckeri, I. biflora var. typica

Ixora birmahica

Ixora blumei

synonyma: *I. arborescens*, *I. blumeana*, *I. grandifolia* var. *arborescens*, *I. macrocoma*, *I. odorata*, *I. valetonii*, *Pavetta arborescens*, *Pavetta macrocoma*, *Pavetta odorata*, *Pavetta odorata* var. *sumatrana*

Ixora borboniae

synonyma: *Myonima borboniae*, *Myonima lanceolata*, *Myonima myrtifolia*, *Myonima obovata*, *Myonima obovata* var. *longifolia*

Ixora borneensis

synonyma: *Pavetta borneensis*

Ixora bougainvilliae

Ixora brachiata

synonyma: *I. arnottiana*, *I. obtusata*

Ixora brachyantha

Ixora brachyanthera

Ixora brachycotyla

Ixora brachypoda

synonyma: *I. radiata*, *I. radiata* var. *latifolia*, *I. rhodesiaca*

Roste v podobě keře nebo stromu. Listy jsou podlouhlé, úzce eliptické nebo úzce kopinaté a dlouhé 12 - 34cm. Květenstvím je kompaktní hlávkovitý vrcholík, vlastní květy jsou bílé s růžovými nebo červenými skvrnkami a koruna má trubku délky 4,7 - 6,5cm.

Ixora brachypogon

synonyma: *I. timorensis* var. *pauciflora*

Ixora brachyura

Ixora bracteata

synonyma: *Charpentiera bracteata*, *I. bracteata*

Ixora bracteolaris

Ixora bracteolata

Ixora brandisiana

Ixora brassii

Ixora brevicaudata

Ixora brevifolia

synonyma: I. glaziovii, I. membranacea, I. thyrsoidea, I. warmingii

Ixora breviloba

Ixora brevipedunculata

oblasti: Tichý oceán

Roste na Tubuai ve Francouzské Polynésii.

Ixora brunnescens

Ixora brunonis

synonyma: I. brevidens

Ixora bullata

Ixora burbidgei

Ixora burundiensis

oblasti: Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Rwanda, Tanzánie

Roste v Tanzánii, Demokratické Republice Kongo, Rwandě a Burundi v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4,5 - 16m. Borka je lesklá. Palisty jsou uťaté, dlouhé 2 - 5,5mm, lalok je kýlnatý a dlouhý 1 - 2mm. Listy jsou obkopynaté až úzce obvejčité nebo eliptické, tupé (i špičaté), kožovité, dlouhé 6,5 - 17,5cm, široké 2,3 - 5,6cm, báze je špičatá, žilnatinu tvoří 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květenstvím je chocholík šířky 2,7 - 8,7cm na 2 - 8,7cm stopce, listy podpírající

květenství jsou široce eliptické až vejčité, tupé (i špičaté), dlouhé 1,6 - 9,8cm, široké 0,9 - 4,4cm, báze je srdčitá, zakulacená nebo tupá, řapíky dlouhé 1mm, listence jsou kopinaté až úzce vejčité, vlastní květy mají max. 7mm stopku, kalich s trubkou délky 2mm, laloky krátce 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,5 - 1mm, koruna je bílá až béžová, na bázi růžová, trubka je dlouhá 3,6 - 5,8cm, široká 1 - 1,5mm, laloky jsou úzce eliptické, tupé, dlouhé 7 - 8mm a široké 3 - 4mm. Plodem je peckovice o průměru 0,9 - 1,1cm.

Ixora butterwickii

synonyma: I. butterwickii var. lepida

Ixora buxina

Ixora cabraliensis

Ixora calcicola

Ixora calliantha

Ixora callithyrsa

Ixora calycina

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Ixora cambodiana

Ixora capillaris

Ixora capitata

Ixora capitulifera

Ixora capituliflora

Ixora carewi

Ixora casei

synonyma: *I. carolinensis* var. *chartacea*, *I. carolinensis* var. *volkensis*, *I. confertiflora*, *I. pulcherrima*, *I. williamsii*

oblasti: Tichý oceán

Roste na Karolínských ostrovech v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou podlouhlé až úzce eliptické a dlouhé (11 -) 27 - 30cm. Květenstvím je chocholičnatý vrcholík, vlastní květy jsou červené až růžové a trubka má délku 3 - 3,5cm.

Ixora caudata

Ixora cauliflora

Ixora celebica

Ixora cephalophora

oblasti: Čína, Filipíny, Indonésie

Roste v Číně, Indonésii a Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Palisty jsou široce jazykovité až vejčité, tupé až zakulacené s osinou délky 3mm a dlouhé 3 - 5mm. Listy jsou vstřícné, úzce eliptické, obkopynaté nebo úzce kopinaté, tupé až široce zašpičatělé, dlouhé 10 - 30cm, široké 4 - 8cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 9 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství je prakticky přisedlé, hustě chocholičnaté, dlouhé 17cm, široké 9cm, listeny jsou kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 2,5 - 5mm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopku, laloky kopinaté, tupé až zašpičatělé, dlouhé 4 - 5mm, široké 1,5 - 2mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 2 - 2,5cm, laloky eliptické, tupé až zakulacené, dlouhé 5 - 6mm a široké 2,5 - 4mm. Plodem je eliptická mírně zploštělá žlutě červená až červená peckovice délky 1,1cm a šířky 9mm.

Ixora ceramensis

Ixora chakrabortyi

Ixora chartacea

Ixora chinensis (Pobyška čínská)

synonyma: *Bemsetia paniculata*, *Gaertnera hongkongensis*, *I. blanda*, *I. coccinea*, *I. colei*, *I. crocata*, *I. dixiana*, *I. dubia*, *I. flammea*, *I. incarnata*, *I. kroneana*, *I. pallida*, *I. rosea*, *I. speciosa*, *I. stricta*, *I. stricta* var. *incarnata*, *I. stricta* var. *mekongensis*, *Pavetta arborea*, *Pavetta chinensis*, *Pavetta kroneana*, *Pavetta stricta*, *Sykesia hongkongensis*, *Tsiangia hongkongensis*

oblasti: Indie, J Čína, Jáva, Malajsie, Pákistán

Roste v Číně, Malajsii a Jávě v podobě stálezeleného keře, ale pěstuje se i v jiných tropech. Dorůstá výšky i šířky 0,8 - 1,2 (i 2)m. Větve jsou husté a vzpřímené. Palisty jsou 3úhlé a dlouhé 3 -

7mm. Listy jsou vstřícné (občas ve zdánlivém 4četném přeslenu), přisedlé, podlouhlé, úzce eliptické, obvejčité nebo vejčité, špičaté až prakticky tupé nebo zakulacené, zašpičatělé, tmavě zelené, dlouhé 6 - 10 (i 18)cm, široké 3 - 6cm, báze je klínovitá, krátce uťatá až zakulacená, žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek. Květenstvím je hustý vrcholičnatý bohatý chocholík nebo lata s krátkými větvemi na až 1,5cm stopce, listeny jsou 3úhlé, dlouhé 0,2 - 1mm, vlastní květy jsou růžově oranžové, žluté nebo bílé, střední přisedlé, postranní s až 2,5mm stopkami, kališní trubka je ochlupená, dlouhá 1,5mm, laloky jsou jazykovité až 3úhlé, špičaté nebo tupé, červeně tečkované, dlouhé 0,5 - 1mm, koruna má ochlupenou trubku délky (1,5 -) 2 (i 3,5)cm, laloky eliptické nebo vejčité, zakulacené, dlouhé 5 - 6 (i 7)mm a široké 4 - 5mm. Plodem je červeně černá prakticky kulatá peckovice průměru 6 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Alba' - květy bílé
- 'Dixiana' - květy tmavě oranžové
- 'Lutea' - květenství větší, oranžově červené
- 'Rosea' - květy světle růžové, později tmavnoucí

Ixora cibdela

synonyma: *I. cibdela* var. *puberula*, *I. collinsae*, *I. grandifolia* var. *glabra*

Ixora cincta

Ixora clandestina

Ixora clarae

Ixora clementium

Ixora clerodendron

synonyma: *I. pumila*

Ixora coccinea (Ixora šarlatová)

synonyma: *I. arborea*, *I. coccinea* var. *aureorosea*, *I. coccinea* var. *bandhuca*, *I. coccinea* var. *decolorans*, *I. coccinea* var. *linneana*, *I. coccinea* var. *lutea*, *I. coccinea* var. *rosea*, *I. fraseri*, *I. incarnata*, *I. obovata*, *I. purpurea*, *I. radiata* var. *thomeana*, *I. shawii*, *Pavetta coccinea*, *Pavetta rubra*

oblasti: Bangladéš, Florida, J Indie, Pákistán, Portoriko, Srí Lanka, Surinam

Roste v Indii, Bangladéši, Pákistánu, Surinamu a Srí Lance v podobě hustého stálezeleného keře, ale rozšířila se i do jiných tropických oblastí. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 8)m a šířky 1,5m. Palisty jsou 3úhlé a dlouhé 0,5 - 1,4cm. Listy jsou vstřícné, přisedlé, eliptické až podlouhlé, obvejčité až téměř kulaté, tupé nebo zakulacené s hrotem, tmavě zelené, kožovité, lesklé, dlouhé (2 -) 5 - 10 (i 16)cm,

široké (1 -) 2 - 5 (i 6,5)cm a žilnatinu tvoří 8 - 15 párů žilek. Kvete ve vrcholovém max. krátce stopkatém chocholíku délky 4 - 10cm, šířky 4 - 8cm na 1 - 3cm stopce, listeny jsou dlouhé 8mm, vlastní květy jsou 4četné, přisedlé, červené, kalich se 4mi široce vejčitými tupými až zašpičatělými laloky délky 1mm, koruna má trubku délky (2 -) 2,5 - 4 (i 4,5)cm, šířky 1,5mm, laloky jsou 4, dlouhé (0,8 -) 1 (i 1,5)cm a široké 4 - 5 (i 8)mm. Plodem je kulovitá tmavě červená peckovice průměru 0,7 - 1,5cm obsahující 2 semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. aureo-rosea - koruna má laloky žluté, později růžově pruhované
- var. bandhuca/i. bandhuca - Indie; květenstvím je chocholík, koruna červená, laloky kosočtvercovité
- 'Bier's Blogy' - květy tmavě červeně oranžové
- f. coccinea - jižní Indie; květy červené, laloky široce kopinaté až úzce vejčité, špičaté
- var. decolorans - květy mají korunní cípy žluté, později světle růžově bílé
- 'Dwarf Coccinea' - listy široké 1 - 1,5cm, báze srdčitá
- 'Fraseri'/I. fraseri - květy růžově červené až červené
- var. intermedia - květy mají korunu červenou, laloky vejčité nebo eliptické a špičaté
- f. lutea - květy mají korunu žlutou, laloky široce vejčité až široce eliptické a špičaté
- 'Morsei' - květy oranžové, načervenalé
- 'Orange King' - kompaktní habitus; květy oranžové
- var. rosea - listy ochlupené; květy mají korunu růžovou
- 'Savoi' - květy růžově červeně oranžové

Potřebuje vlhký teplý vzduch bez přímého slunce a bohatou závlivku pokud možno z vlažné dešťové vody. Substrát by měl být bohatý na živiny. Přezimuje v chladnějším místě s min. teplotou 15°C. Hnojíme 1x za 14 dní tekutým hnojivem.

Množí se stonkovými řízkami.

Ixora coffeoides

synonyma: Coffea multibracteata, Lachnastoma multibracteatum

Ixora collina

synonyma: I. collina var. minor, Panchezia collina

Ixora comptonii

Ixora concinna

Ixora conferta

Ixora confertiflora

Ixora confertior

synonyma: I. conferta var. minor

Ixora congesta

synonyma: I. griffithii, Pavetta congesta

oblasti: Asie

Roste v tropické Asii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Listy jsou eliptické až kopinaté a dlouhé do 15cm. Květenstvím je hustý chocholičnatý vrcholík, vlastní květy jsou žluté, oranžové nebo červené a koruna má trubku délky 3 - 3,5cm.

Ixora congestiflora

Ixora conspicua

Ixora coralloraphis

Ixora cordata

Ixora cordifolia

synonyma: I. ledermannii

Ixora coriifolia

Ixora coronata

Ixora corymbosa

Ixora cowanii

Ixora crassifolia

Ixora crassipes

Ixora cremixora

Ixora cumingiana

Ixora cuneata

Ixora cuneifolia

synonyma: I. cuneifolia var. puberula, I. cuneifolia var. pumila, I. cuneifolia var. roxburghii, I. rosea

Ixora curtisii

Ixora cuspidata

Ixora daemia

Ixora davisii

synonyma: Cephaëlis patabaea, Cephaëlis sessiliflora, I. mazarunensis, Patabea coccinea, Uragoga coccinea

Ixora decaryi

Ixora decuduiflora

Ixora decus-silvae

Ixora degemensis

Ixora delicatula

Ixora deliensis

Ixora delpyana

Ixora densiflora

synonyma: Coffea densiflora, Coffea floribunda

Ixora densithyrsa

Ixora diversifolia

synonyma: I. oblonga

Ixora djambica

Ixora dolichophylla

Ixora dolichothyrsa

Ixora dongnaiensis synonyma: I. hoaensis

Ixora doreensis synonyma: Pavetta doreensis

Ixora dorgelonis

Ixora duckei

Ixora dzumacensis

Ixora ebracteolata

Ixora effusa

oblasti: Čína, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Palisty jsou 3úhlé, tupé až špičaté, dlouhé 2 - 8mm a osina má délku 2 - 9mm. Listy jsou vstřícné, obkopynaté až podlouhlé, špičaté nebo tupé, sivozelené až nahnědlé, dlouhé 10 - 18cm, široké 3 - 7cm, báze je klínovitá nebo tupá, žilnatinu tvoří 8 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, řídké, široké 7 - 11cm, má 0,5 - 4cm stopku, na bázi zakrnělé listy, listeny jsou čárkovité, úzce 3úhlé až jazykovité, dlouhé 0,5 - 5mm, vlastní květy mají až 1cm stopku, kalich má hluboké kopynaté až jazykovité špičaté až zakulacené laloky délky 1 - 1,4mm, koruna je bílá až světle růžově fialová, trubka dlouhá 0,7 - 1,1cm, laloky jsou úzce kopynaté, špičaté, dlouhé 5 - 9mm a široké 2,3mm. Plodem je prakticky kulatá peckovice průměru 8 - 9mm.

Ixora elegans

Ixora elisae

Ixora elliotii

Ixora elongata

synonyma: I. pedunculata

oblasti: Z Indie

Roste v Indii v podobě nízkého stromu.

Ixora eludens

Ixora emirnensis

Ixora emygdioi

Ixora endertii

Ixora engganensis

Ixora ensifolia

Ixora eriantha

Ixora erythrocarpa

Ixora erythrostylis

Ixora eugenioides

Ixora euosmia

synonyma: I. degemensis

oblasti: Kamerun, Nigérie

Roste v Nigérii a Kamerunu.

Ixora fallax

Ixora farinosa

Ixora faroensis

Ixora fastigiata

synonyma: Pavetta fastigiata

Ixora ferrea

synonyma: Aegiphila ferrea, Pavetta quinqueflora, Siderodendron ferreum, Siderodendron triflorum, Siderodendrum ferreum, Sideroxyloides ferreum

oblasti: Kuba, Portoriko, S Jižní Amerika

Roste od střední Ameriky (včetně Karibiku) po sever Jižní Ameriky v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 10m. Palisty jsou zašpičatělé a dlouhé 4 - 9mm. Listy jsou úzce vejčité, úzce kopinaté nebo úzce eliptické, zašpičatělé, žlutě zelené, mohou být mírně podvinuté, dlouhé 7 - 19cm, báze je špičatá nebo zašpičatělá, žilnatinu tvoří 12 párů žilek, řapíky jsou silné a dlouhé 0,3 - 1,2cm. Květenství je úžlabní, několikakvěté, přisedlé až téměř přisedlé, vlastní květy jsou max. krátké stopkaté, růžově červené s bílou trubkou, růžovými laloky, trubka má délku 0,8 - 1cm, laloky 4, eliptické, tupé a dlouhé 3mm. Plodem je peckovice, semena jsou tmavě hnědá délky 5mm.

Ixora filiflora

Ixora filipendula

Ixora filipes

synonyma: I. gracilipes

Ixora filmeri

Ixora findlaysoniana

Ixora finlaysoniana

synonyma: I. denticulata, I. findlayana, I. merguensis var. parvifolia

oblasti: Čína, Filipíny, SV Indie, Thajsko

Roste v jihovýchodní Asii, Číně, Indii, Thajsku, Indočíně a Filipínách v podobě vysokého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 6m. Větve jsou v mládí kulaté. Palisty jsou vejčitě kulaté, špičaté a dlouhé 2 - 7mm. Listy jsou vstřícné, úzce eliptické až úzce obkopinaté či obvejčité, tupé nebo špičaté, dlouhé 6 - 18 (i 20)cm, široké 2 - 7 (i 9)cm, báze je tupá nebo špičatá, žilnatinu tvoří 8 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 2cm. Květenství je vrcholové, hlávkovité, bohaté, dlouhé 5 - 10cm, široké 10cm, má max. 4,5cm stopku, listeny eliptické až úzce jazykovité, tupé nebo špičaté, dlouhé 0,8 - 1cm, vlastní květy mají kalich s úzce kopinatými cípy délky 3 - 4mm, koruna je bílá až béžová, trubka nitkovitá, dlouhá 2 - 3,5cm, laloky jsou podlouhlé nebo eliptické, tupé a dlouhé 5 - 8mm. Plodem je prakticky kulatá peckovice průměru 6 - 8mm.

Ixora flagrans

Ixora flava

Ixora flavescens

synonyma: *I. flavescens* var. *cambodiana*

Ixora floribunda

synonyma: *Siderodendron floribundum*, *Siderodendrum floribundum*

oblasti: Honduras, Karibik, Kolumbie, Salvador

Roste v Hondurasu, Salvadoru, Kolumbii a Karibiku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 15m. Větve mohou být v mládí zploštělé. Palisty jsou 3úhle šídlové a dlouhé 0,4 - 1cm. Listy jsou vstřícné, podlouhlé, úzce eliptické nebo vejčité, tupé až zašpičatělé, dlouhé 11 - 26cm, široké 4 - 11cm, báze je tupá až protáhlá, sbíhavá, žilnatinu tvoří 6 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5cm. Květenstvím je vrcholová lata délky 5 - 12cm, vlastní květy jsou přisedlé v 3 - 12tikvětých svazečcích, kalich má trubku délky 0,5 - 1mm, laloky malé, koruna je bílá, trubka dlouhá 4mm, uvnitř ochlupená, laloky jsou 4, dlouhé 3 - 4mm a široké 1,5mm. Plodem je prakticky kulatá přisedlá řídce ochlupená peckovice délky 0,6 - 1cm s vytrvalou kališní trubkou.

Ixora florida

Ixora foetida

synonyma: *Chiococca triflora*, *Coffea triflora*, *I. triflora*

Ixora foliicalyx

Ixora foliosa

oblasti: Kamerun, Nigérie

Roste v Kamerunu a Nigérii.

Ixora forbesii

Ixora fragrans

synonyma: *Cephaëlis fragrans*, *Uragoga fragrans*

Ixora francavillana

Ixora francii

Ixora fucosa

Ixora fugiens

Ixora fulgida

Ixora fulviflora

Ixora funckii

Ixora fusca

Ixora fuscescens

Ixora fuscovenosa

Ixora gamblei

synonyma: *I. leucantha* var. *malabarica*

Ixora gardneriana

synonyma: *I. obscura*, *I. riedeliana*, *I. schottiana*, *I. truncata*

Ixora gautieri

Ixora gibbsiae

Ixora gigantea

Ixora gigantifolia

synonyma: *I. platyphylla*

Ixora glaucina

synonyma: *Pavetta glaucina*

Ixora glomeruliflora

Ixora goalparensis

Ixora graciliflora

synonyma: *I. surinamensis*, *I. xantholoba*, *Siderodendron laxiflorum*

Ixora grandiflora

Ixora grandifolia

synonyma: *I. coriacea*, *I. crassifolia*, *I. grandifolia* var. *coriacea*, *I. grandifolia* var. *gigantea*, *I. ridleyi*, *Pavetta macrophylla*, *Pavetta macrophylla* f. *elongata*, *Pavetta teysmanniana*, *Pavetta wyckii*

Ixora granulata

Ixora grazielae

Ixora greenwoodiana

Ixora guillotii

Ixora guineensis

synonyma: *I. breviflora*, *I. buchholzii*, *I. carniflora*, *I. obanensis*, *I. riparia*, *I. stenantha*, *I. talbotii*

Ixora guluensis

Ixora gyropogon

Ixora hainanensis

synonyma: *I. pygmaea*

oblasti: Guangdong, Hainan

Roste v Číně a na Hainanu v podobě keře. Dorůstá výšky 0,2 - 3m. Palisty jsou vytrvalé, 3úhlé až vejčité, zašpičatělé v délce 0,3 - 1cm a dlouhé 0,4 - 1cm. Listy jsou vstřícné, eliptické až obkopynaté, zakulacené, tupé nebo zašpičatělé, tmavě zelené, mohou být lesklé, dlouhé 4 - 14cm, široké 1 - 5cm, báze je klínovitá, zakulacená až prakticky srdčitá, žilnatinu tvoří 5 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 8mm. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, bohaté, dlouhé 2 - 3cm, široké 2 - 5cm, má 1 - 4cm stopku, listeny jsou čárkovité, dlouhé 1 - 3,5mm, vlastní květy stopkaté, kalich hluboce laločnatý, dlouhý 1 - 1,5mm, laloky 3úhlé, vejčité nebo kopinaté, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 1 - 1,5mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 3 - 4mm, laloky jsou úzce lopatkovité až obkopynaté, špičaté, dlouhé 6 - 7mm a široké 1 - 2mm. Plodem je červená prakticky kulatá až eliptická mírně zploštělá

peckovice délky 6mm a průměru 6 - 8mm.

Ixora hajupensis

Ixora hallierii

Ixora hartiana

Ixora harveyi

synonyma: *Stylocoryna harveyi*

Ixora havilandii

Ixora hayatakai

Ixora hekouensis

synonyma: *I. gracilis*

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě šplhavého keře. Palisty jsou vytrvalé, vejčité a dlouhé 6 - 7mm. Listy jsou vstřícné, úzce eliptické až obvejčité, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 10 - 18cm, široké 3 - 7cm, báze je klínovitá až tupá, žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, chudé, drobně ochlupené, dlouhé 7 - 8cm, široké 3 - 5cm, má 3 - 5cm stopku, listeny jsou úzce kopinaté, dlouhé 3,5 - 5mm, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku, kalich drobně ochlupený, laloky 3úhlé, dlouhé 1 - 1,2mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 1,8 - 2cm, laloky jsou úzce eliptické, tupé a dlouhé 5 - 6mm.

Ixora helwigii

Ixora henryi

oblasti: Čína, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Thajsku a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy jsou vstřícné, úzce eliptické, kopinaté až eliptické, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 5 - 15cm, široké 1,5 - 4cm, báze je klínovitá, tupá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 7mm. Palisty jsou 3úhlé až vejčité, tupé až zašpičatělé, dlouhé 5 - 8mm a osina má délku 0,3 - 1,1cm. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, bohaté, má 0,4 - 1,5cm stopku, délku 1,5 - 4cm, šířku 2 - 7mm, listeny jsou čárkovité až úzce kopinaté, dlouhé 0,8 - 3mm, vlastní květy mohou být stopkaté, kalich má laloky 3úhlé, dlouhé 0,5 - 1mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 2 - 2,5cm, laloky podlouhlé až úzce kopinaté, špičaté, dlouhé 5 - 6mm a široké 1,6 - 2mm. Plodem je prakticky kulatá peckovice průměru 0,8 - 1cm.

Ixora heterodoxa

synonyma: I. burchelliana, I. dimorphophylla, I. heterophylla

Ixora hiernii

Ixora himantophylla

Ixora hippoperifera

Ixora homolleae

synonyma: I. littoralis, Thouarsiora littoralis

Ixora hookeri

synonyma: I. odorata, Pavetta hookeri

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru v podobě keře nebo stromu. Listy jsou úzce eliptické a dlouhé 11 - 16cm. Květenstvím je řídký chocholičnatý vrcholík, vlastní květy jsou bílé, narůžovělé a trubka má délku 6 - 8cm.

Ixora hydrangeiformis

Ixora hymenophylla

Ixora ilocana

Ixora imitans

Ixora inaequifolia

Ixora inexpecta

Ixora inodora

Ixora insignis

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Palisty jsou 3úhlé, dlouhé 5 - 8mm a osinaté. Listy jsou vstřícné, úzce eliptické až úzce obkopynaté, zašpičatělé, dlouhé 10 - 14cm, široké 4 - 5cm, báze je klínovitá, tupá nebo zakulacená, žilnatinu tvoří 10 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1cm. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, široké 6 - 7cm, má 14cm stopku, listy pod květenstvím vejčité, dlouhé 4cm, široké 2,5cm, listeny jsou úzce šídlovité, dlouhé 0,5 - 3mm, vlastní květy mohou být stopkaté, kalich drobně ochlupený, hluboce laločnatý, laloky úzce eliptické, tupé, dlouhé 1,3 - 1,5cm a koruna má až 6mm dlouhé tupé laloky.

Ixora insularum

Ixora intensa

synonyma: *Aegiphila cayennensis*

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Větve jsou silné. Listy jsou protáhlé, zašpičatělé a prakticky kožovité, Květenstvím je bohatý zpravidla 3květý vrcholík, vlastní květy jsou max. krátce řapíkaté, červené nebo červeně žluté, laloky rozkladité, zakulacené a 1/3 délky trubky.

Ixora intermedia

Ixora intropilosa

Ixora inundata

Ixora irosinensis

Ixora irwinii

Ixora iteaphylla

Ixora iteoidea

Ixora ixoroides

synonyma: *Cyclophyllum ixoroides*

Ixora jacobsonii

Ixora jaherii

Ixora javanica

synonyma: *I. amara*, *I. amoena*, *I. cyathosperma*, *I. javanica* var. *multinervia*, *I. javanica* var. *paucinervia*, *I. javanica* var. *retinervia*, *I. mutabilis*, *I. stricta* var. *amoena*, *I. stricta* var. *blumeana*, *I. stricta* var. *javanica*, *I. stricta* var. *pubistyla*, *Pavetta javanica*

oblasti: Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 4 (i 4,5)m. Palisty jsou vejčité a dlouhé 4 - 5mm. Listy jsou eliptické, zašpičatělé, dlouhé 8,5 - 19cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 2cm. Květenstvím je chocholičnatý vrcholík, vlastní květy jsou červené, růžové nebo oranžové, koruna má trubku délky 2,3 - 3,6cm, laloky vejčité nebo eliptické a dlouhé 0,7 - 1,1cm. Plody jsou červené až černé o průměru 1,2 - 2cm.

Ixora johnsonii

oblasti: Kérala

Roste v Indii.

Ixora jourdanii

Ixora jucunda

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Ixora junghuhnii

synonyma: *I. fulgens* var. *lanceolata*, *Pavetta fulgens* var. *lanceolata*

Ixora kachinensis

Ixora kaniensis

Ixora karimatica

Ixora katchalensis

Ixora kavalliana

Ixora keenanii

Ixora keithii

Ixora kerrii

Ixora kerstingii

synonyma: I. argentea

Ixora keyensis

Ixora killipii

oblasti: Bolívie, Kolumbie, Peru

Roste v Peru, Bolívii a Kolumbii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 6m. Palisty jsou vytrvalé a krátké. Listy jsou prakticky přisedlé, podlouhlé až úzce eliptické, zašpičatělé, dlouhé 8 - 22cm a báze je tupá až úzce zakulacená. Květenství je řídké, max. krátce stopkaté, široké až 12cm, vlastní květy až 1cm stopku, kalich má cípy 3úhlé, zašpičatělé, koruna je béžová, trubka nitkovitá, dlouhá 2 - 2,5cm, laloky úzce kopianté, špičaté a dlouhé 0,6 - 1cm. Plody jsou prakticky kulaté, černé až tmavě růžově fialové o průměru 6 - 8mm.

Ixora kinabaluensis

Ixora kingdon-wardii

Ixora kingstonii

Ixora kjellbergii

Ixora knappiae

Ixora koordersii

synonyma: I. paludosa var. koordersii

Ixora korthalsiana

synonyma: I. korthalsiana, I. planifolia, I. singalang, Pavetta calycina, Pavetta korthalsiana, Tarenna calycina

Ixora krewanhensis

synonyma: I. krewanhensis var. polita

Ixora kuakuensis

Ixora kurziana

synonyma: I. demonchyana, I. grandifolia var. kurziana, Pavetta kurziana

Ixora labuanensis

Ixora lacei

Ixora lacuum

Ixora lagenifructa

Ixora lakshnakarae

Ixora lanceolaria

synonyma: I. wallichii

Ixora lanceolata

synonyma: Pavetta amboinica var. celebica

Ixora lancisepala

Ixora laotica

synonyma: Pavetta laotica

Ixora laurentii

Ixora lawsoni

Ixora lawsonii

synonyma: I. manantoddii

oblasti: Kérala

Roste v Indii.

Ixora laxiflora

oblasti: Z Afrika

Roste v západní Africe v podobě keře nebo stromu. Listy jsou úzce kopinaté a dlouhé 10 - 13cm. Květenstvím bývá řídký převislý chocholičnatý vrcholík, vlastní květy jsou bílé, narůžovělé nebo načervenalé a koruna má trubku délky 2 - 2,3cm.

Ixora lebangharae

Ixora lecardii

Ixora ledermannii

Ixora leptopus

Ixora leptosolen

Ixora letestui

Ixora leucocarpa

Ixora leytensis

Ixora liberiensis

Ixora linggensis

Ixora littoralis

Ixora lobbii

synonyma: I. aureora var. major, I. lobbii var. angustifolia, Pavetta lobbii

Roste v podobě keře nebo stromu. Listy jsou úzce eliptické až úzce vejčité a dlouhé 14 - 22cm. Květenstvím je řídký mnohokvětý chocholičnatý vrcholík, vlastní květy jsou oranžové až červené a koruna má trubku délky 2,5 - 3,2cm.

Ixora loerzingii

Ixora longhanensis

synonyma: I. amplexicaulis

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky až 6m. Palisty jsou šídlovité až 3úhlé, zašpičatělé až špičaté a dlouhé 7mm. Listy jsou vstřícné, přisedlé, eliptické až obkopinaté, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 2 - 15cm, široké 1 - 6cm, báze je drobně srdčitá, objímavá a žilnatinu tvoří 10 - 15 párů žilek. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, červené až růžově fialově červené, má 1,5 - 3,5cm stopku, na bázi zakrnělé listy délky 2cm, šířky 5 - 7mm, listeny jsou šídlovité, dlouhé 1,5 - 2mm, vlastní květy mohou být stopkaté, kalich hluboce laločnatý, laloky 3úhlé, tupé, koruna je červeně růžově fialová, trubka dlouhá i více než 8 - 9mm, laloky kopinaté a dlouhé i více než 4 - 5mm.

Ixora longibracteata

Ixora longifolia

synonyma: *I. amboinica*, *I. fulgens*, *Pavetta amboinica*, *Pavetta fulgens*

oblasti: Borneo, Filipíny, Indie, Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov, Melanésie, Myanmar (Barma), Pákistán, Vietnam, Yunnan

Roste na Moluckých ostrovech, Jávě, Borneu, Číně, Indii, Indonésii, Filipínách, Vietnamu, Malajském poloostrově a v Myanmaru v podobě vzpřímeného keře, pěstuje se ale i jinde v tropech. Dorůstá výšky do 1 (i 1,5)m. Palisty jsou široké. Listy jsou kopinaté až úzce eliptické, špičaté (i zašpičatělé) až zašpičatělé, dlouhé 10 - 20 (i 30)cm, široké 4 - 7,5cm, báze je klínovitá až tupá, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je vrcholový chocholík s krátkými větvemi šířky 12 - 17cm na 2,5cm stopce, listeny jsou úzce 3úhlé, dlouhé 1 - 1,5mm, vlastní květy jsou červenooranžové, mají (0,5 -) 2 - 3 (i 4)mm stopku, listeny krátké, kališní trubka je krátká, laloky zašpičatělé až tupé, dlouhé (0,5 -) 1 (i 1,5)mm, koruna má trubku délky 2,5 - 3 (i 4,5)cm, laloky jsou vejčité, kopinaté nebo eliptické, špičaté, dlouhé (1 -) 1,5 (i 1,7)cm a široké 3 - 5mm. Plodem je kulovitá peckovice o průměru 0,9 - 1cm.

Ixora longiloba

Ixora longipedicellata

Ixora longipedunculata

synonyma: *I. longipedunculata* var. *dewevrei*

Ixora longipes

synonyma: *I. gracilis*, *Pavetta longipes*

Ixora longistipula

Ixora lucida

synonyma: *I. ebarbata*, *I. lucida* var. *densipila*, *I. straminea*

Ixora lunutica

Ixora luzoniensis

Ixora macgregorii

Ixora macilenta

Ixora macrantha

synonyma: I. grandifolia var. auctifolia, I. hypsophila, I. leucoxylon, I. longiflora, I. longituba, I. longituba var. sumatrana, Pavetta hypsophila, Pavetta leucoxylon, Pavetta longiflora, Pavetta longiflora var. javana, Pavetta longituba, Pavetta longituba f. sumatrana, Pavetta macrantha

Ixora macrocotyla

Ixora macrophylla

synonyma: Taligalea umbellata

Ixora macrosiphon

Ixora macrothyrsa

synonyma: Pavetta macrothyrsa

Ixora magnifica

Ixora makassarica

Ixora malabarica

synonyma: Chiococca malabarica, I. colebrookii, I. leucantha

oblasti: Kérala

Roste v Indii v podobě keře. Listy jsou kopinaté a dlouhé 9 - 14cm. Květenstvím je řídký chocholičnatý vrcholík, vlastní květy jsou bílé a koruna má trubku délky 2,5 - 3cm.

Ixora malaica

Ixora malayana

Ixora mandalayensis

Ixora mangabensis

Ixora mangoliensis

Ixora margaretae

synonyma: *Captaincookia margaretae*

oblasti: Nová Kaledonie

Roste na Nové Kaledonii.

Ixora marquesensis

oblasti: Tichý oceán

Roste na Markézách.

Ixora marsdenii

Ixora martinsii

Ixora masoalensis

Ixora maxima

Ixora maymyensis

Ixora mearnsii

Ixora meeboldii

Ixora megalophylla

Ixora megalothyrsa

Ixora mekongensis

Ixora membranifolia

Ixora mentangis

Ixora mercaraica

Ixora merguensis

synonyma: *I. merguensis* var. *curtisii*

Ixora microphylla

synonyma: *I. parvifolia*

Ixora mildbraedii

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Středoafriická Republika, Súdán, Uganda

Roste v Ugandě, Středoafriické Republice, Demokratické Republice Kongo a Súdánu v podobě stromu až mírně šplhavého keře. Dorůstá výšky 2 - 4,5m. Borka je šedá až hnědá a prakticky hladká. Palisty jsou uťaté, laloky šídlovité a dlouhé 1 - 2mm. Listy jsou eliptické, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 6,5 - 16cm, široké 2,7 - 6,2cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,1cm. Květenstvím je řídký chocholík průměru 5 - 10,5cm na max. 3mm stopce, listeny jsou palistovité, listence drobné, 3úhlé na bázi, na vrcholu šídlovité, vlastní květy mají 0,2 - 1,1cm stopku, kalich s trubkou délky 1 - 1,3mm, okraj zubatý, šířky 0,2 - 0,5mm, koruna je bílá, vně světle růžová, trubka dlouhá 1 - 2,2cm, široká 1 - 1,3mm, laloky jsou zakulacené (i mírně vykrojené), dlouhé 0,7 - 1cm a široké 2 - 2,3mm.

Ixora miliensis

Ixora minahassae

Ixora mindanaensis

Ixora minor

synonyma: *Versteegia minor*

Ixora minutiflora

Ixora miquelii

synonyma: *I. floribunda*, *I. pulcherrima*, *Pavetta floribunda*, *Pavetta pulcherrima*

Ixora mirabilis

Ixora mjoebergii

synonyma: I. matangensis

Ixora mocquerysii

Ixora mollirama

Ixora moluccana

Ixora moorensis

synonyma: Hitoa moorensis

oblasti: Tichý oceán

Roste na Společenských ostrovech.

Ixora moszkowskii

Ixora motleyi

Ixora mucronata

Ixora muelleri

synonyma: I. grandifolia

Ixora myitkyinensis

Ixora myriantha

Ixora myrsinoides

Ixora myrtifolia

Ixora namatanaica

Ixora nana

Ixora nandarivatensis

Ixora narcissodora

synonyma: I. stolzii

oblasti: Keňa, Malawi, Mosambik, Tanzánie, Zimbabwe

Roste v Keni, Tanzánii, Mosambiku, Malawi a Zimbabwe v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 0,3 - 10m. Borka je našedlá až hnědá. Větve jsou v mládí ochlupené. Palisty jsou 3úhlé, špičaté v délce až 7mm, na bázi mírně kýlnaté a záhy opadávají. Listy jsou vstřícné, kopinaté až obkopinaté, špičaté až tupé (i zakulacené), lesklé, tmavě zelené, dlouhé 3 - 25cm, široké 1 - 8cm, báze je klínovitá (i tupá), žilnatinu tvoří až 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,1 - 1cm. Květenstvím je lata nebo chocholík, listeny jsou palistovité, listence malé, 3úhlé až nitkovité, vlastní květy mají kalich s trubicí délky 1 - 2mm, okraj šířky 0,5 - 2mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 3,2 - 8cm, laloky jsou podlouhlé, tupé až zašpičatělé a dlouhé 0,7 - 1cm. Plody jsou kulaté až 2laločné, hnědočervené až tmavěhnědé a průměru 0,7 - 1,1cm.

Ixora natunensis

Ixora nematopoda

synonyma: I. rosea

Ixora neocaledonica

oblasti: Nová Kaledonie

Ixora neriifolia

synonyma: I. salicifolia var. variegata

Ixora nicaraguensis

synonyma: I. rauwolfioides

oblasti: Belize, Nikaragua, Panama

Roste od Belize po Panamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 10m při průměru kmene a 12cm. Palisty jsou 3úhlé, špičaté až zašpičatělé a dlouhé 3 - 8mm. Listy jsou vstřícné, úzce eliptické až úzce vejčité, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 6 - 16cm, široké 2 - 7cm, báze je špičatá nebo zašpičatělá, sbíhavá, žilnatinu tvoří 10 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,1cm. Květenství je vrcholové, latnaté, kuželovité, bohatě větvené a květnaté, dlouhé i široké 3 - 9cm, má max. 3cm stopku, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopku, kalich je uťatý, koruna je bílá, trubka dlouhá 3 - 6mm, laloky jsou podlouhlé, rozkladité, zakulacené a dlouhé 3 - 4mm. Plody jsou prakticky kulaté, červené a dlouhé 5 - 7mm.

Ixora nicobarica

Ixora nienkui

oblasti: Guangdong, Guangxi, Hainan, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Palisty jsou opadavé, špičaté, dlouhé 0,3 - 1cm a osina má délku 2 - 5mm. Listy jsou vstřícné, úzce eliptické až úzce obkopinaté, zašpičatělé, dlouhé 10 - 23cm, široké 3 - 7cm, báze je zakulacená, tupá nebo drobně srdčitá, žilnatinu tvoří 10 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, bohaté, drobně ochlupené, má až 6mm stopku, listeny jsou úzce kopinaté až čárkovité, dlouhé 1 - 3mm, vlastní květy mají kalich téměř k bázi laločnatý, trubku délky 1,5 - 1,8mm, laloky 3úhlé, dlouhé 1mm, koruna je bílá nebo růžová, trubka dlouhá 3 - 4cm, laloky kopinaté, špičaté a dlouhé 5 - 7mm. Plodem je červená kulatá peckovice o průměru 7 - 8mm.

Ixora nigerica

oblasti: Nigérie

Roste v tropické Africe.

Ixora nigricans

synonyma: *I. affinis*, *I. affinis* var. *arguta*, *I. affinis* var. *plumea*, *I. arguta*, *I. densa*, *I. erubescens*, *I. memecylifolia*, *I. nigricans* var. *arguta*, *I. nigricans* var. *erubescens*, *I. nigricans* var. *ovalis*, *I. plumea*, *Pavetta erubescens*

oblasti: Z Indie

Roste v Indii v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 5m. Kmínky jsou šedohnědé. Palisty jsou vejčité a dlouhé 5 - 9mm. Listy jsou úzce obvejčité až úzce eliptické, zašpičatělé, dlouhé 6 - 20cm, široké 2 - 8cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,5cm. Květenství bývá latnaté, dlouhé 6 - 11cm, široké 5 - 15cm, listeny jsou dlouhé 1 - 2mm, kalich má trubku délky 1mm, zuby délky do 0,8mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 0,8 - 1,3cm a laloky jsou dlouhé 4 - 5mm. Plody jsou černé a průměru 5 - 6mm.

Ixora nimbana

Ixora nitens

synonyma: *Eugenia nitens*, *Myonima heterophylla*, *Myonima nitens*, *Myrtus nitens*

Ixora nitidula

Ixora nonantha

Ixora notoniana

synonyma: *I. grandiflora*, *I. wightiana*

Ixora novemnervia

Ixora novoguineensis

synonyma: *Psychotria cauliflora*, *Versteegia cauliflora*

Ixora oblongifolia

Ixora obtusiloba

Ixora odorata

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru. Kvete bílými květy s červenou trubkou o délce až 12cm.

Ixora odoratiflora

Ixora oligantha

synonyma: *I. collina* var. *opuloides*

Ixora ooumuensis

oblasti: Tichý oceán

Roste na Markézách.

Ixora opaca

synonyma: *I. opaca* var. *maior*, *I. pendula* var. *opaca*, *Pavetta opaca*

Ixora opuloides

Ixora oreogena

Ixora oresitropha

Ixora orinocensis

Ixora orohenensis

Ixora orophila

Ixora orovilleae

Ixora otophora

Ixora ovalifolia

Ixora palawaensis

Ixora Palembangensis

Ixora pallens

Ixora paludosa

synonyma: *I. teysmannii*, *Pavetta paludosa*, *Pavetta paludosa* var. *major*

Ixora panurensis

oblasti: Jižní Amerika

Roste v Jižní Americe.

Ixora paradoxalis

Ixora paraopara

Ixora parkeri

Ixora parviflora

synonyma: *Eugenia violacea*, *Froelichia uniflora*, *Myonima latifolia*, *Myonima multiflora* var. *oblongifolia*, *Myonima parviflora*, *Myonima violacea*, *Myrtus androsaemoides*, *Myrtus violacea*

Ixora patens

synonyma: *I. micrantha*

Ixora patula

Ixora pauciflora

synonyma: *I. javanica* var. *descripta*, *Pavetta fallax*

Ixora pauper

synonyma: *I. venosa*

Ixora pavetta

synonyma: *I. arborea*, *I. decipiens*, *I. parviflora*, *I. parviflora* var. *zeylanica*

oblasti: Bangladéš, Florida, Indie, Pákistán, Srí Lanka

Roste v Indii, Bangladéši, Srí Lance a Pákistánu v podobě větveného nízkého stromu. Borka je tmavá. Listy jsou vstřícné, zašpičatělé, dlouhé 7 - 15cm, široké 3,5 - 6,5cm a řapíky dlouhé 5mm. Květenstvím je vrcholová chocholíkovitá lata, vlastní květy jsou přisedlé, bílé nebo červené, dlouhé 6,4cm, kalich má malé zuby, koruna má trubku délky 6mm a 4 laloky. Plodem je kulovitá peckovice obsahující 2 černá semena.

Ixora peculiaris

Ixora pedalis

Ixora pedionoma

Ixora pelagica

Ixora pendula

synonyma: *Pavetta pendula*

Ixora peruviana (Pobyška peruánská)

synonyma: *Cephalanthus breviflorus*, *Cephalanthus peruvianus*

oblasti: Bolívie, Brazílie, Peru

Roste v Peru, Bolívii a Brazílii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3m. Větve jsou silné. Palisty jsou vytrvalé a dlouhé 0,8 - 1cm. Listy jsou obvejčité až úzce obkopynaté, zašpičatělé nebo zakulacené s hrotem, prakticky kožovité a báze je protáhlá. Květenstvím je přisedlá dlouze stopkatá bohatá hlávka, vlastní květy mají korunu bílou, vně ochlupenou, dlouhou 0,6 - 1cm, laloky dlouhé trubky nebo kratší a úzce podlouhlé. Plodem je prakticky kulatá ochlupená peckovice průměru 6 - 7mm.

Ixora phellopus

Ixora philippinensis (Pobyška filipínská)

synonyma: *I. graciliflora*, *I. hayatae*

oblasti: Filipíny, JV Čína, Tchaj-wan

Roste na Filipínách a Tchaj-wanu v podobě keře nebo stromu. Povrch může být ochlupený. Palisty jsou opadavé, kopinaté až široce 3úhlé, zašpičatělé a dlouhé 2 - 5mm. Listy jsou vstřícné, eliptické až mírně vejčité, tupé až zakulacené, zpravidla hrotité, dlouhé 4,5 - 10cm, široké 2 - 7cm, báze je uťatá, zakulacená až mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 8 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé max. 4mm. Květenství je vrcholové, hustě vrcholičnaté, chudé, široké 1 - 2cm, má 1 - 1,5cm stopku, s párem zakrnělých vejčitých až srdčitých listů délky 0,5 - 3cm, listeny jsou vejčité kopinaté až úzce 3úhlé, zašpičatělé, dlouhé 1,5 - 2mm, vlastní květy jsou přisedlé, kalich může být drobně ochlupený, trubka dlouhá 1mm, okraj široký 0,5 - 1mm, mělce laločnatý, laloky zoubkované, koruna bílá až růžová, vně drobně ochlupená, trubka dlouhá 1,8 - 2cm, laloky úzce eliptické, dlouhé 7mm a široké 3,5mm. Plodem je vejčitá mírně zploštělá peckovice velikosti 1cm.

Ixora phulangkaensis

Ixora phuluangensis

Ixora pierrei

synonyma: *I. gracilipes*

Ixora pilosa

Ixora pilosostyla

Ixora piresii

Ixora platythyrsa

Ixora polita

synonyma: *I. borneensis*, *Pavetta gracilis*, *Pavetta polita*

Ixora polyantha

oblasti: Indie, Pákistán

Roste v Indii v podobě malého keře a pěstuje se také v Pákistánu. Palisty jsou krátce hrotité. Listy jsou krátce řapíkaté, špičaté nebo zašpičatělé, dlouhé 10 - 30cm a široké 4 - 12cm. Květenstvím je vrcholový chocholík šířky 7 - 12cm, vlastní květy jsou bílé, listeny čárkovité, zašpičatělé, dlouhé 3,5mm, kališní trubka je dlouhá 1,5mm, laloky jsou vejčité kopinaté, špičaté, koruna má trubku délky

(1,5 -) 2 - 2,5cm a laloky délky 6mm.

Ixora polycephala

Ixora potaroensis

Ixora praestans

Ixora praetermissa

Ixora princeps

Ixora prolixa

Ixora propinqua

Ixora pseudoacuminata

Ixora pseudoamboinica
synonyma: Pavetta pseudoamboinica

Ixora pseudojavanica

Ixora pubescens
synonyma: I. pubescens var. glabrifolia

Ixora pubiflora

Ixora pubifolia

Ixora pubigera

Ixora pubirama

Ixora pudica

Roste na Seychelách.

Ixora pueuana

synonyma: I. umbellata

Ixora pulcherrima

Ixora pyrantha

Ixora pyrrhostaura

Ixora quadrilocularis

Ixora raiateensis

oblasti: Tichý oceán

Roste na Společenských ostrovech.

Ixora raivavaensis

oblasti: Raivavae, Tichý oceán

Roste na ostrovech Tubuai ve Francouzské Polynésii.

Ixora rakotonasoloi

Ixora rangonensis

Ixora ravikumarii

synonyma: I. monticola

Ixora recurva

synonyma: Paederia recurva

Ixora reducta

Ixora regalis

Ixora reginae

Ixora renulosa

Ixora reticulata

synonyma: *I. pantjarensis*, *Pavetta reticulata*

Ixora reynaldoi

Ixora rhododactyla

Ixora richardi-longii

synonyma: *I. decora*

Ixora richardiana

Ixora ridsdalei

synonyma: *Versteegia puberula*

Ixora riparum

Ixora ripicola

Ixora rivalis

Ixora robinsonii

Ixora roemeri

Ixora romburghii

Ixora rosacea

Ixora roseituba

Ixora rubrinervis

Ixora rufa

oblasti: Jižní Amerika

Roste v Jižní Americe v podobě keře nebo stromu.

Ixora rugosirama

synonyma: I. doreensis var. longifolia, I. doreensis var. pubiflora

Ixora rugosula

Ixora rugulosa

synonyma: I. rugulosa, I. sessiliflora

Ixora ruttenii

Ixora sabangensis

Ixora salicifolia

synonyma: I. fulgens var. salicifolia, I. longissima, Pavetta salicifolia

oblasti: Jáva

Roste na Jávě v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Listy jsou podlouhlé až čárkovité a dlouhé 15 - 22cm. Květenstvím je kompaktní bohatý vrcholík, vlastní květy jsou oranžové až červené a trubka má délku 1,6 - 2,5cm.

Ixora salmonea

Ixora salwenensis

Ixora samarensis

Ixora sambiranensis

Ixora samoensis

Ixora sandankwa

Ixora sandwithiana

Ixora saulierei

oblasti: Tamilnádu

Roste v Indii.

Ixora scandens

Ixora scheffleri

oblasti: J Afrika, Keňa, Malawi, Tanzánie

Roste v Africe v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 6 - 17m. Borka je šedě hnědě žlutá. Palisty jsou opadavé, mají uťatý okraj délky 2 - 5mm a laloky délky do 5mm. Listy jsou eliptické, špičaté až zašpičatělé (i tupé), mírně lesklé, občas 2barevné, dlouhé 3 - 18cm, široké 1,2 - 6cm, báze je klínovitá (i zakulacená), žilnatinu tvoří 8 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,6cm. Květenstvím je chocholík šířky 2,5 - 13,5cm na 0,4 - 9,7cm stopce, listy pod květenstvím jsou úzce eliptické, dlouhé 1,2 - 9,3cm, široké 1 - 5,8cm, báze je zakulacená až tupá, řapíky dlouhé 0,3 - 5mm, listence jsou 3úhlé až šídlovité, 1/2 délky kališní trubky, vlastní květy mají max. 2mm stopku, kalich má trubku délky 1 - 1,5mm s okrajem šířky 0,2 - 0,8mm, laloky krátce 3úhlé, špičaté, tupé nebo zakulacené, dlouhé 0,2 - 0,5mm, koruna je bílá, narůžovělá, trubka dlouhá 0,8 - 2,5cm, laloky úzce eliptické až úzce obvejčité, zakulacené nebo tupé, dlouhé 4 - 7mm a široké 2 - 3mm. Plodem je červená peckovice průměru 0,8 - 1cm a obsahuje světle hnědá semena šířky 6,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. keniensis - Keňa; keř nebo strom; výška 5 - 8m; palisty laloky délky do 1mm; listy eliptické, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 4 - 16cm, široké 2 - 4,5cm, báze klínovitá; květenstvím je řídká lata, vlastní květy bílé až růžové, kališní laloky zakulacené, uťaté (i tupé), koruna má trubku délky 1,5 - 2,2cm a laloky délky 5 - 7mm; plody kulaté nebo eliptické a dlouhé 8 - 9mm
- subsp. scheffleri/l. latituba/l. ulugurensis - Tanzánie, Malawi; palisty s laloky délky 2 - 5mm; kališní laloky špičaté až zašpičatělé

Ixora schlechteri

synonyma: I. montana

Ixora schomburgkiana

synonyma: I. gleasonii, Siderodendron macrophyllum

Ixora scortechinii

synonyma: I. humilis, I. kingiana, I. scortechinii var. caulescens

Ixora seretii

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Uganda

Roste v Demokratické Republice Kongo a Ugandě v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 4,5m. Borka je hnědo žlutě zelená a hladká. Palisty mají okraj 3úhlý, délky 5mm, laloky šídlovité a dlouhé do 2mm. Listy jsou eliptické (i podlouhlé), špičaté až zašpičatělé, dlouhé 8 - 19,5cm, široké 3,3 - 6cm, báze je klínovitá nebo tupá a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Květenstvím je řídký přisedlý chocholík o šířce 6 - 8,3cm, listeny jsou palistovité, listence jsou malé, šídlovité až nitkovité, po 1 - 2ks, vlastní květy mají max. 4mm stopku, kalich má trubku délky 1 - 1,8mm, na bázi ochlupenou, s okrajem šířky 0,2 - 0,5mm, mělce laločnaté, koruna je bílá, trubka dlouhá 1,4 - 1,8cm, široká 1mm, laloky podlouhlé, zakulacené až tupé, dlouhé 5 - 7mm a široké 2mm.

Ixora sessililimba

Ixora setchellii

oblasti: Tichý oceán

Roste na Společenských ostrovech.

Ixora siamensis

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou eliptické a dlouhé 5 - 11cm. Květenstvím je kompaktní vrcholík, vlastní květy jsou růžové a koruna má trubku délky 1,6 - 2,5cm.

Ixora siantanensis

Ixora silagoensis

Ixora simalurensis

Ixora singaporensis

oblasti: Malesie

Ixora siphonantha

Ixora sivarajiana

Ixora smeruensis

Ixora solomonensis

synonyma: Versteegia solomonensis

Ixora solomonensium

Ixora somosomaensis

Ixora sparsiflora

Ixora sparsifolia

synonyma: I. ulei

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě keře. Dorůstá výšky 2m. Listy jsou prakticky kožovité, báze špičatá a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství je max. krátce stopkaté, vlastní květy mají kalich ochlupený, laloky vejčité, špičaté, koruna je žlutá a červená, laloky eliptické, tupé a max. 1/3 délky trubky.

Ixora spathoidea

Ixora spectabilis

oblasti: Indie, Myanmar (Barma)

Roste v Indii a Myanmaru v podobě stromu. Listy jsou eliptické a dlouhé 13 - 27cm. Květenstvím je vrcholík, vlastní květy jsou bílé a koruna má trubku délky 0,6 - 1cm.

Ixora spirei

Ixora splendida

Ixora spruceana

Ixora st-johnii

oblasti: Huahine, Tichý oceán

Roste na ostrově Huahine ve Francouzské Polynésii.

Ixora st.-johnii

Ixora steenisii

Ixora stenophylla

synonyma: *I. acuminata*, *I. boerlagei*, *I. neglecta*, *Pavetta acuminata*, *Pavetta stenophylla*

Ixora stenothyrsa

Ixora stenura

Ixora stipulata

synonyma: *Psychotria stipulata*

Ixora stokesii

oblasti: Rapa-Iti, Tichý oceán

Roste na ostrově Rapa-Iti ve Francouzské Polynésii.

Ixora storckii

Ixora subauriculata

synonyma: *I. longifolia*

Ixora subsessilis

synonyma: *I. oxyphylla*, *I. sessilis*

oblasti: Indie, Thajsko, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Indii a Thajsku v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 2,5m. Palisty jsou dlouze zašpičatělé, šídlovité až čárkovité. Listy jsou vstřícné, prakticky přisedlé, kopinaté, eliptické nebo obkopinaté, dlouze zašpičatělé, dlouhé 10 - 12cm, široké 3 - 4cm a báze je tupá. Květenství je chocholičnaté, chudé, prakticky přisedlé, listeny šídlovité nebo čárkovité, vlastní květy mají kalich s čárkovitými laloky délky 0,8 - 1,3mm, koruna má trubku délky 1,3 - 4,5cm, laloky úzce eliptické a špičaté. Plodem je peckovice o průměru 8 - 8,5mm.

Ixora sulaensis

Ixora sumbawensis

Ixora symphorantha

Ixora synactica

Ixora syringiflora

synonyma: I. benthamiana, Psychotria syringiflora

Ixora tahuataensis

Ixora talaudensis

Ixora tanzaniensis

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii v podobě keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Borka je šedá a mírně lesklá. Palisty jsou dlouhé 2 - 5mm, okraj je 3úhlý, laloky šídlovité, dlouhé 2mm a na bázi kýlnaté. Listy jsou obkopynaté, obvejčité nebo eliptické, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 9,8 - 23cm, široké 4 - 8,5cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenstvím je přisedlý chocholík, listeny jsou palistovité, listence drobné, vlastní květy mají max. 2mm stopku, kalich může být drobně ochlupený, uťatý, trubka dlouhá 1mm s okrajem šířky 0,7 - 1mm, koruna bílá, narůžovělá, trubka dlouhá 2,5 - 3,4cm, široká 1,5mm, laloky jsou tupé až zakulacené, dlouhé 7 - 8mm a široké 3 - 3,3mm. Plodem je červená peckovice šířky 8 - 9mm a obsahuje světle rezavě hnědá semena o průměru 5,5mm.

Ixora tavoyana

Ixora temehaniensis

oblasti: Raiatea, Tichý oceán

Roste na ostrově Raiatea ve Francouzské Polynésii.

Ixora temptans

Ixora tenelliflora

Ixora tenerensis

Ixora tenuiflora

synonyma: Cephaëlis tenuiflora, Patabea tenuiflora

Ixora tenuipedunculata

Ixora tenuis

Ixora thwaitesii

synonyma: *I. acuminata*

oblasti: Portoriko, Srí Lanka

Roste na Srí Lance v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 6m. Listy jsou obkopinaté, eliptické nebo podlouhlé a dlouhé 6 - 16cm. Květenstvím je hustý chocholičnatý vrcholík, vlastní květy jsou bílé nebo béžové a koruna má trubku délky 3 - 5mm.

Ixora tibetana (Pobyška tibetská)

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Palisty jsou na kmínku srostlé a osinaté. Listy jsou vstřícné, eliptické nebo obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 15 - 17cm, široké 6,5 - 7,5cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 6 - 8mm. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, 75 - 100květé, má 7 - 8mm stopku, na bázi se zakrnělými listy, listeny jsou nitkovité, vlastní květy jsou max. krátce stopkaté, kalich až k bázi laločnatý, laloky kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 1,5mm, koruna bílá, trubka dlouhá 2,4cm, laloky vejčité kopinaté, dlouhé 5,5mm a široké 2,5mm.

Ixora tidorensis

synonyma: *I. javanica* var. *tidorensis*, *Pavetta javanica* var. *tidorensis*

Ixora tigriomustax

Ixora timorensis

synonyma: *I. klanderiana*, *I. kochii*, *I. littorea*, *I. quinquefida*, *Pavetta littorea*

Ixora tinifolia

Ixora treubii

Ixora triantha

Ixora trichandra

Ixora trichobotrys

Ixora trichocalyx

Ixora trilocularis

synonyma: Doricera trilocularis, Pyrostria trilocularis

Ixora trimera

Ixora tsangii

oblasti: Guangxi

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky do 1m. Palisty jsou u kmínků na bázi srostlé, vejčité až 3úhlé, dlouhé 2 - 8mm a osina má délku 2 - 6mm. Listy jsou vstřícné, sivě zelené, úzce kopinaté až eliptické, špičaté až zašpičatělé, mělce puchýřnaté, dlouhé 7 - 20cm, široké 2,5 - 6cm, báze je klínovitá až tupá, žilnatinu tvoří 9 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,8cm. Květenství je vrcholové, chocholičnaté, drobně ochlupené, velikosti 3 - 3,5cm, listeny jsou úzce kopinaté až úzce 3úhlé, zašpičatělé, dlouhé 1 - 3mm, vlastní květy jsou stopkaté, kalich hluboce laločnatý, laloky vejčité až 3úhlé, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 1mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 1,5 - 1,8cm, laloky eliptické, tupé až prakticky zakulacené a dlouhé 5mm.

Ixora tubiflora

Ixora tunicata

Ixora uahukaensis

Ixora uapouensis

Ixora umbellata

oblasti: Indočína, Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste v Jávě, Sumatře a Malajsi v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 7m. Listy jsou podlouhlé až elipticky kopinaté a dlouhé 18 - 25cm. Květenstvím je řídký kulatý vrcholík, vlastní květy jsou bílé a mají trubku délky 3 - 3,7cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. multibracteata/l. multibracteata - listeny bohaté

Ixora umbricola

Ixora undulata

synonyma: I. canjia, I. conjia

oblasti: Ásám, Bangladéš, Bhútán, Nepál, Pákistán, Sikkim

Roste v Nepálu, Indii, Bhútánu a Bangladéši v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 4,5m. Borka je šedě hnědá. Palisty jsou dlouhé 6 - 9mm Listy jsou úzce eliptické nebo kopinaté, špičaté nebo zašpičatělé, zvlněné, dlouhé (8 -) 10 - 22cm, široké 4 - 7cm, báze úzce klínovitá, spodní strana světlejší a řapíky jsou dlouhé (0,3 -) 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je chocholík nebo lata délky i šířky (8 -) 10 - 19 (i 20)cm, listeny jsou dlouhé 3 - 6mm, vlastní květy mají kalich se špičatými laloky délky do 1mm, koruna je bílá, trubka dlouhá 6 - 8 (i 9)mm a laloky úzce podlouhlé délky 4 - 5mm. Plodem je peckovice velikosti 5 - 7mm.

Ixora uniflora

Ixora upolensis

Ixora urophylla

Ixora valetonia

synonyma: Versteegia grandifolia

Ixora vandersticheleorum

synonyma: I. venusta

Ixora varians

Ixora variegata

Ixora vauhanii

synonyma: Myonima vauhanii

Ixora venezuelica

Ixora venulosa

Ixora versteegii

Ixora verticillata

synonyma: Coffea verticillata

Ixora vieillardii

Ixora vinniei

synonyma: I. tenuifolia

Ixora violacea

Ixora vitiensis

synonyma: Uragoga speciosa

Ixora whitei

synonyma: I. ihuensis

Ixora winkleri

Ixora woodii

Ixora yaouhensis

synonyma: I. neocaledonica

Ixora yavitensis

oblasti: Jižní Amerika

Roste v Jižní Americe.

Ixora ysabellae

Ixora yunckeri

Ixora yunnanensis

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě chudě větveného keře. Dorůstá výšky do 1m. Palisty jsou vytrvalé, na kmínku srostlé, 3úhlé až široce vejčité, špičaté, dlouhé 3 - 5mm a osina má délku 2 - 4,5mm. Listy jsou vstřícné nebo v 3četných přeslenech, úzce obkopynaté až úzce eliptické, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 7 - 22cm, široké 1 - 4cm, báze je špičatá, sbíhavá, žilnatinu tvoří 12 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 1cm. Květenství je vrcholové, chocholičnaté až hustě vrcholičnaté, může být ochlupené, dlouhé 2 - 4cm, široké 2,5 - 4cm, má až 5mm stopku, listeny kopinaté až úzce

3úhlé, špičaté, dlouhé 2 - 6mm, vlastní květy jsou max. krátce stopkaté, kalich drobně ochlupený, okraj hluboce laločnatý, laloky úzce kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 3 - 4mm, koruna bílá, trubka dlouhá 3 - 4cm, laloky úzce eliptické, tupé, dlouhé 6 - 7mm a široké 2 - 3mm. Plodem je úzce eliptická mírně zploštělá červená peckovice délky 1cm a šířky 8mm.

Ixora zollingeriana

Ixora ×westii

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=393>

<http://exoticke-rostliny.atlasrostlin.cz/ixora-sarlatova>

<http://www.celysvet.cz/ixora.php>

<https://www.rostliny.net/>