

## Cylindropuntia leptocaulis

synonyma: *Cylindropuntia brittonii*, *C. var. badia*, *C. var. brevispina*, *C. var. glauca*, *C. var. longispina*, *C. var. robustior*, *C. var. vaginata*, *Cylindropuntia mortolensis*, *Grusonia leptocaulis*, *Opuntia brittonii*, *Opuntia fragilis* var. *frutescens*, *Opuntia frutescens*, *Opuntia frutescens* var. *brevispina*, *Opuntia frutescens* var. *longispina*, *Opuntia gracilis*, *Opuntia leptocaulis*, *Opuntia leptocaulis* var. *badia*, *Opuntia leptocaulis* var. *brevispina*, *Opuntia leptocaulis* var. *brittonii*, *Opuntia leptocaulis* var. *longispina*, *Opuntia leptocaulis* var. *robustior*, *Opuntia leptocaulis* var. *vaginata*, *Opuntia mortolensis*, *Opuntia ramulifera*, *Opuntia vaginata*

čeleď: Cactaceae

oblasti: Arizona, Nové Mexiko, Oklahoma, Puebla, S Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě větveného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 0,5 - 1,8 (i 2)m. Vrcholové větve bývají bez trnů. Boční články se lehce odlamují, jsou šedě zelené nebo narůžověle fialové, dlouhé 2 - 8 (i 15)cm, široké 0,3 - 0,5 (i 1)cm, hrbohlavy čárkovité, dlouhé 1,1 - 3cm, areoly eliptické, dlouhé 1 - 3,5mm, široké 0,7 - 2mm, obsahují max. 3 hnědočervené našedlé trny se žlutými špičkami a délou 0,4 - 4,5 (i 5)cm. Květy mají vnitřní korunní lístky světle žluté až žlutě zelené, občas s červeným vrcholem, špičaté, úzce obvejčité a dlouhé 5 - 8mm. Plody jsou žluté až červené (i zelené), mohou být narůžovělé, kulaté až obvejčité, dlouhé 0,9 - 2,7cm, široké 0,6 - 1,2cm a obsahuje světle žlutá semena velikosti 3 - 4,5mm.

Snáší teploty do -10°C.

Množí se řízky nebo semeny.

<https://www.rostliny.net/>