

Erythrochiton

čeleď: Rutaceae

Roste v podobě téměř nevětveného keře nebo stromu. Listy jsou úzce lopatkovité a mohou být zpeřené. Květenství vyrůstá při vrcholu kmene, vlastní květy jsou červené a bílé, kalich trubkovitý, zpravidla červený, velký, mírně 2pyský se 3 - 5ti laloky, 2 dolní a 3 horní jsou zprvu mírně srostlé, dlouho vytrvalé, korunních lístků je 5, trubka je válcovitá, zahnutá, délky kalicha, laloky podlouhlé, tupé a žláznatě tečkované. Plodem je tobolka s 5ti komorami po 2 semenech. Nejznámějším druhem je *E. brasiliensis*.

Erythrochiton brasiliensis

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Brazílii a Peru v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 0,5 - 5m. Borka je tmavá. Listy jsou vodorovné, obvejčitě kopinaté, zašpičatělé (špice dlouhá 1,5 - 2cm), světle zelené, lesklé, dlouhé 40 - 50cm, široké 10cm, báze je úzce klínovitá a žilnatina síťnatá. Kvete bílými dlouze trubkovitými květy s 5ti dlouhými úzce 3úhlými cípy na 1 - 1,5cm stopce po 3 - 8mi ks, kalich je červený, dlouhý 2,5cm, široký 1cm, cípy vejčité, špičaté, široké 4mm, koruna je bílá, trubka lepivá, dlouhá 3cm a široká 2 - 3mm.

Erythrochiton fallax

Erythrochiton giganteus

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Erythrochiton gymnanthus

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice. Dorůstá výšky 1,5 - 6m. Listy jsou střídavé, obvejčité až obkopinaté, dlouhé 14,5 - 36,4cm, široké 3,5 - 11cm, báze je uťatá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 3cm. Kvete bílými květy a koruna má průměr 4,5 - 6cm. Plodem je tobolka rozdělená na 4 - 5 komůrek délky 1,6 - 1,9cm.

Erythrochiton hypophyllanthus

Erythrochiton odontoglossus

Erythrochiton trichanthus

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=4023>

<https://www.rostliny.net/>