

Ipomoea turbinata

synonyma: Calonyction longiflorum, Calonyction muricatum, Calonyction speciosum var. muricatum, Convolvulus colubrinus, Convolvulus muricatus, Ipomoea bona-nox var. purpurascens, Ipomoea muricata, Ipomoea petiolaris, Ipomoea spinulosa

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mexiko, Mississippi, Pákistán, Severní Karolína, Texas

Pravděpodobně pochází z Mexika, ale roste všude v tropech v podobě popínavé jednoletky. Listy jsou široce vejčité až kulaté, zašpičatělé až špičaté, dlouhé 7 - 18cm a báze je srdčitá. Květenstvím je 1 až několikačetný vrcholík, vlastní květy mají kališní lístky vejčité až podlouhlé, špičaté, s osinou délky 4 - 6mm, vnější dlouhé 6 - 7mm, vnitřní délky 7 - 8mm s kratší osinou, koruna je růžovofialová až namodralá, dlouhá 5 - 7,5cm a trubka má délku 3 - 6cm. Plodem je vejčitá tobolka délky 1,8 - 2cm a obsahuje vejčitá černá semena.

<https://www.rostliny.net/>