Vaccinium (Brusnice)

synonyma: Rhodococcum

čeleď: Ericaceae

Roste na severní polokouli včetně tropů Madagaskaru a Havajských ostrovů v podobě stálezeleného i opadavého keře nebo dokonce stromu. Většinou se řadí mezi terestrické rostliny, ale najdou se i epifytní druhy. Listy jsou střídavé, kožovité, celokrajné i pilovité a krátce řapíkaté. Kvete samostatnými květy nebo v hroznech, vlastní květy jsou 4 - 5tičetné, stejně tak i kalich. Plodem je bobule s vytrvalým kalichem. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Beckyblue' - kmínky tmavě červené; listy modré, nazelenalé, na podzim modře žluté
- 'Northblue' - výška 60 - 70cm; větve v mládí zelené; listy bledě zelené
- 'Northcountry' - výška 60cm, podobná 'Northblue', ale rannější; plody modré, ojíněné
- 'Pink Lemonade' - plody růžové

Vyhovují ji kyselé vlhčí lehké písčité půdy.

Množí se semeny, hřížením, dělením nebo polovyzrálými řízky.

Vaccinium absconditum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Větve jsou dlouhé 50cm, v mládí řídce ochlupené. Listy jsou eliptické, přišpičatělé, kožovité, celokrajné, dlouhé 4 - 6,3cm, široké 1,5 - 2,5cm, na spodní straně řídce žláznatě ochlupené a řapíky jsou dlouhé 3 - 4mm. Kvete samostatnými květy, trubka je 5tihranná, dlouhá 3 - 4mm, koruna baňkovitá, 6tilaločná, světle červená, dlouhá 9mm, v průměru má 6 - 7mm.

Vaccinium acosta

Vaccinium acrobracteatum

synonyma: V. adenanthum, V. lageniforme, V. papuanum, V. tiariforme, V. torricellense

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji obvykle v podobě epifytického bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 5m. Větve jsou na konci načervenalé a holé. Listy bývají obvejčité, tupé, kožovité, lesklé, žláznaté, dlouhé 2,4 - 9cm, široké 1 - 5,5cm a řapíky jsou červené, dlouhé 2 - 7mm. Kvete v paždí v téměř vzpřímených 3 - 10tičetných žláznatě ochlupených hroznech, listen je dlouhý 0,6 - 2cm široký 2 _ 5mm, vlastní květy mají korunu červenou až bílou, baňkovitou, dlouhou 0,6 - 1cm a v průměru má 3 - 5mm. Plody jsou zploštěle kulovité, červené až narůžověle fialové o průměru 6 - 7mm.

Vaccinium acuminatissimum

synonyma: Adnaria lanceolata, Agapetes acuminatissima, Agapetes lanceolata, Gaylussacia lanceolata, Rigiolepis lanceolata, V. lanceolatum

oblasti: Jáva, Malajský poloostrov, Sumatra

Existují vnitrodruhové taxony:

- f. acuminatissimum/f. javanicum/f. sumatranum/var. singalense/Thibaudia singalensis/Rigiolepis lanceolata f. sumatrana/V. lanceolatum f. sumatranum - Sumatra, Malajský poloostrov, Jáva; epifyt nebo šplhavý keř; délka až 30m při průměru kmene do 8cm; listy vejčité, ocasovité, kožovité, v mládí ochlupené, okraj mírně podvinutý, dlouhé 9 - 14cm, široké 1,8 - 4,7cm, spodní strana žláznatá, řapíky ochlupené, dlouhé 2 - 5mm; květenstvím je 8 - 15tičetný hrozen, vlastní květy baňkovité, bílé až béžové, dlouhé 2,5 - 3mm, průměr do 2,5mm; plody kulovité, červené, průměru 4mm
- f. ellipticum/Rigiolepis lanceolata f. elliptica/V. lanceolatum f. ellipticum - listy eliptické, občas zkosené, přišpičatělé, dlouhé 7 - 13cm, široké 2,5 - 4,7cm
- f. marapiense/Rigiolepis lanceolata f. marapiensis/Rigiolepis lanceolata f. lanceolatum - Sumatra; listy kožovité, dlouhé 4,2 - 8,5cm, široké 1,1 - 2cm

Vaccinium acutissimum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře (i stromu). Existují vnitrodruhové taxony:

- var. acutissimum - výška 2 - 4m; větve pruhované; listy vejčité, až ocasovité, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 2,3 - 3cm, široké 1 - 1,7cm, řapíky dlouhé 2 - 5mm; květenství hroznovité 5 - 8mičetné, koruna baňkovitá, dlouhá 5 - 6mm, průměru 2,5mm
- var. psilostylum - výška 1m; květy červené

Vaccinium adenochaetum

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru.

Vaccinium adenopodum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, ocasovité, kožovité, lesklé, holé, celokrajné, dlouhé 10 - 15cm, široké 3 - 4cm, spodní strana žláznatě tečkovaná a řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm. Kvete v téměř vzpřímených 12 - 20tičetných hroznech, koruna je dlouze baňkovitá, žlutá, dlouhá 2mm, průměru 1,5mm.

Vaccinium adenotrichum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě šplhavého epifytického keře. Listy jsou dlouze obvejčité, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 6 - 8,5cm, široké 2,5 - 6cm, na spodní straně řídce žláznatě ochlupené a řapíky jsou dlouhé 5 - 6mm. Kvete v paždí listů ve skupinách 5 - 8mičetných hroznů, koruna je baňkovitá, růžově červená, dlouhá 7 - 8mm a o průměru 3 - 4mm.

Vaccinium affinis

Vaccinium agusanense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře (může být i epifytický). Dorůstá výšky do 4m. Listy jsou kopinaté, ocasovité, téměř kožovité, celokrajné, holé, na okraji mírně podvinuté, dlouhé 7 - 10cm, široké 3 - 5cm a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Kvete v paždí v mírně převislých bohatých hroznech, květy mají baňkovitou korunu v barvě béžové až růžové, je dlouhá 5mm a v průměru má 2,5 - 3mm. Plodem je zakulacená bobule průměru 5mm.

Vaccinium aitapense

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě nízkého stromu. Listy jsou kopinaté, ocasovité, téměř kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 5 - 8cm, široké 1,5 - 3cm a řapíky jsou dlouhé 4 - 5mm. Kvete v bohatých hroznech v paždí listů, koruna je dlouze baňkovitá, růžová, holá, dlouhá 3,5 - 4mm a v průměru má 2mm.

Vaccinium alainii

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Vaccinium alaskaense

oblasti: Aljaška, Oregon, Washington

Vaccinium albicans

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě křovitého stromu. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. albicans - výška do 12m; listy eliptické až kopinaté, ocasovité, žláznaté, kožovité, dlouhé 5 - 10cm, široké 2 - 4,5cm, řapíky ploché, dlouhé 5 - 8mm; hrozny bohaté, seskupené po 3 - 5ti ks, listen dlouhý do 1,2cm, široký 3mm, koruna baňkovitá, bílá, nazelenalá nebo narůžovělá, dlouhá 0,8 - 1,1cm, průměru 3- 4mm; plodem červeně růžově fialová bobule průměru do 6mm

- var. pseudopsammogenes - květy mají korunu dlouhou 6 - 7mm
- var. pubens - listy na okraji žláznaté; květy mají ochlupenou korunu dlouhou 6 - 8mm

Vaccinium albidens

oblasti: Guizhou, Yunnan

Roste v Číně v podobě bohatě větveného keře až stromu. Dorůstá výšky 1 - 6m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, mohou být ochlupené, široce kopinaté, mírně kožovité, pilovité, špičaté, dlouhé 3 - 7cm, široké 1,5 - 2,5cm, báze zakulacená a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je 8 - 16tičetný hrozen délky 1,5 - 4cm, květy mají 1 - 1,5mm stopku a bílou trubkovitou korunu délky 6mm. Plodem je 10tikomorová bobule průměru 4mm.

Vaccinium almedae

oblasti: Panama

Roste v Panamě jako epifyt. Dorůstá délky 1 - 2m. Listy jsou eliptické, dlouhé 6 - 18cm, široké 3 - 7,5 (i 9)cm, žilnatinu tvoří 3 - 5 žilek. Květenstvím je (2 -) 4 - 10tikvětý hrozen, listeny jsou dlouhé do 8mm, listence dlouhé 0,6 - 1,5mm, stopka má délku 0,5 - 1cm, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich má velikosti 3 - 4mm, trubka dlouhá 1,5 - 2,2mmm, široká 1,6 - 2mm, lem je dlouhý 1,5 - 1,8mm. Plodem je bobule průměru 3 - 4mm.

Vaccinium altiterrae

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium altomontanum

Vaccinium alvarezii
synonyma: V. turbinatum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře nebo stromu. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. alvarezii - obvykle epifyt; výška 3m; listy řídké, obvejčité, přišpičatělé, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 5 - 10cm, široké 2 - 6cm, na spodní straně žláznatě ochlupené a řapíky dlouhé 4 - 7mm; hrozny vyrůstají v paždí listů, jsou 10 - 25tičetné, dlouhé 3 - 9cm, koruna dlouze válcovitá, bílá až červená, holá, dlouhá 1 - 1,1cm, průměru 5mm; plodem je zploštělá černá bobule průměru 5 - 6mm
- var. moisense - květy drobně ochlupené

Vaccinium amakhangium

oblasti: Ásám

Roste v Indii.

Vaccinium amazonicum

oblasti: Peru

Roste v Peru.

Vaccinium ambivalens

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 3 - 5m. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, celokrajné, dlouhé 6 - 12cm, široké 2 - 6cm, na spodní straně žláznatě ochlupené, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 5 - 9mm. Kvete v 4 - 8mičetných hroznech, koruna dlouze soudkovitá, bílá až růžová, dlouhá 7mm, průměru 4mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 7mm.

Vaccinium amblyandrum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. amblyandrum - větve poléhavé, výška 25 - 60cm, v mládí ochlupené; listy eliptické, přišpičatělé, kožovité, lesklé, vroubkované, dlouhé 4 - 9mm, široké 3mm, na spodní straně ochlupené a řapíky jsou dlouhé 1mm; samostatné květy, koruna široce baňkovitá, bílá až růžová, dlouhá 7mm, průměru 6mm; bobule černá, průměru 0,7 - 1cm
- var. maiusculum - listy dlouhé 0,8 - 1,4cm, široké 4 - 6mm
- var. pungens - výška 30 - 70cm; listy dlouhé 0,8 - 1,4cm, široké 4 - 6mm

Vaccinium ambyandrum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium amoenum

Vaccinium amphoterum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 6 (i 12)m. Listy husté, eliptické, přišpičatělé, kožovité, zvlněné, mírně podvinuté, řídce žláznaté, dlouhé 3 - 4,5cm, široké 2 - 2,8cm a řapíky dlouhé 4 - 7mm. Kvete po 2 - 3 hroznech v paždí listů, jsou 6 - 12tičetné,

jednostranné, koruna baňkovitá, narůžovělá, dlouhá 7 - 8mm a průměru 3 - 4mm. Plodem je zploštělá žláznatě hrbolatá bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium amplexicaule

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 50cm. Listy jsou vejčité, kožovité, dlouhé 2,8 - 4,3cm, široké 2 - 2,8cm, na bázi srdčité a řapíky dlouhé 2 - 3mm. Kvete v 10 - 13tičetných hroznech, koruna baňkovitá, bílá, dlouhá 6 - 7mm a průměru 8mm.

Vaccinium amplifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji. Listy jsou eliptické. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. amplifolium - může být i epifytní; výška až 10m (popínavé do 8m); listy kožovité, celokrajné či žláznatě zoubkované, dlouhé 3 - 6,5cm, široké 2 - 5cm, okraje podvinuté, řapíky dlouhé 4 - 8mm; hrozny červené, 5 - 12tičetné, koruna zvonkovitá, růžová (i zelenobílá), 5tilaločnatá, dlouhá 5 - 7mm; bobule široce vejčité, dlouhé 5mm, průměru 4mm
- var. giganteum - listy dlouhé 5 - 9,5cm, široké 3 - 5,5cm
- var. oblongum/V. atrescens/V. oblongum - listy dlouhé 1,5 - 4cm, široké 0,8 - 1,5cm; květy červené
- var. stabilipes/V. stabilipes - listy dlouhé 3 - 5cm, široké 1,5 - 3cm

Vaccinium ampullaceum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě šplhavého keře nebo epifytu. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vejčité, špičaté, kožovité, ochlupené, celokrajné, dlouhé 2 - 4cm, široké 1,5 - 4, báze srdčitá a řapíky dlouhé 2mm. Kvete v téměř vzpřímených 6 - 12tičetných hroznech, listen dlouhý do 2cm, široký 8mm, koruna má délku 1cm a je bílá až červená.

Vaccinium andersonii

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě epifytického keře. Listy jsou eliptické, přišpičatělé, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 5 - 10cm, široké 3 - 5cm, báze zakulacená a řapíky dlouhé 4 - 5mm. Hrozny bohaté, žláznaté, koruna baňkovitá, žlutá, dlouhá 4mm a široká 2,5mm. Plodem je bobule průměru 5mm.

Vaccinium angiense

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře či stromu. Dorůstá výšky 2 - 5m. Listy jsou eliptické, kožovité,

mírně podvinuté, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 1,2 - 1,8cm, na spodní straně žláznatě tečkované a řapíky dlouhé 2- 4mm. Hrozny řídké, 8 - 12tičetné, dlouhé 3- 5cm, koruna baňkovitá, růžová, dlouhá 5 - 6mm. Plody kulovité, průměru 4 - 5mm.

Vaccinium angulatum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 4m. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, holé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 3,8 - 8cm, široké 2 - 5cm, na spodní straně žláznatě tečkované a řapíky dlouhé 4 - 8mm. Kvete po 1 - 2 hroznech v paždí listů, jsou 5 - 8mičetné, květy mají trubkovitou růžovočervenou korunu délky 1,6 - 2,2cm a průměru 4 - 5mm. Plodem je zploštělá bobule průměru 4mm.

Vaccinium angustifolium (Brusnice úzkolistá)

synonyma: Cyanococcus angustifolius, Cyanococcus angustifolius var. laevifolius, Cyanococcus pensylvanicus, V. angustifolium f. angustifolium, V. angustifolium f. chiococcum, V. angustifolium f. leucocarpum, V. angustifolium f. nigrum, V. angustifolium var. angustifolium, V. angustifolium var. hypolasium, V. angustifolium var. laevifolium, V. angustifolium var. nigrum, V. brittonii, V. humile, V. lamarckii, V. minutiflorum, V. multiflorum, V. nigrum, V. pensylvanicum, V. pensylvanicum var. angustifolium, V. ramulosum

oblasti: Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Kanadě a USA v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky (10 -) 35 - 50 (i 60)cm. Větve jsou mírně ochlupené. Listy jsou kopinaté, pilovité, modře zelené, lesklé, zelené a na podzim fialové, dlouhé 1,5 - 4,1cm, široké (0,5 -) 0,6 - 1,6 (i 2)cm. Kvete bílými květy zvonkovitého tvaru o průměru 5mm a délce 6 - 7mm v hustých svazcích. Plodem je sladká tmavě modrá kulovitá ojíněná bobule průměru 0,6 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Top Hat' - výška 30 - 50cm, šířka 90cm; listy na podzim červené; květy bílé, bohaté; plody bleděmodré
- var. laevifolium/V. pensylvanicum - výška 50 - 60cm; listy dlouze eliptické, dlouhé 1,5 - 3,5cm; květy bílé, mírně trubkovité, dlouhé 6mm; plody bleděmodré průměru 1 - 1,2cm

Roste v lesích s dobře propustnou půdou s kyselým pH. Je odolná vůči požárům.

Vaccinium apiculatum

oblasti: Nová Guinea

Roste na nové Guineji v podobě velkého keře. Dorůstá výšky až 8m. Listy jsou eliptické, zašpičatělé, kožovité, holé, dlouhé 2 - 3cm, široké 1 - 1,5cm, báze klínovitá a řapíky zploštělé, dlouhé 1 - 3mm. Kvete po 1 - 3 hroznech, jsou 8 - 12tičetné, koruna baňkovitá, růžová, dlouhá 7 - 8mm a průměru 3mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 4mm.

Vaccinium apophysatum

oblasti: Melanésie

Roste na Moluckých ostrovech v podobě keře. Dorůstá výšky až 3m. Listy jsou eliptické, zakulacené, kožovité, holé, dlouhé 1,5 - 3,5cm, široké 0,8 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Hrozny jsou 3 - 5tičetné, koruna dlouze soudkovitá, bílá až červená, dlouhá 5mm a průměru 2,5mm. Plodem je bobule průměru 5mm.

Vaccinium appendiculatum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě šplhavé rostliny. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 7 - 12cm, široké 3,5 - 5,5cm, báze je srdčitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 4mm. Kvete v bohatých hroznech, koruna je soudkovitá, dlouhá 7,5mm a v průměru má 4 - 5mm.

Vaccinium arboreum

synonyma: Batodendron andrachniforme, Batodendron arboreum, Batodendron glaucescens, Batodendron speciosum, V. arboreum var. arboreum, V. arboreum var. glaucescens, V. diffusum

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Roste v USA v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 5 (i 9)m při průměru kmene do 35cm. Listy má stálezelené nebo opadavé, oválné, mohou být drobně zubaté, lesklé, tuhé, mírně zašpičatělé, dlouhé 2,5 - 5 (i 7,5)cm a široké 1,2 - 2cm. Kvete bílými květy o průměru 3 - 4 (i 5)mm, délce 6mm a 5ti okvětními lístky v až 5cm hroznu na 0,8 - 1,2cm stopce, kalich je dlouhý 2,1 - 2,9cm a široký 0,7 - 1,3cm. Plodem je černá bobule průměru 6 - 9mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. glaucescens - listy namodralé

Vaccinium arbuscula

Vaccinium arbutoides

oblasti: Indie, Myanmar (Barma), V Himálaj, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Indii a Myanmaru v podobě epifytického řídkého keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Listy jsou eliptické, kožovité, ocasovité, celokrajné, dlouhé 8 - 13cm, široké 3 - 5cm, na spodní straně ochlupené, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 6 - 9mm. Květenstvím je bohatý hrozen délky 1,5 - 3cm, koruna není známá. Plodem je červená až temně růžově fialová bobule průměru 6 - 7mm.

Vaccinium arctostaphylos (Brusnice medvědí)

synonyma: V. maderense

oblasti: Bulharsko, Černé moře, Gruzie, Írán, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie)

Roste v Bulharsku, Íránu, Malé Asii a Kavkazu v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 5)m. Větve jsou vystoupavé, žlutohnědé, v mládí červené a holé. Listy jsou dlouze vejčité, špičaté, zvlněné, drobně pilovité a dlouhé 3 - 10cm. Kvete v chudých ochlupených postranních hroznech s délkou 3 - 5cm, vlastní květy mají zeleně bílou (i načervenalou) dlouze zvonkovitou korunu délky 5 - 8mm s 5ti laloky. Plodem je kulovitá temně růžově fialová bobule průměru 0,6 - 1cm.

Vaccinium arcuatum
synonyma: Polycodium arcuatum

Vaccinium ardisioides

oblasti: Myanmar (Barma), Thajsko, Yunnan

Roste v Číně, Thajsku a Myanmaru v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,2m. Listy jsou 3 - 5tičetně přeslenité, přisedlé, mírně vejčité až eliptické, kožovité, celokrajné, zašpičatělé, dlouhé 6 - 15cm, široké 2 - 7cm a žilnatinu tvoří 8 - 12 (i 14) párů žilek. Kvete v bohatých jednostranných hroznech po 2 - 4ks na 0,5 - 1,5cm stopce, mají délku 7 - 10cm, koruna je zeleně bílá, soudkovitě trubkovitá a dlouhá 6- 7mm. Plodem je růžově fialově zelená bobule průměru 4mm.

Vaccinium arenicola
synonyma: Polycodium arenicola

Vaccinium argentii

Vaccinium aristatum

oblasti: Ekvádor, Kolumbie

Roste v Ekvádoru a Kolumbii.

Vaccinium arkansanum

Vaccinium artum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického bohatě větveného keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, zakulacené, kožovité, celokrajné, dlouhé 1,5 - 2,5cm, široké 5 - 9mm a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete po 1 - 3 hroznech, jsou 4 - 8mičetné, koruna je trubkovitě soudkovitá, červená, dlouhá 6mm a v průměru má 2mm.

Vaccinium ashei (Brusnice Asheiova)

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní

Karolína, Texas

Roste v USA v podobě opadavého (i stálezeleného) keře. Dorůstá výšky 1 - 5m. Listy jsou široce obvejčité, mohou být pilovité, zelené, dlouhé 4 - 8cm, široké 2 - 3,5cm a na spodní straně žláznatě ochlupené. Květy jsou růžové až červené či bílé, dlouhé 1cm a mají soudkovitý tvar. Plodem je černá bobule.

Potřebuje vyšší teploty.

Vaccinium atlanticum

oblasti: New York

Roste v USA.

Vaccinium atrococcum

synonyma: Cyanococcus atrococcus, Cyanococcus fuscatus, Cyanococcus virgatus, V. arkansanum , V. atrococcum f. atrococcum, V. corymbosum var. atrococcum, V. fuscatum

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie

Roste na východě USA v podobě opadavého bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1,5 - 3m. Listy jsou eliptické, celokrajné, dlouhé 3,5 - 7,5cm a spodní strana je ochlupené. Kvete v hroznech, květy mají soudečkovitou korunu v barvě růžové až zelené s 5ti drobnými cípy a má délku 5 - 6mm. Plodem je černá bobule průměru 5 - 8mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Leucococcum' - plody bílé, průsvitné

Vaccinium aucupis

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě keře až stromu. Listy jsou řídké, vejčité, špičaté, kožovité, žláznaté, mírně lesklé, celokrajné, podvinuté, dlouhé 11 - 16cm, široké 4,5 - 6,5cm a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1cm. Hrozny jsou 7 - 12tičetné, koruna válcovitá, bílá, dlouhá 4 - 5mm, hluboce 5tilaločnatá. Plodem je bobule průměru 3mm.

Vaccinium auriculifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 1,2 - 3m. Listy jsou střechovité, vejčité, přišpičatělé, kožovité, celokrajné, dlouhé 2,5 - 6cm, široké 2 - 5cm, báze srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3mm. Kvete po 1 - 2 hroznech, jsou 3 - 12tičetné, květy mají široce soudkovitou růžovou korunu délky 4mm a průměru 5 - 6mm. Plodem je uťatá temně růžově fialová bobule o průměru 7 - 8mm.

Vaccinium australe

Vaccinium bancanum
synonyma: V. adenurum, V. suluense

oblasti: Borneo, Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov, Sumatra, Thajsko

Roste v Thajsku, Borneu, Jávě, Malajsii a Sumatře. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. bancanum - Sumatra, Borneo; keř až strom; výška 2 - 6 (i 10)m při průměru kmene do 25cm; borka šedá; větve hranaté; listy eliptické, tupě špičaté, kožovité, zelené, lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 3,5 - 8cm, široké 2 - 4cm, báze klínovitá a řapíky dlouhé 2 - 4mm; květenstvím je téměř vzpřímený bohatý hrozen délky 4 - 8cm, květy válcovitě baňkovité, bílé, nazelenalé nebo načervenalé, dlouhé 5 - 8mm, s průměrem 2,5 - 3mm; plody červenorůžovofialové bobule s průměrem 4mm
- var. kemulense - Borneo; listy mírně vejčité, tupě špičaté, dlouhé 3 - 4cm, široké 1,5 - 2cm
- var. kunstleri/V. breviflos/V. kunstleri - Sumatra, Malajský poloostrov; občas i epifyt; výška do 6m; listy úzce eliptické, zašpičatělé, mírně kožovité, dlouhé 3,5 - 7cm, široké 1,3 - 2,5cm
- var. tenuinervium/V. ardisiiflorum/V. ardisioides/V. eburneum/V. kunstleri/V. micrantherum/V. wrayi - Sumatra; Malajský poloostrov, Jáva, Borneo; listy kopinaté, mírně ocasovité; květy mají bílou nebo narůžovělou korunu délky do 7mm, průměru 4mm

Vaccinium bangliangense

oblasti: JV Čína

Roste v Číně.

Vaccinium banksii

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 7m při průměru kmene do 20cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, přišpičatělé, kožovité, mírně podvinuté, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 0,8 - 1,6cm, spodní strana mírně hrbolkatá, báze klínovitá a řapíky dlouhé 2 - 3mm. Kvete v paždí listů v řídkých 4 - 12tičetných téměř vzpřímených hroznech, koruna soudkovitá, červená, dlouhá 7mm a průměru 2,5 - 3mm. Plodem je ochlupená bobule průměru 5mm.

Vaccinium barandanum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. barandanum - keř až strom; výška 2 - 8m; listy kopinaté, oba konce zašpičatělé, celokrajné, kožovité, dlouhé 6 - 15cm, široké 2,5 - 5,5cm a řapíky dlouhé 0,5 - 1cm; květe po 2 - 3 vzpřímených bohatých hroznech o délce 4 - 10cm, vlastní květy zvonkovité, dlouhé 2mmm, široké 2,5mm, okraj

5tizubý, stopky dlouhé 0,4 - 1cm; plodem je temně červená bobule průměru 6mm
- var. cagayanense - listy vejčitě kopinaté; kalich ochlupený
- var. hutchinsonii - listy mírně vejčité, dlouhé 8 - 10cm, široké 5,5 - 7cm, řapíky dlouhé 1 - 1,5cm; hrozny dlouhé 8 - 14cm, koruna dlouhá 1,4 - 1,7cm

Vaccinium barbatum (Brusnice vousatá)

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Listy jsou obvejčité, kožovité, celokrajné, na okraji světlejší, mírně podvinuté, dlouhé 4 - 7mm, široké 3 - 4mm, báze klínovitá a řapíky dlouhé 1 - 2mm. Kvete samostatnými převislými 4 - 5tičetnými květy, koruna je růžová, soudkovitá, dlouhá 4mm a v průměru má 3mm.

Vaccinium bartlettii
synonyma: V. lucidum var. pumilum

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře v podobě keře (i epifyt). Lity eliptické, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 0,7 - 1,2cm, široké 4 - 7mm, báze klínovitá a řapíky dlouhé 1 - 2mm. Kvete v paždí v 2 - 8mičetných hroznech, vlastní květy mají dlouze soudkovitou červenou až červeně hnědou korunu délky 8 - 9mm, průměru 2,5 - 3mm a stopky jsou dlouhé 5 - 9mm. Plodem je temně zbarvená bobule průměru 4mm.

Vaccinium beamanianum
synonyma: V. cordifolium

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Vaccinium bellum
synonyma: Polycodium bellum

Vaccinium benguelense

Vaccinium benguetense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 10m. Listy jsou eliptické, zašpičatělé, kožovité, lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 5 - 10cm, široké 1,5 - 4,8cm, báze kopinatá a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,2cm. Kvete v paždí listů 8 - 20tičetnými hrozny o délce 3 - 8cm, vlastní květy jsou soudkovité, červené až bílé, dlouhé 6mm, průměru 3mm a mají 3 - 5mm stopky. Plodem je bobule průměru 6mm.

Vaccinium besagiense

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Listy jsou obvejčité, kožovité, celokrajné, mírně zvlněné a podvinuté, dlouhé 1,8 - 3cm, široké 0,6 - 1,1cm, spodní strana je mírně žláznatě hrbolkatá, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5mm. Květenstvím je úžlabní hrozen, vlastní květy mají soudkovitou korunu délky 4 - 5mm a průměru 3mm. Plodem je bobule průměru 3,5mm.

Vaccinium bigibbum

synonyma: Rigiolepis bigibba

oblasti: Borneo

Roste v podobě keře (může být i epifytické). Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 7,5 - 21cm, široké 3 - 8cm, na spodní straně žláznaté a řapíky jsou dlouhé 6 - 8mm. Květe po (1 -) 2 - 3ks hroznů v paždí listů v délce 2 - 7cm, vlastní květy jsou soudkovité, béžové až žluté, dlouhé 4mm, v průměru mají 2,5mm a stopky jsou dlouhé 2 - 6mm. Plodem je bobule.

Vaccinium bissei

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Vaccinium blepharocalyx

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného (i epifytického) keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Listy jsou husté, kopinaté, ocasovité, mírně kožovité, celokrajné, dlouhé 4 - 7cm, široké 1,3 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Kvete v paždí listů v 6 - 12tičetných hroznech, vlastní květy mají široce soudkovitou světle růžovou korunu délky 4mm.

Vaccinium blumeanum

Vaccinium bocatorense

oblasti: Panama

Roste v Panamě. Listy jsou vejčité, dlouhé 4 - 6,5cm, široké 3,5 - 5cm a řapíky jsou dlouhé 0,2 - 3cm. Květenstvím je hrozen, listeny jsou dlouhé 3 - 6mm, listence jsou dlouhé 4 - 6mm, vlastní květy mají 1 - 1,5 (i 2)cm stopku, kalich má velikost 0,7 - 1cm, trubka je dlouhá 3,5 - 4mm, laloky mají velikost 4 - 5mm, koruna je červená a velikosti 7 - 9mm.

Vaccinium bocatorensis

Vaccinium bodenii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guinei v podobě keře. Listy jsou eliptické, zaoblené, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 0,6 - 1cm, široké 3 - 5cm, na spodní straně žláznatě tečkované a řapíky jsou dlouhé 1mm. Kvete samostatnými květy v paždí listů, mají korunu soudkovitou, dlouhou 5mm, širokou 3 - 4mm a stopky jsou dlouhé 1 - 3mm. Plodem je bobule.

Vaccinium boninense

oblasti: J Japonsko

Roste v Japonsku.

Vaccinium boreale

oblasti: Labrador, Maine, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Quebec, Vermont

Roste v Kanadě a USA v hustých koloniích. Dorůstá výšky 10 - 90cm. Listy jsou opadavé, zelené, úzce eliptické, dlouhé 0,8 - 2,1cm a široké 2 - 6mm. Květy mají zelený kalich, koruna je bílá až zeleně bílá, válcovitá a velikosti 3 - 4mm. Plodem je modrá bobule průměru 3 - 5mm.

Vaccinium borneense (Brusnice bornejská)

synonyma: Rigiolepis borneensis, V. acuminatissimum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. borneense - šplhavý i epifytický keř; výška do 4m; listy eliptické, špičaté až ocasovité, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 6 - 16cm, široké 1,8 - 6cm, na spodní straně žláznatě ochlupené a řapíky dlouhé 3 - 5mm; kvete v bohatých hroznech, vlastní květy mají korunu soudkovitou, bílou, nazelenalou nebo béžovou (i narůžovělou), dlouhou 2,5 - 3,5mm, průměru 1,5 - 2mm; plodem je oranžová až žlutá bobule průměru 4,5mm
- var. poianum/Rigiolepis poiana/V. poianum - větve v mládí ochlupené; listy úzce vejčité, ocasovité, dlouhé 5,5 - 12cm, široké 1,3 - 3,2cm; hrozny dlouhé 1,5 - 6cm

Vaccinium brachyandrum

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného šplhavého keře. Listy jsou řídké, mírně vejčité, kožovité, celokrajné, krátce ocasovité, dlouhé 8,5 - 11cm, široké 4 - 6cm, báze zakulacená a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1cm. Květenstvím je bohatý hrozen délky 1,5 - 3,5cm, vlastní květy jsou soudkovité a

dlouhé 4mm.

Vaccinium brachybotrys

synonyma: V. brachybotrys var. glaucocarpum, V. donianum var. brachybotrys, V. greenwayae, V. sprengelii

oblasti: Sichuan, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky (0,5 -) 1 - 5m. Listy jsou vejčité, zoubkované, špičaté, dlouhé 3 - 8cm, široké 1,5 - 3cm, báze klínovitá a řapíky dlouhé 1 - 3mm. Květenstvím je bohatý hrozen délky 3 - 6cm, vlastní květy soudkovité, růžově fialové až růžové a dlouhé 6 - 7mm. Plodem je bobule průměru 5mm.

Vaccinium brachycladum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě hustého keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Listy jsou obvejčité, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 0,6 - 1cm, na spodní straně žláznatě hrbolkaté a řapíky dlouhé 2mm. Kvete samostatnými převislými přisedlými květy v paží listů, koruna je trubkovitě soudkovitá, červená, dlouhá 7mm a průměru 3mm. Plodem je bobule.

Vaccinium brachygyne

synonyma: V. obovalifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 8m. Větve jsou v mládí načervenalé. Listy jsou bohaté, mírně obvejčité, kožovité, holé, dlouhé 2 - 5cm, široké 0,8 - 2,8cm, báze klínovitá, spodní strana žláznatá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 6mm. Květenstvím je 2 - 6tičetný hrozen, vřeteno dlouhé 0,5 - 1,5cm, vlastní květy převislé, stopky dlouhé 4 - 7mm, koruna baňkovitá, růžová, dlouhá 1cm, široká 4mm. Plody jsou tmavé, kulovité s průměrem 3,5mm.

Vaccinium brachytrichum

synonyma: V. foxworthii

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře. Větve jsou krátce ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 2,5 -3,5cm, široké 1 - 2cm, žilnatina je na spodní straně vyniklá, žilnatinu tvoří 1 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je 5 - 8mičetný hrozen, vřeteno má délku 2 - 3cm, vlastní květy mají stopky délky 3 - 5mm, koruna baňkovitá, dlouhá 5 - 6mm a široká 2,5mm. Plody jsou kulovité, krátce ochlupené a v průměru mají 4mm.

Vaccinium bracteatum

synonyma: Agapetes acosta, Agapetes spicata, Andromeda sinensis, Epigynium acosta, Epigynium

malaccense, Pieris divaricata, Pieris lucida, Pieris ovalifolia var. denticulata, V. bracteatum var. bracteatum, V. bracteatum var. longitubum, V. malaccense, V. malaccense var. bancanum, V. pubicarpum

oblasti: Fujian, Guangdong, Guangxi, Indonésie, Japonsko, Kambodža, Korea, Laos, Malajsie, Thajsko, Vietnam, Zhejiang

Roste ve východní a jihovýchodní Asii v podobě stálezeleného bohatě větveného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 9m. Větve jsou v mládí drobně ochlupené. Listy jsou mírně kopinaté, oboustranně špičaté, prakticky kožovité, bledězelené, jemně vroubkované, dlouhé 1 - 9cm, široké 0,7 - 4cm, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4 (i 8)mm. Květenstvím je úžlabní bohatý hrozen s vřetenem délky 2,5 - 8 (i 15)cm, vlastní květy mají 1 - 6mm stopky, kališní trubku dlouhou 1 - 1,5mm, listence dlouhé 1 - 3mm, koruna bílá (i narůžovělá), baňkovitá, ochlupená, dlouhá 5 - 7mm. Plody jsou tmavě růžovofialové, kulovité, ochlupené a v průměru mají 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. bracteatum/var. longitubum/V. malaccense/Acosta spicata/Pieris divaricate/Pieris lucida/Pieris ovalifolia var. denticulate - Kambodža, Indonésie, Japonska, Korea, Laos, Malajsie, Thajsko, Vietnam - listy mohou být ochlupené, dlouhé 4 - 9cm, široké 2 - 4cm; květy bílé
- var. chinense/V. chinense/Andromeda chinensis - Čína; povrch prakticky holý; listy dlouhé 1 - 4cm, široké 0,7 - 1,4cm; květy bílé, trubka průměru 3 - 4mm
- var. obovatum - Čína; povrch praticky holý; listy obvejčité, zaoblené, dlouhé 1,2 - 1,4cm, široké 9mm, na okraji zubaté, báze klínovitá; květy bílé, trubka průměru 3 - 4mm
- var. rubellum - Čína; listy eliptické až obvejčité; květy načervenalé, trubka průměru 2 - 3mm

Vaccinium brassii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 8 - 12m. Větve jsou vzpřímené a hranaté. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, tuhé, modrozelené, hrbolkaté, celokrajné, mohou být trochu podvinuté, dlouhé 2 - 3,5cm, široké 1 - 2cm, na spodní strana řídce žláznaté, žilnatinu tvoří 2 páry žilek a řapíky jsou ploché, dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím jsou 2 - 3 hrozny, které jsou prakticky přisedlé, mírně převislé, 8 - 12tičetné, vřeteno hranaté, dlouhé 2 - 5cm, vlastní květy mají stopky délky 0,8 - 1,2cm, kalich růžově fialově šedý, trubka zvonkovitá, dlouhá 2 - 3mm, koruna široce trubkovitá až baňkovitá. Plodem je růžově fialová nasivělá bobule o průměru 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. brassii
- var. madarum - květenstvím je delší řidší hrozen, vlastní květy mají mírně delší stopky, kalich ojíněný a holý

Vaccinium breedlovei

synonyma: V. tolbertianum

oblasti: Guatemala, JV Mexiko

Roste v Guatemale a Mexiku v podobě keře. Listy jsou kožovité, mírně vejčité, špičaté, holé, dlouhé 8 - 10cm, široké 4 - 5c a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1cm. Květenství je úžlabní, chudé, dlouhé 3 - 4cm, vlastní květy nazelenalé, mají až 7mm stopky, listeny délky 1mm, semeníky mají v průměru 2mm, kalich je dlouhý 3 - 4mm, trubka dlouhá 2,2 - 2,3mm, široká 2mm, koruna zvonkovitá, dlouhá 5 -

6,5mm, široká 6 - 7mm a tyčinek je 10ks.

Vaccinium brevipedicellatum

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stálezeleného bohatě větveného stromu nebo keře. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 8)m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou eliptické, kožovité, holé, dlouhé 1,5 - 2 (i 3)cm, široké 0,8 - 1,2cm, žilnatina je vystouplá, tvoří ji 1 - 2 páry žilek, báze klínovitá, okraj podvinutý, celokrajný, špičatý a řapíky jsou ochlupené, dlouhé 1,5 - 2mm. Květenství je hroznovité, 1 - 3četné, dlouhé 2cm, ochlupené, listeny opadavé, vlastní květy mají stopky délky 1mm, koruna je nazelenalá a dlouhá 3 - 4mm. Plody jsou červené až temně růžově fialové, kulovité a v průměru mají 4 - 5mm.

Vaccinium brevipedunculatum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného epifytického keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve jsou převislé, v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 1,6 - 3cm, široké 0,7 - 1,4cm, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je 1 - 3četný hrozen, vlastní květy mají 2mm stopky délky 1,1 - 2,2cm, kalich kožovitý, koruna baňkovitá, bílá, načervenalá nebo růžová.

Vaccinium bullatum

synonyma: Agapetes bullata

oblasti: Guangxi, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stálezeleného řídkého keře. Dorůstá výšky 2m. Větve jsou hranaté a v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, špičaté, kožovité, prakticky holé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 9 - 16cm, široké 5 - 8cm, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek, báze je kulatá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 5 - 8cm, vlastní květy mají 6 - 9mm stopky, kališní laloky jsou kopinaté, dlouhé 2 - 3mm a koruna není známá. Plody jsou kulovité a široké 7mm.

Vaccinium bulleyanum

synonyma: Agapetes bulleyana, Agapetes bulleyana var. tenuifolia, Agapetes bulleyanum

oblasti: Myanmar (Barma), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1,2 - 2,5m. Větve jsou růžově fialově hnědé a v mládí ochlupené. Listy vyrůstají ve 4 - 6tičetných přeslenech, jsou prakticky přisedlé, mírně obkopinaté, špičaté, kožovité, holé, dlouhé 7 - 11cm, široké 1,5 - 3,2cm a báze kulatá. Květenství je chocholičnatě hroznovité, úžlabní, dlouhé 2 - 6cm, holé, listeny kopinaté, dlouhé 3mm, vlastní květy mají 1 - 1,5cm stopky, kalich je dlouhý 2mm, laloky dlouhé 2,5 - 3,5mm, koruna je žlutě zelená, soudkovitá a dlouhá 5 - 9mm. Plodem je kulovitá bobule.

Vaccinium burburan

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Vaccinium caesariense

oblasti: Florida, Georgia, Jižní Karolína, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Virginie

Roste v USA jako trvalka.

Vaccinium caesium

Vaccinium caespitosum (Brusnice trsnatá)

synonyma: V. arbuscula, V. caespitosum var. angustifolium, V. caespitosum var. arbuscula, V. caespitosum var. caespitosum, V. caespitosum var. cuneifolium, V. caespitosum var. paludicola, V. geminiflorum, V. nivictum

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ontario, Oregon, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, SV Mexiko, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Roste v USA, Kanadě a Mexiku v podobě rozložitého nepravidelného řidšího keře. Dorůstá výšky do 30 (i 60)cm. Listy jsou mírně obvejčité až obkopinaté, holé, celokrajné nebo drobně pilovité, zelené, dlouhé 1 - 3 (i 4)cm a široké 0,3 - 1,2cm. Kvete samostatnými růžovými až bělavými nebo růžově skvrnitými báňovitými až kulatými květy délky 4 - 7mm a šířky 3 - 5mm. Plodem je kulovitá modročerná ojíněná bobule průměru (5 -) 6 - 8 (i 9)mm a obsahují semena délky 1mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. caespitosum/var. arbuscula/V. arbuscula

Vaccinium calycinum

synonyma: Metagonia calycina, V. cereum, V. fauriei, V. hamatidens, V. meyenianum

oblasti: Havajské ostrovy

Roste na Havajských ostrovech.

Vaccinium cambodianum

oblasti: Kambodža

Roste v Kambodži.

Vaccinium camiguinense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě nízkého stromu. Listy jsou mírně obvejčité, špičaté, kožovité, holé, celokrajné, prakticky podvinuté, dlouhé 3,5 - 8cm, široké 1,5 - 3,5cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou zploštělé, dlouhé 1 - 4mm. Květenstvím je hrozen objevující se po 3 - 4ks, je téměř vzpřímený, 10 - 20tičetný, vřeteno má délku 4 - 6cm, vlastní květy mají 1cm stopku, korunu úzce baňkovitou, na vnitřní straně řídce ochlupenou, dlouhou 7mm a širokou 3mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 4mm.

Vaccinium campanense

oblasti: Panama

Roste v Panamě jako epifyt. Listy jsou vejčité, dlouhé 2 - 4,7cm, široké 1,2 - 2,4cm. Květenstvím je úžlabní 1 - 3květý hrozen velikosti 1 - 2,5cm na 0,7 - 1,5cm stopce, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich délky 8mm s trubkou délky 2 - 3,5mm, lem má délku 5,5mm, laloky jsou dlouhé 4 - 5mm a široké 2 - 2,7mm.

Vaccinium candicans

synonyma: Polycodium candicans, Polycodium melanocarpum var. candicans, V. melanocarpum var. candicans

Vaccinium candidum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium capillatum

synonyma: V. minuticalcaratum f. capillatum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 2 - 16m. Borka je šupinatá, hnědá. Listy jsou eliptické, ocasovité, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 4 - 10cm, široké 2 - 3cm, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 7mm. Květenstvím je téměř vzpřímený 5 - 15tičetný hrozen (může být i párovitý) délky 2 - 2,5cm, vlastní květy mají 0,9 - 1,2cm stopky, listen délky 1,5 - 2cm, koruna dlouze baňkovitá, bílá až růžová, dlouhá 9mm a široká 3 - 4mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 4mm.

Vaccinium capillipes

synonyma: Rigiolepis salicifolia, V. salicifolium

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě epifytického keře. Listy jsou kopinaté, ,špičaté, v mládí ochlupené, řídce žláznatě tečkované, lesklé, mírně kožovité, celokrajné, dlouhé 4,8 - 10cm, široké 0,8 - 2,3cm,

žilnatinu tvoří 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3mm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý 7 - 15tičetných hrozen, vřeteno je dlouhé 2,3 - 4,8cm, květy mají stopky délky 5 - 6mm, koruna baňkovitá, žlutá až červená, dlouhá 4mm a široká 3mm. Plodem je kulovitá bobule oranžovočervené barvy průměru 4,5mm.

Vaccinium cardiophorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Listy jsou vejčité, ocasovité, mírně kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 5 - 8cm, široké 3 - 4cm, centrální žebro mírně zapuštěné, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenstvím je řídký 8 - 10tičetný prakticky přisedlý hrozen s 1 - 2cm vřetenem, vlastní květy mají stopky délky 0,8 - 1cm, trubka je dlouhá 2,5mm. Plodem je obkuželovitá ochlupená bobule délky 5mm, průměru 4 - 5mm na 1,2 - 1,8cm stopce.

Vaccinium cardonae

Vaccinium carlesii

oblasti: J Čína, JV Čína

Roste v Číně v podobě stálezeleného bohatě větveného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 6)m. Listy jsou řídce jemně ochlupené, drobně pilovité, mírně vejčité, špičaté, kožovité, dlouhé 2 - 7cm, široké 1 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 6 párů žilek, báze je zaoblená a řapíky jsou dlouhé 1 - 5mm. Květenství je hroznovité, 6 - 15tičetné, dlouhé 2 - 3,5cm, listeny dlouhé 0,2 - 0,5 (i 1,3)cm, vlastní květy mají 2mm stopky, listence dlouhé 1 - 3mm, koruna bílá, zvonkovitá, dlouhá 3 - 5mm. Plody jsou tmavě růžově fialové, kulovité a ojíněné.

Vaccinium carmesinum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Vaccinium carneolum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromu nebo keře (může být i šplhavý nebo epifytický). Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou kopinaté, ocasovité, kožovité, tuhé, holé, lesklé, celokrajné, mohou být mírně podvinuté, dlouhé 4,5 - 10cm, široké 1,5 - 4cm, žilnatinu tvoří 5 - 9 žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenstvím je hrozen, vyskytuje se po 3 - 5ti ks, je řídce 8 - 18tičetný, vřeteno hranaté, dlouhé 3,5 - 8cm, vlastní květy mají 0,6 - 1,1cm stopky, korunu uvnitř ochlupenou, bílou, nazelenalou nebo růžovou či růžově červenou, dlouhou 7 - 9mm a širokou 2,5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. carneolum

- var. nesophilum - listy dlouhé 4 - 6,5cm, široké 1,5 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 5 žilek; koruna je široce baňkovitá, dlouhá 7 - 8mm a široká 3mm

Vaccinium carolinianum

oblasti: Jižní Karolína, Severní Karolína

Roste v USA.

Vaccinium caudatum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře nebo stromu (i epifytického). Listy jsou kopinaté, ocasovité, mírně kožovité, lesklé, žláznatě tečkované, celokrajné, dlouhé 3 - 6cm, široké 1 - 2cm, žilnatinu tvoří 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenstvím je hrozen, objevuje se po 3 - 6ks, je řídce 10 - 20tičetný, vřeteno má délku 3 - 5cm, vlastní květy mají 4 - 6mm stopky, koruna baňkovitá, bílá, holá, dlouhá 5 - 6mm a široká 2,5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium cavendishioides

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře (může být i šplhavý) nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 10m. Listy jsou eliptické, špičaté, prakticky kožovité, celokrajné, na okraji chrupavčité, dlouhé 3 - 7,5cm, široké 1,3 - 3,5cm, báze zúžená a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je hrozen, objevuje se v počtu 4 - 6ti ks, je 12 - 18tičetný, vřeteno má délku 2,5 - 5cm, vlastní květy mají 3 - 6mm stopky, listen délky 3 - 6mm, šířky 2 - 3mm, koruna je baňkovitá, červená až růžová, laloky béžové, dlouhé 4 - 5mm a široké 2mm. Plody jsou kulovité, růžově fialově černé a široké 4mm.

Vaccinium cavinerve

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 2m. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou eliptické, kožovité, celokrajné, tečkované, mírně podvinuté, zaoblené, dlouhé 5 - 6,5cm, široké 3 - 4cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů zapuštěných žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm. Květenství je hroznovité, bohaté, dlouhé 1,5cm, listeny podlouhlé, špičaté, dlouhé 3cm, květy mají 1 - 2mm stopky, kališní laloky jsou vejčité, špičaté, dlouhé 1mm, koruna je růžově fialově zelená, baňkovitá a dlouhá 3,5mm. Plodem je kulovitá bobule.

Vaccinium cebuense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Vaccinium centrocelebicum

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě keře. Listy jsou obvejčité, kožovité, holé, ostře vroubkované, dlouhé 1,4 - 1,9cm, široké 5 - 8mm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů vystouplých žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je 10 - 15tičetný hrozen, vřeteno má dlouhé 3 - 6cm, vlastní květy mají 4 - 7mm stopky, listen délky 7mm, korunu trubkovitou, bílou, dlouhou 5mm, širokou 2,5mm a vnitřní strana je krátce ochlupená. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. centrocelebicum
- var. maius - listy obvejčité až kosočtvercovité, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 1 - 1,3cm; plodem kulovitá bobule průměru 4mm

Vaccinium ceraceum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Vaccinium ceramense
synonyma: V. microphyllum

oblasti: Melanésie

Roste na Molukách v podobě keře. Větve jsou řídce ochlupené. Listy jsou eliptické, zaoblené, bývají mírně vykrojené, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 0,7 - 1cm, široké 4 - 5mm, žilnatinu tvoří 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5mm. Kvete samostatnými květy, trubka je dlouhá do 1mm, koruna baňkovitá, dužnatá, červená, uvnitř řídce ochlupená, dlouhá 5mm a široká 2,5mm.

Vaccinium cercidifolium

oblasti: Borneo

Roste na Borneu. Listy jsou široce eliptické až vejčité, zaoblené, kožovité, mírně ztlustlé, trochu podvinuté, jemně ochlupené, celokrajné, dlouhé 3 - 7cm, široké 2,5 - 5cm, báze mírně srdčitá, prakticky přisedlá, žilnatinu tvoří 7 - 9 žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenstvím je bohatý hrozen, vřeteno dlouhé 4,5 - 9cm, vlastní květy jsou načervenalé, stopky dlouhé 0,5 - 1,5cm, trubka má délku 2mm, koruna baňkovitá, červená až bílá, dlouhá 1 - 1,2cm a široká 3 - 4mm.

Vaccinium cereum
synonyma: Andromeda cerea, Metagonia cerea, V. adenandrum

oblasti: Tichý oceán

Roste na Cookových ostrovech, Markézách a Společenských ostrovech.

Vaccinium chaetothrix

oblasti: Indie, Myanmar (Barma), V Himálaj, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, Indii a Myanmaru v podobě stálezeleného epifytického keře. Větve jsou v mládí žláznatě štětinaté. Listy jsou široce vejčité, kožovité, holé, oblé, na okraji podvinuté a chrupavčité, řídce jemně zubaté, dlouhé 4 - 8mm, široké 3 - 7mm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenství je hroznovité, 6 - 8mičetné, listeny dlouhé 3mm, vlastní květy mají 6 - 8mm stopky, korunu bílou, dlouze baňkovitou a dlouhou 6,5mm. Plodem je tmavě růžovofialová bobule průměru 6 - 8mm.

Vaccinium chamaebuxus

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného hustého keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, mírně vejčité, kožovité, načernale tečkované, holé, špičaté, dlouhé 1,7 - 4 (i 6)cm, široké 1 - 2cm, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 1,5 - 2cm, 8mičetné, listeny dlouhé 3 - 5mm, vlastní květy mají 0,5 - 2mm stopky, listence dlouhé 2,5mm, koruna je bílá nebo růžová, dlouhá 7mm a baňkovitá. Plody jsou růžově fialové průměru 5 - 6mm.

Vaccinium chaozhouense

Vaccinium chengiae

synonyma: V. chengiae var. chengiae

oblasti: Sichuan

Roste v Číně v podobě stálezeleného (i epifytického) keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,5m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou husté, eliptické, kožovité, holé, tmavě zelené, celokrajné, podvinuté, dlouhé 1,7 - 2,2cm, široké 1 - 1,4cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 5mm, 2 - 4četné, listeny dlouhé 1mm, vlastní květy mají 3 - 5mm stopky, koruna je bílá nebo nažloutlá, růžově proužkovaná a dlouhá 5 - 6mm. Plodem je narůžovofialovělá kulovitá bobule průměru 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. chengiae - stopky květů i kalich prakticky holé
- var. pilosum - stopky květů i kalich huňatý

Vaccinium chevalieri

Vaccinium chihuahuense

oblasti: Chihuahua

Roste v Mexiku.

Vaccinium chimantense

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele.

Vaccinium chunii

oblasti: Hainan, Vietnam

Roste ve Vietnamu a Hainanu v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Listy jsou řídké, vejčité, zaoblené, kožovité, mírně povinuté, celokrajné, ocasovité, holé, dlouhé 5 - 7cm, široké 3 - 5cm, báze uťatá až zaoblená, žilnatinu tvoří 1 - 2 žilky a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je 5 - 9tičetný hrozen délky 2,5 - 4cm, listeny jsou dlouhé 9mm, vlastní květy mají 3mm stopky, kališní laloky kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 2 - 2,5mm, koruna zeleně bílá, baňkovitá a dlouhá 3,5 - 6mm. Plodem je tmavě modrá ojíněná bobule průměru 5mm na 4 - 5mm stopce.

Vaccinium ciliatum
synonyma: V. santanense

Vaccinium claoxylon

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře (i jako epifyt) nebo stromu. Dorůstá výšky do 10m. Listy jsou řídké, mírně vejčité či obvejčité, tuhé, kožovité, celokrajné, dlouhé 6 - 14cm, široké 3 - 8,5cm, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a spodní strana je žláznatě tečkovaná. Květenstvím je bohatý jednostranný hustý hrozen, vřeteno je dlouhé 6 - 13cm, vlastní květy mají 1 - 2,5mm stopky, trubka pohárkovitá, koruna baňkovitá, bílá až růžová, dlouhá 6 - 8mm, široké 2,5mm a má 10 tyčinek. Plodem je kulovitá bobule průměru 4mm.

Vaccinium clementis

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře (i epifytického) nebo stromu. Dorůstá výšky do 12m. Větve jsou v mládí červené a hranaté. Listy jsou obvejčité, kožovité, tuhé, holé, celokrajné, občas mírně podvinuté, dlouhé 2 - 4cm, široké 0,8 - 1,2cm, spodní strana řídce jemně žláznatě hrbolkatá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je 3 - 15tičetný hrozen, vřeteno je hranaté, vlastní květy mají stopky délky 1,5 - 4cm, koruna je baňkovitá, bílá až béžová, narůžovělá, dlouhé 6 - 8mm a široké 3 - 4mm. Plodem je kulovitá temná bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium coarctatum

Vaccinium coccinium

Vaccinium coelorum

synonyma: V. arenarium

oblasti: Nová Guinea

Roste v Nové Guineji v podobě keře. Větve jsou na konci hranaté, ochlupené a hustě olistěné. Listy jsou eliptické, kožovité, tuhé, holé, jemně vroubkované, na konci ztlustlé, dlouhé 4 - 7mm, široké 2 - 4mm a řapíky jsou dlouhé do 1mm. Kvete v paždí listů samostatnými převislými květy, stopky jsou dlouhé 3 - 6mm, trubka je dlouhá 1,5mm, koruna je široce baňkovitá, uvnitř ochlupená, červená, dlouhá 5 - 7mm a široká 5mm.

Vaccinium commutatum
synonyma: V. angulatum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium conchophyllum

oblasti: Sichuan

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře (i epifytního). Dorůstá výšky 20 - 30cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, kožovité, hladké, podvinuté, celokrajné, zaoblené, dlouhé 0,8 - 1,4, široké 6 - 9mm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a báze je klínovitá. Květenství je hroznovité, 4 - 6tičetné, dlouhé 1cm, listeny jsou opadavé, dlouhé 5mm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopky, koruna je červená, baňkovitá, dlouhá 5mm a plody jsou zelenavé a mírně ojíněné.

Vaccinium concoloratum
synonyma: Polycodium concoloratum

Vaccinium confertum
synonyma: Pernettya ovata, V. brachystachyum, V. confertum var. eriocladum, V. discolor, V. eriocladum

oblasti: Guatemala, Honduras, Mexiko

Roste v Guatemale, Hondurasu a Mexiku v podobě hustého keře. Dorůstá výšky 0,2 - 0,6 (i 1)m. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou seskupené na koncích větví, jsou kožovité, tlusté, vejčité, tupé až špičaté, tmavě zelené, lesklé, drobně vroubkované, dlouhé 0,6 - 1,5cm a řapíky jsou krátké a tlusté. Kvete v 4 - 7mikvětých hroznech, listeny jsou 2, podlouhlé, dlouhé 1,2 - 2,5mm, vlastní květy mají (1 -) 2 - 3 (i 4)mm stopku, kalich délky 3 - 3,3mm, trubku délky 1 - 2mm a tmavě růžovou korunu délky 4 - 5mm. Plodem je modře černá ojíněná bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium consanguineum
synonyma: V. consanguineum var. irazuense, V. irazuense

oblasti: Honduras, J Mexiko, JV Mexiko, JZ Mexiko, Kostarika, Panama

Roste v Mexiku, Hondurasu, Kostarice a Panamě v podobě stálezeleného keře nebo malého stromu. Dorůstá výšky (0,5 -) 1 - 3 (i 4)m. Listy jsou eliptické, oboustranně špičaté, jemně pilovitá, holé, mohou být řídce žláznatě ochlupené, dlouhé (1 -) 1,5 - 3 (i 4,6)cm, široké 0,5 - 1,2 (i 1,8)cm a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3mm. Květenstvím je úžlabní 1 - 4četný hrozen, vřeteno má délku 2 - 3mm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopky, listence délky 1,5 - 3mm, koruna válcovitá, 4laločná, dlouhá 5 - 7,5mm, široká 3- 4mm, béžovobílá a načervenalá. Plody jsou červené až červeně růžově fialové kulaté bobule o průměru 5 - 6mm.

Vaccinium constablaei

Vaccinium continuum

oblasti: Peru

Roste v Peru.

Vaccinium contractum

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě keře. Listy jsou řídké, kopinaté, ocasovité, kožovité, lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 8 - 11cm, široké 2,5 - 3,5cm, spodní strana řídce žláznatě hrbolatá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 7 - 8mm. Květenstvím je hustý hrozen délky do 5mm, vlastní květy mají mírně křídlaté stopky délky 0,6 - 1cm, korunu trubkovitou, bílou a dlouhou 5mm.

Vaccinium convallariiflorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě šplhavého epifytického keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, celokrajné, dlouhé 5 - 8cm, široké 1,5 - 3cm, na spodní straně přitiskle žláznatě ochlupené a řapíky jsou dlouhé 4 - 7mm. Květenstvím je jednostranný 8 - 15tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé 1 - 3,5cm, listen je dlouhý 3 - 4mm, vlastní květy mají stopky délky 1 - 1,5cm, koruna baňkovitá, dlouhá 7 - 8mm a široká 6 - 8mm.

Vaccinium convexifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste v Nové Guineji v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 2 - 5m. Větve jsou ochlupené. Borka je šedá. Listy jsou obvejčité, zaoblené (i vykrojené), kožovité, holé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 0,7 - 1cm, široké 5 - 7mm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Květe samostatnými květy na max. 1,5mm stopce, listeny jsou dlouhé 1,5mm, kalich je obkuželovitý, koruna je vejčitě kuželovitá, červená, řídce žláznatě hrbolatá, dlouhá 7 - 9mm a široká 2,5 - 3,5mm.

Vaccinium cordifolium

synonyma: V. cordatum, V. cordifolium, V. matudae

oblasti: Guatemala, J Mexiko, JV Mexiko, JZ Mexiko

Roste v Mexiku a Guatemale v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve jsou hustě žlutě hnědě plstnaté, v mládí načervenalé. Listy jsou seskupené na koncích větví, téměř střechovitě, jsou kožovité, tmavě zelené, mírně lesklé, načervenalé, celokrajné, dlouhé 2,5 - 5 (i 8)cm, široké (1,3 -) 2 - 3,5 (i 5)cm, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý hrozen z 5 - 12ti květů, vřeteno je dlouhé 2 - 6cm, vlastní květy mají stopky délky 0,8 - 1,3cm, listeny jsou dlouhé do 8mm, kalich je červený, koruna je baňkovitá, růžová až bílá, špičky jsou béžové, dlouhé 1 - 1,5cm a široké 5 - 6mm. Plodem je kulovitá bílá nebo zeleně červená bobule průměru 6 - 8mm.

Vaccinium coriaceum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře nebo stromu. Listy jsou eliptické až čárkovité, jemně vroubkované, kožovité, holé, dlouhé 0,6 - 1,3cm, široké 3 - 5mm, na spodní straně žláznatě tečkované a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenstvím je terminální vzpřímený hustý hrozen, vřeteno je dlouhé 2 - 5cm, vlastní květy jsou převislé, mají 2 - 4mm stopky, kalich holý, koruna úzce baňkovitá, růžová nebo bílá, dlouhá 4 - 5mm a široká 3mm. Plody jsou kulovité s průměrem 4mm.

Vaccinium cornigerum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře (i epifytického) nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, tupě špičaté, kožovité, lesklé, celokrajné, v mládí ochlupené, dlouhé 2,5 - 6,5cm, široké 1,5 - 4cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek, spodní strana žláznatě tečkovaná a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenstvím je 5 - 10tičetný hrozen, vřeteno má délku 1,5 - 4cm, vlastní květy mají 0,4 - 1,1cm stopky, koruna je baňkovitá, růžová a na vrcholu bílá.

Vaccinium corymbodendron

synonyma: Metagonia corymbodendron, Thibaudia corymbodendron, V. densiflorum

oblasti: Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste v Peru, Venezuele a Kolumbii v podobě vzpřímeného keře. Listy jsou vejčité, řídce zoubkované, zelené, holé, dlouhé 1,5 - 2,5cm, široké 0,8 - 1,2cm a spodní strana je nahnědlá. Květenstvím je chudý úžlabní nebo terminální hrozen, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich má 2 listence a koruna je 2x delší než široká.

Vaccinium corymbosum (Borůvka chocholičnatá)

synonyma: Cyanococcus amoenus, Cyanococcus atrococcus, Cyanococcus corymbosus, Cyanococcus cuthbertii, Cyanococcus elliottii, Cyanococcus fuscatus, Cyanococcus holophyllus, Cyanococcus margarettae, Cyanococcus simulatus, Polycodium sericeum, Polycodium sericeum f. chrysocarpon, Polycodium sericeum var. eburneum, Polycodium sericeum var. elongatum, V. albiflorum, V. amoenum, V. arcuatum, V. ashei, V. constablaei, V. corymbosum f. corymbosum, V.

corymbosum var. albiflorum, V. corymbosum var. atrococcum, V. corymbosum var. corymbosum, V. corymbosum var. fuscatum, V. cuthbertii, V. disocarpum, V. disomorphum, V. elliottii, V. elongatum, V. fuscatum, V. galezans, V. galiformis, V. grandiflorum, V. holophyllum, V. margarettae, V. marylandicum, V. melanocarpum var. sericeum, V. sericeum, V. sericeum f. chrysocarpon, V. sericeum var. eburneum, V. sericeum var. elongatum, V. simulatum, V. vicinum, V. virgatum

oblasti: Alabama, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1,5 (i 2,5)m. Větve jsou v mládí mírně ochlupené, bradavičnaté a žlutě zelené. Listy jsou střídavé, mírně vejčité až podlouhlé, drobně pilovité až celokrajné, holé, jasně zelené, dlouhé 3 - 8cm, na spodní straně na žilkách mírně ochlupené a řapíky jsou krátké. Květy jsou bílé (i načervenalé), seskupené do svazečků, dlouze baňkovité, dlouhé 1cm a kalich je namodralý. Plody dozrávají postupně, jsou modročerné, ojíněné, sladké nebo nakyslé, dlouhé 0,7 - 1,2 (i 2)cm a dužina je bezbarvá. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. albiflorum - listy drobně až brvitě pilovité; květy bílé
- 'Atlantic' - bohatý vzpřímený habitus; výška 1,5 - 2m
- 'Aurora' - velký vzpřímený habitus; plody pozdní, modré, chutné, střední velikosti
- 'Berkele' - snáší horší podmínky
- 'Berkley' - výška do 2m; plodenství bohaté, plody světlemodré; do -28°C; pozdní
- 'Blauweiße Zuckertraube' - kompaktní habitus; výška do 80cm; listy šedozelené, na spodní straně šedé; květenstvím je bohatý hrozen; plody tmavě modré, velké 1 - 1,5cm
- 'Blue Crop'/'Bluecrop' - výška 1,6 - 2m; plody rané až středně časné, kvalitní, odolné; nenáročná; do -34°C; střední
- 'Blue Ray' - plody bledě modré, středně časné
- 'Bluegold' - středně ranná
- 'Blueray' - výška 1,2 - 1,8m; střední
- 'Bluetta' - výška 0,9 - 1,5m; do -23 až -28°C
- 'Bonifacy' - výška do 2m; plody modré, středně časné
- 'Brigitta' - vzpřímený a mírně rozkladitý habitus; květy volné; plody středně velké až velké, modré, nakyslé, vhodné na skladování po 3 - 4 týdny; vyžaduje teplé klima, rychlý růst, pozdní
- 'Burlington' - středně velký rozložitý habitus; plody drobné, průměru 8mm; pomalý růst
- 'Collins' - vzpřímený habitus; plody bledě modré, chutné, středně velké a pevné; rychlý růst
- 'Coville' - výška do 2m; plodenství bohaté, pozdní
- 'Darrow' - výška 1,5 - 2,1m; pozdní; do -23 až -28°C
- 'Duke' - vzpřímený habitus; výška 1,8m; plody bleděmodré, pevné, velmi rané; do -24 až -28°C
- 'Earliblus' - rané
- 'Elizabeth' - kulovitý habitus; výška 1,5 - 1,8m, šířka 1,2 - 1,5m; plody tmavě modré až černé, střední
- 'Elliot' - vzpřímený habitus; plody středně velké, modré; pozdní
- 'Friendship' - kompaktní habitus; plody středně velké
- var. glabrum - listy drobně brvitě pilovité, namodralé, na spodní straně holé
- 'Goldtraube' - plody rané, bohaté, pevné, sladké, stejně dozrávající; středně rychlý růst
- 'Goldtraube 23' - rané
- 'Grower' - velký keř
- 'Herbert' - výška do 1,4 (i 1,5)m; plody pozdní, velmi velké, nakyslé, aromatické; do -28 až -30°C; pozdní
- 'Herma' - vyžaduje oporu
- 'Hortblue Poppins' - balkónová

- 'Chandler' - vzpřímený habitus; výška do 1,6m; plody rané až středně časné, velké až 2cm; rychlý růst; pozdní
- 'Chanticleer' - velmi ranná
- 'Chippewa' - kompaktní; výška i šířka 0,9 - 1,2m; plody bleděmodré, chutné
- 'Jersey' - plody středně velké a sladké
- 'Late Blue' - vzpřímený habitus; plody bohaté, pevné, bleděmodré, jemná chuť
- 'Liberty' - pozdní
- 'Nelson' - výška 1,3 - 1,8m; plody bohaté, velké, aromatické a výrazné chuti, konec léta; do -28 až -34°C
- 'North Blue' - výška 0,6 - 1m; velké tmavě modré sladké plody, léto
- 'Northland' - kompaktní habitus; výška 1,2m; květy voskovité, zvonkovité, rané; plody drobné, tmavě modré; do -34 až -40°C
- 'Patriot' - výška 1,2 - 1,8m; plody rané, velké, bohaté a pravidelné; snáší horší podmínky; do -34 až -40°C; rané
- 'Pemberton' - bohatý vzpřímený růst; výška do 2m; bohaté plodenství
- 'Pink Lemonade' - výška 1,5m; růžové středně pozdní až pozdní plody
- 'Pioneer' - samosprašný, plody menší
- 'Polaris' - výška 0,9 - 1,2m; plody sladké, aromatické
- 'Reka' - střední
- 'Rubel' - vzpřímený habitus; výška i šířka do 2m; plody bohaté, malé a pevné; odolný
- 'Sierra' - vysoký vzpřímený habitus; plody bohaté, středně velké
- 'Spartan' - vysoký vzpřímený otevřený habitus; plody velmi rané, velké, bleděmodré, chutné; pro nižší nadmořské výšky, rané
- 'Stanley' - vzpřímený habitus; výška do 2m; velké listy
- 'Sunrise' - výška 1,3 - 1,6m; do -24 až -28°C
- 'Sunshine Blue' - výška i šířka 1,2m; květy růžové; plody sladké, tmavě modré
- 'Tomahawk' - listy na podzim oranžové
- 'Toro' - kompaktní křovinatý habitus; výška 1,2 - 1,5m, šířka 1,5 - 1,8m; listy na jaře bronzové, později tmavězelené a na podzim červené; květy růžové až bílé; plody velké, bohaté
- 'Walcott' - velmi rané plody
- 'Weymouth' - středně velký rozložitý habitus; listy velké
- 'Yelloberry Blue' - listy v mládí oranžově bronzové, později žluté; plody modré

Vyžaduje vlhkou kyselou (pH 4,5) a dobře propustnou půdu bohatou na živiny.

Vaccinium costaricense (Brusnice kostarická)

synonyma: Symphysia costaricensis

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Kostarice a Panamě v podobě keře (obvykle epifytického). Dorůstá výšky (0,8 -) 1 - 2 (i 3)m. Borka je šedá až červeně hnědá. Listy jsou vejčité až eliptické, kožovité, oboustranně špičaté, celokrajné, mírně podvinuté, mohou být jemně přitiskle žláznatě hřebílkaté, dlouhé 2,5 - 11cm, široké 1,5 - 6,2cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, vřeteno je dlouhé 1 - 2,5cm, listeny vytrvávající, šupinovité, dlouhé 1 - 3mm, vlastní květy mají 1 - 3mm stopky, listence vytrvávající, dlouhé do 2mm, koruna široce válcovitá, světle žlutozelená, dlouhá 6 - 8mm a široká 4 - 7mm.

Vaccinium costerifolium

synonyma: V. varingiaefolium

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě plazivého a mírně šplhavého keře. Listy jsou řídké, eliptické, tupě špičaté, mírně kožovité, holé, prakticky celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 5 - 8cm, široké 2 - 3,5cm, spodní strana řídce žláznatě hrbolatá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je úžlabní bohatý řídký hrozen, vřeteno je dlouhé 5 - 10cm, vlastní květy mají 3 - 6mm stopky, listen délky 3 - 8mm, kalich ochlupený, koruna dlouze baňkovitá, růžová až tmavě růžově fialová, dlouhá 0,8 - 1cm a široká 4mm. Plody jsou kulovité, ochlupené, červené až černé, ochlupené a v průměru mají 6mm.

Vaccinium craspedotum

synonyma: V. craspedotum var. brevipes, V. craspedotum var. craspedotum

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného epifytického keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1,2m. Povrch je v mládí ochlupený. Listy jsou husté, vejčité, kožovité, celokrajné, oboustranně tupé, konec až vykrojený, dlouhý 1,3 - 2,4cm, široké 0,8 - 1,4cm, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenství je 1 - 3četné, úžlabní, dlouhé 1cm, listeny dlouhé 3mm, stopky dlouhé 5 - 6mm, vlastní květy prakticky přisedlé, listence dlouhé 2mm, koruna bílá, zvonkovitá, dlouhá 4mm a je řídce ochlupená. Plodem je ochlupená bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium crassiflorum

synonyma: V. ciliatipetalum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě nízkého rozkladitého až plazivého keře. Větve jsou vzpřímené, obvykle načervenalé a v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, tlusté, kožovité, řídce červeně žláznatě tečkované, mírně podvinuté, dlouhé 7 - 8mm, široké 3 - 5mm, žilnatinu tvoří 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,5mm. Kvete samostatnými převislými květy v paždí listů, stopky jsou dlouhé 5 - 9mm, kalich pohárkovitý, koruna je široce baňkovitá, červená nebo růžová, uvnitř dlouze ochlupená, dlouhá 6 - 8mm a široká 4 - 5mm.

Vaccinium crassifolium

synonyma: Herpothamnus crassifolius, Metagonia myrtifolia, V. carnosum, V. myrtifolium, V. sempervirens

oblasti: Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Virginie

Roste v USA v podobě stálezeleného poléhavého keře. Větve jsou drátovité a dlouhé do 60cm. Listy jsou vejčité až okrouhlé, tupé, drobně pilovité, tmavě zelené, na podzim barví do bronzova, kožovité, dlouhé (0,8 -) 1,2 - 1,5 (i 3,9)cm a široké (0,4 -) 0,5 - 0,7 (i 2,7)cm. Využívají se v medicíně. Květenstvím je polopřevislý úžlabní hrozen, vlastní květy mají široce baňkovitou korunu délky 4mm v barvě růžové nebo bílé s růžovými proužky a kališní laloky chybí. Plody jsou kulovité, černé a široké 6 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bloodstone' - půdokryvné
- 'Well's Delight' - výška do 20cm, šířka až 1m; listy lesklé, tmavězelené, při rašení bronzové, na podzim načervenalé; květy svazčité, růžovočervené; plody černé až tmavě růžovofialové

Vaccinium crassistylum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě nízkého šplhavého keře nebo stromu. Větve jsou převislé a holé. Listy jsou vejčité, ocasovité, na okraji žláznaté a chrupavčité, kožovité, lesklé, dlouhé 3 - 8cm, široké 1,5 - 3cm, žilnatinu tvoří 1 - 2 párů zapuštěných žilek, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 3 - 4mm. Květenstvím je úžlabní hrozen v počtu 2 - 5ti ks, je 3 - 7mičetný, vřeteno má délku 1 - 2cm, vlastní květy mají stopky dlouhé 1,5 - 1,8cm, kalich široce pohárkovitý, koruna je kulovitá, bílá nebo nazelenalá, dlouhá 4mm a široká 4 - 5mm. Plody jsou zploštěle kulovité a v průměru mají 4mm.

Vaccinium crassivenium

oblasti: Guangxi

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou v mládí hranaté a holé. Listy jsou řídké, úzce kopinaté, špičaté, mírně podvinuté, kožovité, dlouhé 6 - 12cm, široké 2 - 3,2cm, žilnatinu tvoří 1 - 2 párů žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2cm. Květenství může být úžlabní i terminální, hroznovité, bohaté, dlouhé 6,5 - 12cm, listeny jsou opadavé, dlouhé 3 - 5mm, vlastní květy mají stopky délky 4 - 6mm, korunu bílou, baňkovitou dlouhou 4 - 6mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium crenatifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5 - 4m. Větve jsou v mládí načervenalé a hranaté. Listy jsou řídké, eliptické, oboustranně tupě špičaté, řídce vroubkované, dlouhé 3 - 5,5cm, široké 1,5 - 2,7cm, na spodní straně žláznatě hrbolaté, žilnatinu tvoří 1 - 3 páry vystouplých žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní prakticky jednostranné hrozny, vřeteno je dlouhé 1,5 - 3cm, vlastní květy jsou převislé, stopky dlouhé 3 - 5mm, koruna je úzce baňkovitá, špinavě červená, nazelenalá až zeleně béžová, dlouhá 5mm a široká 2mm. Plodem je kulovitá tmavě modře růžově fialová bobule o průměru 4mm.

Vaccinium crenatum

synonyma: Adnaria crenata, Gaylussacia crenata, Metagonia prostrata, V. affine, V. attenuatum, V. escallonioides, V. ottonis, V. reclinatum, V. reflexum, V. retifolium, V. secundum

oblasti: Ekvádor, Peru, Venezuela

Roste ve Venezuele, Ekvádoru a Peru v podobě rozložitého až plazivého (i vzpřímeného) keře a kmínky dokáží znovu zakořenit. Dorůstá výšky do 1m. Větve jsou krátce ochlupené. Listy jsou mírně kopinaté, kožovité, oboustranně špičaté, asymetricky vroubkované, v mládí načervenalé, dlouhé 0,6 - 1,9cm, široké 0,2 - 1cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, načervenalé, 1 - 3četné, vřeteno má délku 0,2 - 1,1cm, listeny vytrvávající, dlouhé 1 - 1,5mm, květy mají stopky délky 4mm, listence jsou dlouhé do 1,5mm, kalich je holý, dlouhý 3 - 4mm, koruna je úzce baňkovitá, červená, holá a dlouhá 5 - 8mm. Plodem je kulovitá modře černá lesklá a holá bobule průměru 9mm.

Vaccinium cruentum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného keře až stromu. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí na vrcholu ochlupené. Listy jsou eliptické, tupě špičaté, na okraji žláznaté, kožovité, v mládí červené, řídce ochlupené, celokrajné, občas mírně podvinuté, dlouhé 1,8 - 3cm, široké 0,8 - 1,8cm, žilnatinu tvoří 1 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je úžlabný 6 - 15tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé 1 - 3cm, vlastní květy mají stopky délky 4 - 8mm, listen je dlouhý do 8mm, široký 4mm, koruna je úzce baňkovitá, červená, holá, dlouhá 7 - 9mm a široká 3 - 4mm. Plody jsou kulovité, červené, ochlupené a v průměru mají 5 - 8mm.

Vaccinium cubense

synonyma: V. cubense subsp. ramonii

oblasti: Dominikánská Republika, Kuba

Roste na Kubě a v Dominikánské Republice. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. giganteum

Vaccinium culminicola

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium culminicolum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě nízkého epifytického keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, na okraji žláznaté, kožovité, tuhé, ochlupené, celokrajné, dlouhé 0,8 - 1,3cm, široké 5 - 8mm, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 1mm. Kvete samostatnými květy se stopkou délky 2 - 3mm, koruna je široce baňkovitá, uvnitř chlupatá, dlouhá 8mm a široká 6mm.

Vaccinium cumingianum

synonyma: V. cumingianum var. tayabasense, V. microphyllum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 10 (i 15)m. Větve jsou na konci jemně ochlupené. Listy jsou dlouze kopinaté, špičaté, žláznaté, kožovité, matné, dlouhé 1,5 - 4cm, široké 0,5 - 1,5cm, žilnatina na spodní straně vyniklá, báze klínovitá a řapíky jsou načervenalé, dlouhé 2mm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý hrozen, je 3 - 5tičetný, vřeteno dlouhé 0,5 - 4cm, vlastní květy mají stopky délky 0,2 - 1,2cm, koruna je baňkovitá, bílá, růžová nebo červená,

dlouhá 5 - 6mm a široká 2,5mm. Plody jsou zploštělé, prakticky černé a v průměru mají 5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. cumingianum
- var. igorotorum/V. igorotorum - listy dlouhé 2,5 - 3,5cm
- var. marivelesense - listy dlouhé 2,5 - 4cm, žláznaté v první 1/2; květy mají laločnatý kalich s brvitými laloky
- var. pyriforme/V. pyriforme - listy eliptické, dlouhé 1,5 - 2cm

Vaccinium cuneifolium

synonyma: Agapetes cuneifolia, Epigynium cuneifolium, Thibaudia cuneifolia, V. cuneifolium var. acutum

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 7m. Větve jsou hranaté. Listy jsou husté, mírně obvejčité, zašpičatělé, kožovité, dlouhé 3 - 6cm, široké 2 - 3,5cm, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů vyniklých žilek, spodní strana je načernale žláznatě hrbolatá, tečkovaná, celokrajná a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenstvím je úžlabní hrozen v hranatým vřetenem délky 4 - 7cm, vlastní květy mají stopky délky 1 - 3mm, koruna je dlouze válcovitá, světlezelená, dlouhá 5mm a široká 2,5mm. Plody jsou kulovité s průměrem 2 - 2,5mm.

Vaccinium cuspidifolium

oblasti: Guangxi

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Větve jsou hranaté, hustě ochlupené. Listy mohou být ochlupené, eliptické, celokrajné, kožovité, podvinuté, dlouhé 2,5 - 3,8cm, široké 1,2 - 1,8cm, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství je krátce hroznovité, úžlabní, 2 - 3květé, vřeteno dlouhé 2 - 3mm, žláznatě ochlupené, koruna je opadavá a má stopku délky 3 - 4mm.

Vaccinium cyclopense

synonyma: V. cyclopense var. arfakense, V. ledermannii, V. rariflorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě plazivého až převislého (i epifytického) keře. Dorůstá výšky do 60cm. Větve jsou dlouhé do 1m, jsou převislé, v mládí hranaté a krátce ochlupené. Listy jsou tmavězelené, vejčité, kožovité, tuhé, v mládí ochlupené, celokrajné, dlouhé 0,7 - 2cm, široké 0,4 - 1,4cm, báze zaoblená až mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květy jsou samostatné nebo párovité, úžlabní, stopky jsou dlouhé 4 - 8mm, kalich může být narůžovělý, koruna široce baňkovitá, růžová až červená, laloky dlouhé 6 - 9mm, široké 5 - 7mm. Plody jsou růžovofialové až světlefialové, kulovité s průměrem 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. cyclopense
- f. glabrum - kalich v dospělosti holý, laloky dlouze třásnité, květy mají 4 - 6mm stopky, koruna růžová, laloky béžové až zelené

Vaccinium cylindraceum
synonyma: V. longiflorum, V. padifolium

oblasti: Makaronésie

Roste na Azorských ostrovech v podobě opadavého nebo stálezeleného keře. Listy jsou eliptické, zelené, jemně zubaté, dlouhé 2 - 5cm a žilnatina je síťovitá. Kvete v hustých krátkých 10 - 20tičetných hroznech, vlastní květy mají válcovitou korunu délky 1,2cm v barvě žlutozelené až načervenalé. Plodem je podlouhlá tmavěmodrá ojíněná bobule velikosti 0,8 - 1cm.

Vaccinium cyrtodon

Vaccinium damingshanense

oblasti: JV Čína

Roste v Číně.

Vaccinium daphniphyllum
synonyma: V. piroliflorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře, který může být i epifytický nebo šplhavý. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, žláznatě tečkované, holé, celokrajné, dlouhé 7 - 15,5cm, široké 2,6 - 6cm, žilnatina je 5 - 7mižilná, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenstvím je 15 - 25tičetný hrozen, vřeteno má hranaté, dlouhé 4 - 11cm, vlastní květy mají stopky délky 0,7 - 1,4cm, koruna je široce baňkovitá, holá, bledě zelená až bílá, dlouhá 5 - 7mm a široká 3 - 8mm. Plody jsou kulovité bobule s průměrem 5mm.

Vaccinium darrowii

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi

Roste v USA v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,3 - 1,2 (i 1,5)m. Listy jsou eliptické, zelené (existují ale i hybridy z modře zelené nebo s růžovým tečkováním na větvích), dlouhé 0,7 - 1 (i 1,5)cm a široké 3 - 5mm. Kvete bílými růžově nebo červeně tečkovanými zvonkovitými květy délky 4 - 6 (i 8)mm. Plodem je jedlá modrá až černá bobule průměru (0,4 -) 0,8 - 1cm a obsahuje 10 - 20 semen.

Vaccinium debilescens

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře (obvykle epifytického) nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 3m. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 0,7 - 1,2cm, spodní strana řídce žláznatě tečkovaná, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý úžlabní řídký 3 - 6tičetný převislý hrozen, vřeteno má

délku 0,5 - 2cm, vlastní květy mají stopky délky 1 - 1,6cm, koruna je zelená, růžová nebo červená, dlouhá 7mm a široká 3mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium decumbens
synonyma: V. chionostomum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 90cm. Kmínek může být poléhavý. Listy jsou mírně vejčité, tuhé, kožovité, holé, celokrajné, max. s 1 - 2mi mělkými zuby, mírně podvinuté, dlouhé 4 - 7mm, široké 3 - 4mm, báze zakulacená, žilnatina zapuštěná a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Kvete samostatnými úžlabními květy na 6 - 9mm stopce se 2mi listenci délky 2mm, koruna je široce baňkovitá, dužnatá, červená, dlouhá 0,6 - 1cm a široká 4 - 8mm.

Vaccinium decumbiens
synonyma: V. chionostomum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium dehongense

Vaccinium delavayi

oblasti: JV Čína, Myanmar (Barma), Sichuan, Tchaj-wan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě stálezeleného hustého keře. Dorůstá výšky 0,3 - 0,5 (i 1)m. Větve jsou žláznatě ochlupené. Listy jsou husté, obvejčité, bývají vykrojené, celokrajné, dlouhé 0,6 - 1,5cm, široké 4 - 9mm, báze klínovitá a žilnatinu tvoří 3 páry žilek. Květenstvím je terminální 4 - 8mičetný hrozen délky 1 - 3cm, listeny jsou dlouhé 5 - 6mm, vlastní květy mají 2 - 3mm stopky, listence dlouhé 3mm, koruna je bílá až narůžovělá, baňkovitá a dlouhá 3 - 5mm. Plody jsou kulovité, červené až tmavě růžově fialové a široké 4 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. delavayi - Čína, Myanmar; nitky tyčinek prakticky holé
- subsp. merrillianum/V. merrillianum/V. vitis-idaea var. merrillianum/Agapetes merrilliana - Tchaj-wan, nitky tyčinek jsou ochlupené

Vaccinium deliciosum (Brusnice lahodná)

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste ve vyšších nadmořských výškách v alpinském pásmu v Kanadě a USA v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 0,05 - 1,5m. Listy jsou střídavé, obvejčité, obkopinaté (i eliptické), zpravidla pilovité, dlouhé 1,7 - 3,5cm a široké 0,9 - 1,7cm. Kvete světle růžovými nebo červenými kulatými až mírně urnovitými květy délky 4 - 6mm a šířky 5 - 7mm. Plodem je modrá nebo načervenalá bobule průměru 0,9 - 1,3cm.

Vaccinium dendrocharis

oblasti: Myanmar (Barma), V Himálaj, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě stálezeleného obvykle epifytického bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1 (i 2,6)m. Větve jsou v mládí šedě ochlupené. Listy jsou podlouhlé až mírně lopatkovité, kožovité, mírně podvinuté, celokrajné, tupé, mohou být ochlupené, dlouhé 1 - 2,2cm, široké 4 - 9mm, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je hroznovité, terminální, dlouhé 1 - 3cm, listeny kopinaté, dlouhé 6 - 9mm, vlastní květy mají 3mm stopky, listence dlouhé 4 - 5mm, kališní laloky široce 3úhlé, dlouhé 0,5 - 1mm, koruna je bílá nebo narůžovělá, baňkovitá a dlouhá 4 - 5mm. Plodem je tmavě růžově fialová kulovitá bobule průměru 5 - 8mm.

Vaccinium densifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě nízkého bohatě větveného keře. Dorůstá výšky do 1,2m. Větve jsou v mládí hustě krátce ochlupené. Listy jsou vejčité, tupě špičaté, kožovité, pevné, celokrajné, přitiskle žláznatě ochlupené, řídce tečkované, dlouhé 4 - 9mm, široké 3 - 7mm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete v paždí listů samostatnými převislými květy, stopky jsou dlouhé 3 - 4mm, listeny jsou dlouhé 1 - 2mm, koruna je baňkovitá, červená, dlouhá 6 - 7mm, široká 2,5 - 3mm a laloky jsou bíle nebo nažloutlé.

Vaccinium dentatum

synonyma: Metagonia penduliflora, V. penduliflorum

oblasti: Havajské ostrovy

Roste na Havajských ostrovech.

Vaccinium dependens

synonyma: Adnaria dependens, Disterigma terniflorum, Gaylussacia dependens, Metagonia terniflora, V. terniflorum

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře. Větve jsou v mládí nahnědlé a ochlupené. Listy jsou vejčité, tupé až špičaté, zelené, holé, dlouhé 1,2 - 1,4cm, široké 8mm, spodní strana je nahnědlá a řapíky jsou krátké. Kvete v paždí listů po 2 - 3ks, listeny jsou široké a holé a kalich má 4 vejčité špičaté laloky.

Vaccinium depressum

synonyma: Polycodium depressum

Vaccinium dialypetalum

synonyma: Agapetes griffithii, Agapetes micrantha, Agapetes parviflora, Agapetes pauciflorum, Agapetes perakensis, Agapetes pubescens, Agapetes wrayi, V. longilingua, V. longipes, V.

pauciflorum, V. perakense, V. ridleyi, V. urophyllum

oblasti: Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov, Sumatra, Thajsko

Roste od Malajského poloostrova po Sumatru a Jávu v podobě popínavé dřevnaté rostliny. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí krátce ochlupené. Listy jsou úzce vejčité, špičaté (i ocasovité), zpravidla kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 5 - 17cm, široké 1,5 - 7cm, spodní strana může být ochlupená, žilnatinu tvoří 5 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je řídký 3 - 10tičetný hrozen délky 1 - 10cm, vlastní květy jsou ještě seskupené po 2 - 3ks, mají 1 - 3cm stopky s 2mi listenci, laloky dlouhé 2 - 3mmm, koruna zvonkovitá, voskovitá, nazelenalá až béžová (i načervenalá), dlouhá 5mm. Plodem je kulovitá zelená a načervenalá bobule průměru 1cm.

Vaccinium dictyoneuron

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 2 - 4m. Povrch je holý. Větve jsou v mládí načervenalé a lesklé. Listy jsou husté, eliptické, tupě špičaté, kožovité, tuhé, celokrajné, dlouhé 4 - 7,5cm, široké 2,5 - 5cm, žilnatinu tvoří 1 - 2páry žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenství tvoří několik hroznů s vřetenem délky 3 - 4,5cm, vlastní květy mají 0,8 - 1cm stopky, korunu dlouze baňkovitou, dužnatou, růžovou až načervenalou, holou, dlouhou 8 - 9mm a širokou 3mm. Plody jsou kulovité, růžově fialové a v průměru mají 6 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. dictyoneuron
- var. koëbrense - výška 0,4 - 3m; kališní trubka hustě žláznatě hrbolatá
- var. oreophilum - kompaktní bohatě větvený habitus; výška 1 - 3m; listy dlouhé 2,5 - 4cm, široké 1 - 3cm, řapíky délky 5mm; hrozny kratší a řidší

Vaccinium didymanthum

synonyma: Metagonia didymantha

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře. Listy jsou jemně ochlupené. Listy jsou bohaté, eliptické, kožovité, holé, řídce vroubkované, lesklé, špičaté a na spodní straně světlé. Květy jsou párovité, úžlabní, má 5 kališních lístků, koruna je soudečkovitá a dlouhá 4mm.

Vaccinium dipladenium

synonyma: Rigiolepis korthalsii, V. acuminatissimum f. borneense, V. korthalsii

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře. Větve jsou v mládí řídce ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, celokrajné, okraj může být mírně podvinutý, dlouhé 4 - 11cm, široké 1,7 - 6cm, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek, báze zakulacená, spodní strana žláznatě přitiskle ochlupená a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenstvím je úžlabní řídký hrozen, vřeteno je hranaté, dlouhé 1 - 6cm, vlastní květy mají stopky délky 4 - 7mm, 2 - 3 listeny délky 2,5mm, koruna baňkovitá, holá, dlouhá 3mm a široká 2,7mm. Plodem je kulovitá mírně ochlupená bobule průměru 5mm.

Vaccinium distichum

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru v podobě převislého keře. Listy jsou 2řadé, kožovité, mírně asymetrické, dlouze kopinaté, oboustranně špičaté, mírně podvinuté, holé, dlouhé 1,5 - 3cm, široké 1 - 1,6cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete v paždí listů samostatnými květy na 8mm převislé stopce, kalich je dlouhý 6mm, holý, koruna baňkovitá, holá dlouhá 9mm a široká 8mm.

Vaccinium dobbinii

oblasti: New York

Roste v USA.

Vaccinium dominans

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vzpřímeného keře až stromu. Dorůstá výšky 2 - 10m. Větve jsou vzpřímené, v mládí jemně ochlupené. Listy jsou eliptické, kožovité, zakulacené, lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 1 - 1,7cm široké 5 - 8mm, báze uťatá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5mm. Květenstvím je vzpřímený bohatý hrozne s hranatým vřetenem délky 3 - 4cm, květy mají stopky délky 3 - 4mm, listeny jsou dlouhé do 8mm, koruna dlouze baňkovitá, sivě růžová, červena, narůžověle fialová, dlouhá 6 - 7mm, široká 3 - 4mm. Plody jsou kulovité, téměř černé s průměrem 4mm.

Vaccinium donianum

Vaccinium dubiosum

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě stromu. Dorůstá výšky 7 - 15m při průměru kmene do 40cm. Listy jsou eliptické, ocasovité, drobně žláznaté, téměř kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 3,5 - 6cm, široké 1,3 - 2,3cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2- 3mm. Květenství tvoří 2 - 5 hustých hroznů s 8 - 15ti květy, vřeteno je dlouhé 2 - 3,5cm, vlastní květy mají stopky délky 3 - 5mm, listen délky do 1,5cm, koruna dlouze baňkovitá, červená, dlouhá 4mm a široká 2,5mm. Plodem je kulovitá černá bobule průměru 3,5mm.

Vaccinium duclouxii

synonyma: Pieris duclouxii, V. donianum, V. duclouxii var. duclouxii, V. forrestii

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného bohatě větveného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 5 (i 10)m. Větve jsou v mládí holé a hranaté. Listy jsou řídké, holé až žláznatě štětinaté, špičaté, úzce vejčité, kožovité, dlouhé 3 - 13cm, široké 1,7 - 3,5cm, žilnatinu tvoří 3 páry žilek, báze je zakulacená

a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, dlouhé 1,5 - 8cm, 9 - 18tičetné, listeny dlouhé 5 - 7mm, vlastní květy mají 0,5 - 2,5mm stopky, 2 listence délky 1,5mm, kališní laloky dlouhé 1 - 1,3mm, koruna bílá nebo růžová, dlouze baňkovitá a dlouhá 6 - 8mm. Plody jsou tmavě růžově fialové, kulovité s průměrem 6 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. duclouxii/V. donianum/Pieris duclouxii - Sichuan, Yunnan; mladé větve, řapíky, centrální žilka na spodní straně listů a vřeteno květenství holé
- var. hirtellum - Yunnan; větve ochlupené, žláznatě štětinaté; vřeteno a kališní trubka jemně ochlupené
- var. hirticaule - Yunnan; větve, řapíky, kališní trubka se zuby žláznatě štětinaté
- var. pubipes/V. sprengelii - Yunnan; větve, řapíky, báze spodní strany listů ochlupené, vřeteno jemně plstnaté

Vaccinium duhiosum

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Vaccinium dunalianum

synonyma: Epigynium dunalianum, Thibaudia revoluta

oblasti: Ásám, Bhútán, J Čína, JV Čína, JZ Čína, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, Tchaj-wan, V Čína, V Himálaj, Vietnam, Xizang (Tibet)

Roste od Indie přes Čínu po Vietnam v podobě stálezeleného vzpřímeného nebo i šplhavého epifytického keře výšky (1 -) 1,5 - 4 (i 5)m anebo stromu s výškou 3 - 17m. Větve jsou v mládí hranaté a mohou být ochlupené. Listy jsou řídké, mírně vejčité, kožovité, přitiskle žláznatě ochlupené, ocasovité, dlouhé 4,5 - 10 (i 17)cm, široké 2 - 5 (i 8)cm, na spodní straně přitiskle žláznatě ochlupené, žilnatinu tvoří 3 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 0,7 (i 1,4)cm. Květenství je hroznovité, 5 - 18tikvěté, dlouhé 2 - 7cm, listeny jsou opadavé, dlouhé 0,7 - 1cm, vlastní květy mají stopky délky (3 -) 5 - 8mm, koruna je nazelenalá nebo narůžovělá, dlouhá 4 - 7mm a široká 4 - 6mm. Plody jsou kulovité s průměrem 0,5 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. caudatifolium/V. caudatifolium - Tchaj-wan; větve mohou být ochlupené; listy holé, dlouhé 5 - 11cm, široké 2,5 - 3,5cm
- var. dunalianum/Epigynium dunalianum/Thibaudia revolute - Čína, Bhútán, Indie, Myanmar, Sikkim, Vietnam; větve a listy holé, spodní strana listů částečně přitiskle žláznatě ochlupená, listy dlouhé 4,5 - 13cm, široké 2,5 - 5cm
- var. megaphyllum/V. lincangense - Čína; keře, mohou být i ovíjivé; větve s listy holé; listy dlouhé 10 -17cm, široké 3 - 8cm, špičaté
- var. urophyllum/var. calycinum/V. camphorifolium/V. dopii/V. petelotii/V. sangtavanense/V. yersini/Pieris martinii - Čína, Myanmar, Vietnam; mladé větve, řapíky a centrální žilka ochlupená; listy dlouhé 6 - 12,7cm, široké 2 - 4,7cm

Vaccinium dunnianum

synonyma: Agapetes vaccinoides

oblasti: Guangxi, Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného řídkého keře (i epifytického) (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 5m. Listy jsou řídké, mírně vejčité, kožovité, ocasovité, okraj může být podvinutý, dlouhé 9 - 19cm, široké 2,5 - 5,5cm, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek, báze kulatá až srdčitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je hroznovité, bohaté, dlouhé (3 -) 7 - 15cm, listeny opadavé, dlouhé 1m, vlastní květy mají 0,6 - 1,5cm stopky, korunu žlutě zelenou, zvonkovitou, dlouhou 6 - 7mm, laloky vejčitě 3úhlé a dlouhé 2mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 6mm.

Vaccinium ekmanii

oblasti: Dominikánská Republika

Roste v Dominikánské Republice.

Vaccinium elegans

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 10m při průměru kmen 7 - 30cm. Borka je tmavěhnědá. Listy jsou kopinaté, ocasovité, celokrajné, tmavězelené, lesklé, v mládí načervenalé, dlouhé 3 - 5,5cm, široké 1,5 - 2cm, spodní strana žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 3 - 4 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je hrozen vyskytující se po 4 - 6ti ks, jsou 8 - 15tičetné, vřeteno je dlouhé 3 - 5cm, vlastní stopky jsou dlouhé 4 - 7mm, koruna je dlouze válcovitá, bělavá, dlouhá 5 - 6mm a široká 2,5mm. Plody jsou kulovité, zelené a v průměru mají 3mm.

Vaccinium elliottii
synonyma: Cyanococcus elliottii

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Pochází z jihovýchodu USA (Virginia, Florida, Arkansas, Texas). Patří mezi opadavé keře. Dorsůtá výšky 2 - 4m. Listy mají oválný tvar, okraj jemně pilovitý, olysalý a má délku 1,5 - 3cm. Kvete růžovými zvonkově tvarovanými květy délky 6 - 7 (i 8)mm. Plodem je jedlá bobule modročerné barvy o průměru 5 - 8mm.

Vaccinium ellipticum
synonyma: Agapetes elliptica, Agapetes vulgaris, Epigynium ellipticum, Thibaudia elliptica

Vaccinium elliptifolium

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Větve jsou v mládí krátce plstnaté. Listy jsou řídké, eliptické, tupé, občas vykrojené, kožovité, mírně lesklé, celokrajné, podvinuté, dlouhé 2 - 3cm, široké 1,3 - 3cm, báze ochlupená, spodní strana tečkovaná, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý úžlabní 6 - 10tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé 2 - 3cm, vlastní květy mají 5mm stopky, koruna baňkovitá, dlouhá 7 - 9mm, široká 3mm a má červenou barvu. Plody jsou široce vejčité a ochlupené.

Vaccinium elvirae

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Povrch může být řídce ochlupený. Borka podélně praská. Listy jsou tlusté, kožovité, kopinaté, špičaté, celokrajné, mírně podvinuté, přitiskle ochlupené, dlouhé 2 - 4,5cm, široké 0,8 - 2cm, na spodní straně žláznatě chlupaté a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenství je svazečkovité, tvořené z 5 - 8mi květů, vlastní květy jsou 4 - 5tičetné, mají 1 listen délky 4mm a 2 listence, stopka má délku do 1mm, kalich je světle zelený, velký 5 - 6mm, koruna válcovitě zvonkovitá, bílá, holá a dlouhá 6,5mm.

Vaccinium emarginatum

synonyma: Agapetes emarginata, V. amamianum

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě stálezeleného epifytického keře. Listy jsou řídké, holé, mírně obvejčité, kožovité, nasivělé, podvinuté, celokrajné, zaoblené, vykrojené, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 0,9 - 2cm, spodní strana je nahnědlá, žilnatinu tvoří 2 páry žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je hroznovité, 2 - 5tičetné, dlouhé 1 - 1,5cm, listeny jsou dlouhé 1,5mm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopky, korunu bílou, zvonkovitou a dlouhou 5 - 6mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium empetrum

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Vaccinium endertii

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky do 6m. Listy jsou mírně obvejčité, zaoblené, kožovité, tuhé, holé, lesklé, celokrajné, dlouhé 4,5 - 9,5cm, široké 2,5 - 4,3cm, báze kulatá až mírně srdčitá, spodní strana řídce žláznatě hrbolkatá či tečkovaná, žilnatinu tvoří 7 - 9 žilek se 3 - 4mi páry a řapíky jsou dlouhé 4 - 5mm. Květenstvím je úžlabní 7 - 15tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé 5 - 8,3cm, vlastní květy mají stopky délky 0,9 - 1,2cm, korunu dlouze baňkovitou, zelenobílou, s červenou bází, dlouhou 1 - 1,2cm a širokou 3 - 4mm.

Vaccinium epiphyticum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Listy jsou řídké, eliptické, ocasovité, téměř kožovité, celokrajné, dlouhé 10 - 12cm, široké 4 - 6cm, na spodní straně řídce načervenale přitiskle ochlupené, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenstvím

je úžlabní 6 - 8mičetný hrozen, listen má délku do 1cm, koruna je trubkovitá a dlouhá 1 - 1,2cm.

Vaccinium erythrocarpum (Brusnice červenoplodá)

synonyma: Hugeria erythrocarpa, Oxycoccoides erythrocarpus, Oxycoccus erectus, Oxycoccus erythrocarpus, Schollera erecta, Schollera erythrocarpa, V. erythrocarpum f. erythrocarpum

oblasti: Alabama, Georgia, Kentucky, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Roste v USA v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky 0,7 - 1,5 (i 2)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně kopinaté až vejčitě kopinaté, špičaté, drobně pilovité, ochlupené, dlouhé (2,5 -) 3 - 6 (i 7)cm a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Kvete samostatnými úžlabními 1/2převislými květy, koruna má délku 1cm a je bledě červená. Plody jsou růžově fialově černé, kyselé a v průměru mají 1 (i 1,5)cm.

Vaccinium eugenioides

Vaccinium euryanthum

oblasti: Guyana, Venezuela

Roste ve Venezuele a Guayaně.

Vaccinium evanidinervium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Větve jsou v mládí načervenalé, mírně hranaté a krátce ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, lesklé, vroubkované, dlouhé 0,9 - 1,5cm, široké 5 - 7mm, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství tvoří několik květů, stopky jsou dlouhé 3 - 5mm, koruna je válcovitě baňkovitá, červená, holá, dlouhé 1cm a široká 5 - 6mm. Plodem je kulovitá černě modrá bobule o průměru 5 - 6mm.

Vaccinium exaristatum

synonyma: V. apricum, V. bancanum, V. exaristatum var. pubescens, V. garrettii, V. longitubulosum, V. winitii

oblasti: Ásám, J Čína, JV Čína, JZ Čína, Laos, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam

Roste od Číny po Laos, Thajsko, Vietnam a Myanmar v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 14m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, ochlupené, mírně vejčité, kožovité, špičaté, dlouhé 3 - 7,5cm, široké 2 - 3cm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 3 - 10cm, bohaté, listeny jsou dlouhé 2,5 - 3mm, vlastní květy mají 1 - 3,5mm stopky, 2 listence, koruna je růžová, dlouhá 6 - 8mm. Plodem je červená až temně růžově fialová kulovitá bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium exiguum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Vaccinium exul

synonyma: V. africanum, V. exul var. africanum

oblasti: Malawi, Svazijsko, Transvaal

Roste v Malawi, JAR a Svazijsku v podobě zpravidla od báze bohatě větveného keře až stromu. Dorůstá výšky (0,8 -) 2 - 4 (i 7)m. Borka je šedá, bledě hnědá až načervenalá a občas pruhovaná. Listy jsou střídavé, kopinaté, špičaté kožovité, zelené, oboustranně zúžené, zubaté, tmavě zelené, dlouhé (3 -) 4 - 6 (i 7)cm, široké (0,9 -) 1 - 2 (i 3,2)cm, spodní strana modře zelená a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství je 4 - 5tičetné, dlouhé do 4cm, má 0,5 - 1,2cm stopku, listeny jsou dlouhé 2 - 5mm, vlastní květy jsou béžově bílé či narůžovělé, zvonkové, délky do 7mm, kalich je dlouhý 2mm, laloky 3úhlé, dlouhé 1mm, široké 1,5mm, koruna je urnovitá a dlouhá 6 - 7mm. Plody jsou kulovité, tmavě červené až modré nebo černé o průměru 0,5 - 1cm.

Vaccinium eymae

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Větve jsou na vrcholu ochlupené. Listy jsou řídké, mírně vejčité, ocasovité, prakticky kožovité, v mládí ochlupené, celokrajné, dlouhé 3 - 5cm, široké 1 - 1,6cm, na spodní straně mezi žilkami žláznatě ochlupené, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je úžlabní 5 - 8mičetný hrozen složený ze 3 - 4četných svazečků, vřeteno je dlouhé do 1cm, vlastní květy mají 0,8 - 1,3cm stopky, korunu dlouze baňkovitou a dlouhou 1,1 - 1,2cm.

Vaccinium fallax

Vaccinium fasciculatum

Vaccinium fastigiatum

Vaccinium filiforme

synonyma: Rigiolepis filiformis

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky 4m. Větve jsou v mládí hranaté a jemně ochlupené. Listy jsou kopinaté, ocasovité, mírně kožovité, v mládí ochlupené, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 9,5 - 15,5cm, široké 2,5 - 4cm, spodní strana řídce žláznatá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je hrozen v počtu 1 - 3ks, je téměř přisedlý, 10 - 15tičetný, vřeteno je dlouhé 3 - 5cm, vlastní květy mají 6- 8mm stopky, 2 listence, korunu baňkovitou, nažloutlou, a dlouhou 2,5mm.

Vaccinium filipes

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vzpřímeného epifytického keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Větve jsou ochlupené. Listy jsou řídké, kopinaté, ocasovité, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 4,5 - 6,5cm, široké 1 - 3,5cm, žilnatinu tvoří 2 žilky a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je řídký chudý hrozen, vřeteno je dlouhé do 4cm, vlastní květy mají stopky délky 1,5 - 2cm, koruna je vejčitá, červená, dlouhá 5 - 6mm a široká 4mm.

Vaccinium fimbribracteatum

oblasti: Guizhou, Sichuan

Roste v Číně v podobě stálezeleného bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5 (i 4)m. Větve jsou ochlupené. Listy jsou mírně kopinaté, kožovité, pilovité, špičaté, dlouhé 3,5 - 5cm, široké 1,3 - 1,8cm, žilnatinu tvoří 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 7 - 12cm, bohaté, listeny vytrvávající, dlouhé 0,6 - 1cm, vlastní květy mají 2 - 5mm stopky, 2 opadavé listence délky 2mm, koruna je bílá nebo narůžovělá a dlouhá 7 - 8mm. Plody nejsou známé.

Vaccinium fimbricalyx

oblasti: Guangdong, Guangxi

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Listy jsou řídké, kopinaté, kožovité, v mládí na centrálním žebru ochlupené, celokrajné, ocasovité, dlouhé 3 - 6,5cm, široké 1,5 - 2,2cm a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, dlouhé 1 - 2cm, 6 - 12tičetné, vlastní květy mají 1 - 2mm stopky, okraje kališních lístků třásnité, koruna bílá, dlouze zvonkovitá a dlouhá 4mm. Plodem je tmavě růžově fialová ojíněná kulovitá bobule průměru 0,8 - 1cm.

Vaccinium finisterrae

synonyma: V. haemanthum, V. parvulifolium, V. sessififlorum, V. sessiliflorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě (i epifytického) keře. Dorůstá výšky 0,4 - 2,5m. Větve jsou v mládí žláznatě ochlupené. Listy jsou eliptické, tupé, kožovité, na spodní straně žláznatě ochlupené, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 0,8 - 2cm, široké 0,5 - 1cm a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 2mm. Kvete samostatnými prakticky přisedlými květy, stopky jsou dlouhé do 1,5mm, koruna baňkovitá, růžová až červená, na vrcholu ochlupená, dlouhá 4 - 7mm a široká 2,5 - 4mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 3 - 4mm.

Vaccinium fissiflorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě popínavé liány. Větve jsou převislé, v mládí hranaté. Listy jsou

vejčité, zašpičatělé, kožovité, holé, jemně zubaté, dlouhé 7 - 14cm, široké 3,5 - 7,5cm, na spodní straně řídce tečkované, žláznaté, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - +,5cm. Květenstvím je 4 - 20tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé do 2cm, vlastní květy jsou růžové, červené nebo růžovofialové, vlastní květy mají stopky délky 1,5 - 3,5cm, kalich délky 2 - 3mm, koruna je zvonkovitá, dlouhá 7mm a červená. Plody jsou kulovité, červené a dlouhé 3 - 4mm.

Vaccinium flagellatifolium

synonyma: Rigiolepis caudatifolia, V. caudatifolium, V. myrianthum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře (i epifytického), liány (s délkou do 20m) nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou na koncích v mládí krátce ochlupené. Listy jsou podlouhlé, ocasovité, kožovité, lesklé, mohou být mírně podvinuté, dlouhé 9 - 16cm, široké 2 - 4cm, na spodní straně přitiskle ochlupené, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4cm. Květenstvím je úžlabní hrozen vyskytující se po (1 -) 2 - 3ks, je 8 - 15tičetný, žláznatě ochlupený, vřeteno dlouhé 3,5 - 5cm, vlastní květy mají 4 - 6mm stopky, listeny délky 2 - 3mm, listence šídlovité, koruna široce baňkovitá a dlouhá 2mm. Plody jsou žluté, kulovité a průměru 3mm.

Vaccinium floccosum

synonyma: Hornemannia floccosa, Symphysia floccosa

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Panamě a Kostarice v podobě keře, který může být i epifytický. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 4)m. Větve jsou šedě zelené. Listy jsou kožovité, kopinaté, špičaté, řídce přitiskle žláznatě ochlupené, dlouhé (3 -) 5 - 9 (i 11)cm, široké (1,5 -) 3 - 5 (i 6,5)cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 4 (i 6)mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, má 0,2 - 1 (i 2,5)cm stopky, vřeteno dlouhé 0,5 - 1cm, listeny dlouhé 1 - 3mm, vlastní květy mají 1 - 2,5cm stopky, 2 listence délky do 1,5mm, koruna válcovitá, dlouhá 0,7 - 1cm, široká 4 - 5mm a barvy nazelenalé nebo načervenalé. Plody jsou tmavě růžovofialové s průměrem 0,8 - 1cm.

Vaccinium floribundum

synonyma: Epigynium floribundum, Metagonia crenulata, Metagonia marginata, V. callosum, V. crenulatum, V. dasygynum, V. floribundum var. floribundum, V. floribundum var. marginatum, V. floribundum var. ramosissimum, V. floribundum var. tatei, V. leiandrum, V. marginatum, V. moritzianum, V. moritzianum var. ovatum, V. mortinia, V. polystachyum, V. ramosissimum, V. tatei, V. thymifolium

oblasti: Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Kostarika, Panama, Peru, SZ Argentina, Venezuela

Roste od Argentiny po Kostariku v podobě keře (může být poléhavý nebo šplhavý). Dorůstá výšky (0,1 -) 0,2 - 3,5 (i 6)m. Kmínky mohou být bíle ochlupené. Listy jsou kožovité, vejčité, zaoblené, špičaté, vroubkovité, dlouhé 0,9 - 2,2cm, široké 0,4 - 1,1cm, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, 6 - 10tičetné, vřeteno je dlouhé do 1,5cm, listeny jsou dlouhé 3 - 4,3mm, vlastní květy mají stopky délky 2 - 5,5mm, kalich je dlouhý 3 - 4mm, trubka dlouhá 1,5 - 1,8mm, laloky dlouhé 1 - 1,5mm, koruna válcovitá, dlouhá 5,5 - 8mm, bílá, růžová nebo červená. Plodem je modročerná kulovitá holá bobule průměru 5 - 8mm.

Vaccinium floridanum
synonyma: Picrococcus floridanus, Polycodium floridanum

Vaccinium foetidissimum
synonyma: Anisophyllea cavaleriei

oblasti: Guizhou

Roste v Číně v podobě stálezeleného bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2,5m. Listy jsou obkopinaté, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, špičaté, dlouhé 4 - 7cm, široké 1 - 2,2cm, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, bohaté, dlouhé 2 - 6cm, vlastní květy mají stopky délky 5 - 8mm. Plodem je vejčitá ojíněná páchnoucí bobule průměru 6 - 7mm.

Vaccinium foetidissiumum
synonyma: Anisophyllea cavaleriei

oblasti: JZ Čína

Roste v Číně v podobě stálezeleného bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 2,5m. Listy jsou obkopinaté až mírně vejčité, špičaté až zašpičatělé, kožovité, dlouhé 4 - 7cm, široké 1 - 2,2cm, báze je sbíhavá a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenstvím je bohatý hrozen délky 2 - 6cm na 5 - 8mm stopce. Plodem je vejčitá bobule průměru 6 - 7mm s kališními laloky délky 2,8mm.

Vaccinium formosum
synonyma: V. australe

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Maryland, New Jersey, Severní Karolína, Virginie

Roste v USA.

Vaccinium foxworthyi

Vaccinium fragile
synonyma: Pieris gagnepainiana, Pieris repens, V. anthonyi, V. fragile var. crinitum, V. fragile var. fragile, V. fragile var. myrtifolium, V. repens, V. setosum, V. wardii

oblasti: Guizhou, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 0,2 - 0,5 (i 1)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté (i tupé), drobně pilovité, dlouhé 1,2 - 4,5cm, široké 0,7 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 2 - 5 párů žilek, báze je zaoblená a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, dlouhé 1,5 - 6cm, žláznatě ochlupené, bohaté, listeny načervenalé, dlouhé 4 - 9mm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopky, listence dlouhé 2 - 4mm, koruna je baňkovitá, bílá nebo narůžovělá a má 5 červených žilek. Plody jsou červené až tmavě růžově fialové, kulovité průměru 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. fragile/var. crinitum/var. myrtifolium/V. anthonyi/V. setosum/V. wardii/Pieris

gagnepainiana/Pieris repens - Guizhou, Sichuan, Yunnan, Xizang; povrch ochlupený; listy dlouhé 1,2 - 3,5cm, široké 0,7 - 2,5cm, 2 - 3 páry žilek, ochlupené
- var. mekongense/V. mekongense/V. salweenense/V. taliense - Sichuan, Yunnan; povrch řídce ochlupený; listy dlouhé 3 - 4,5cm, široké 1,2 - 2,2cm, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek

Vaccinium fraternum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného stromu. Dorůstá výšky 4 - 6m. Větve jsou načervenalé, lesklé. Listy jsou bohaté, eliptické, ocasovité, tupě špičaté, kožovité, celokrajné, dlouhé 3,5 - 6cm, široké 1,5 - 3,2cm, spodní strana řídce žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý úžlabní 10 - 15tičetný hrozen s 3 - 6cm vřetenem, vlastní květy mají stopky délky 4 - 7mm, listen délky 0,6 - 1cm, koruna válcovitě baňkovitá, zeleně bílá a dlouhá 0,7 - 2,5mm.

Vaccinium furfuraceum

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice jako epifyt. Listy jsou vejčité, zašpičatělé, dlouhé (2,5 -) 4 - 6cm, široké (1,2 -) 1,8 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 5 žilek a řapíky dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je 3 - 10 (i 12)tikvětý hrozen, listeny jsou dlouhé 2,5 - 2,6mm, listence dlouhé 2,8mm, vlastní květy mají (0,6 -) 1 - 1,9cm stopku, kalich má velikost 3 - 4,5mm, trubka dlouhá 1,5mm, laloky 1 - 1,2mm, koruna růžově fialová, válcovitě zvonkovitá a velikosti 0,8 - 1,2cm.

Vaccinium fuscatum

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie

Vaccinium gamay

Vaccinium gaultheriifolium

synonyma: Thibaudia gaultheriifolia, V. diaphanoloma, V. gaultheriifolium var. gaultheriifolium

oblasti: Bhútán, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, V Himálaj, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste od Indie po Čínu a Myanmar v podobě stálezeleného řídkého keře. Dorůstá výšky 2 - 4m. Listy jsou eliptické, kožovité, lesklé, na centrální žilce mohou být řídce žláznatě štětinaté, špičaté, kožovité, okraj celokrajný nebo žláznatě štětinatý, dlouhé 6 - 13cm, široké 4 - 6,5cm, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 0,6 (i 1,2)cm. Květenství je hroznovité, dlouhé 2 - 3,5cm, 8 - 13tikvěté, listeny eliptické, dlouhé 1,2cm, stopky mají 0,4 - 1,2cm stopky, listence čárkovité, dlouhé 5 - 6mm a koruna je růžová nebo červená, baňkovitá a dlouhá 0,6 - 1,1cm. Plodem je tmavě růžově fialová kulovitá bobule průměru (0,6 -) 0,8 - 0,9 (i 1)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. gaultheriifolium/V. diaphanoloma/Thibaudia gaultheriifolia - Xizang, Yunnan, Bhútán, Sikkim, Nepál - listy jsou na spodní straně na centrálním žebru řídce žláznatě štětinaté; květy mají stopky délky 0,6 -1,2cm a koruna je růžová
- var. glaucorubrum - Yunnan; listy jsou na spodní straně holé; květy mají 4 - 5mm stopky, korunu červenou a dlouhou 0,8 - 1,1cm

Vaccinium gaultherioides (Vlochyně náholní)

synonyma: V. uliginosum subsp. pubescens

oblasti: Česká republika, Polsko, Slovensko, Švýcarsko, Ukrajina, V Karpaty

Roste v Evropě v podobě poléhavého keře. Dorůstá výšky 5 - 15cm. Borka je žlutohnědá nebo tmavěšedá. Listy jsou drobné, kulaté, obvykle holé, celokrajné, dlouhé 0,6 - 1,6cm a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5mm. Kvete samostatnými květy na 3mm stopce. Plody jsou šedomodré, modrorůžovofialové až tmavěmodré, ojíněné, průměru 0,6 - 1cm.

Vaccinium geminiflorum

oblasti: Arizona, Guatemala, J Mexiko, JV Mexiko, JZ Mexiko, Střední Mexiko, SV Mexiko, V Mexiko

Roste od jihu USA po Guatemalu v podobě vzpřímeného hustého keře. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Větve mohou být řídce ochlupené. Listy jsou obkopinaté, tupé nebo špičaté, drobně pilovité, holé, lesklé, dlouhé 0,6 - 2 (i 3,2)cm, široké 0,3 - 0,8 (i 1,2)cm, žilnatina je síťovaná a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete v paždí listů samostatnými nebo párovitými květy na ohnutých stopkách, listeny jsou eliptické, mírně vejčité až obkopinaté, dlouhé 4,5 - 6mm, široké 1,5 - 3,5mm, kalich má velikost 2 - 3mm, trubka zvonkovitá až kulatá, dlouhá 1,4 - 1,8mm, cípy dlouhé 0,7 - 1,2mm, koruna je 5tičetná, baňkovitá, tmavě růžová až červená a dlouhá 4 - 5mm.

Vaccinium gitigense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Vaccinium gitingense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě rozkladitého od báze větveného keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve jsou na konci drobně ochlupené. Listy jsou řídké, eliptické, tupě špičaté, kožovité, holé, vroubkované, dlouhé 1,5 - 3,5cm, široké 0,8 - 1,8cm, báze zaoblená, žilnatinu tvoří 3 - 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je řídký 5 - 10tičetný hrozen s 4 - 6cm vřetenem, vlastní květy mají stopky délky 0,7 - 1,5cm, listen je kopinatý, kožovitý, vytrvávající, dlouhý do 2cm, široký 1cm, koruna je dlouze baňkovitá, bílá až červená, holá, dlouhá 6mm a široká 3mm.

Vaccinium gjellerupii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vzpřímeného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 0,5 - 6m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou husté, eliptické, špičaté, kožovité, tuhé, celokrajné, dlouhé 3,5 - 7,5cm, široké 1 - 3cm, spodní strana mírně žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 1 - 2 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Květenstvím je hrozen vyskytující se po 2 - 3ks, je 8 - 20tičetný, vřeteno je dlouhé 3 - 6cm, koruna je baňkovitá, růžová až červená, holá, dlouhá 0,8 - 1cm a široká 3 - 4mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium glabrescens

synonyma: V. longibracteatum

oblasti: Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově v podobě keře (i jako epifyt) nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Listy jsou vejčité, celokrajné, dlouhé 1,5 - 5cm, široké 1,2 - 3,5cm, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek, báze je tupě zaoblená a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm. Květenstvím je hustý nažloutle plstnatý hrozen, vřeteno má délku 3 - 8cm, vlastní květy mají zakřivené stopky délky 0,3 - 0,6 (i 1,2)cm, listen je dlouhý do 1,5cm, koruna válcovitá, růžová, dlouhá 7 - 7,5mm a široká 2,5mm. Plodem je kulovitá růžová až zelená bobule délky 4mm a průměru 3mm.

Vaccinium glandellatum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky až 1,5m. Větve jsou v mládí pruhované. Listy jsou eliptické, mírně ocasovité, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 4 - 7cm, široké 1,8 - 3cm, spodní strana žláznatě hrbolkatá, žilnatinu tvoří 7 - 9 žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Kvete v řídkých bohatých hroznech s vřetenem délky 4 - 9cm, vlastní květy mají stopky délky 5 - 8mm, listen délky 0,4 - 1cm, koruna má délku 1cm a šířku 4 - 5mm.

Vaccinium glandulosum

synonyma: Polycodium glandulosum

Vaccinium glaucoalbum

oblasti: Bhútán, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, V Himálaj, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste od Indie po Čínu v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 1 - 3m.Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, žlutě zelené, eliptické až mírně vejčité, špičaté až zašpičatělé, mírně kožovité, dlouhé 3 - 8cm, široké 2 - 4cm, báze uťatá, spodní strana modře zelená, nasivělá, centrální žebro žláznatě štětinaté, žilnatinu tvoří 4 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 3 - 5,5 (i 7)cm, 5 - 10tičetné, listeny vytrvávající, široce eliptické, dlouhé (0,7 -) 1 - 2cm, vlastní květy mají 3 - 5mm stopku, kalich je dlouhý 1mm, cípy 0,2mm, koruna je bílá, baňkovitá a dlouhá 5 - 6mm. Plodem je kulovitá černá ojíněná jedlá bobule průměru (4 -) 6 - 8mm.

Vaccinium glaucophyllum

oblasti: Guizhou

Roste v Číně v podobě stálezeleného bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou husté, eliptické, kožovité, celokrajné, holé, nasivělé, podvinuté, špičaté, dlouhé 1,8 - 2,5cm, široké 5 - 9mm, báze uťatá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, dlouhé 3 - 4cm a vlastní květy mají 3 - 4mm stopky. Plodem je kulovitá holá bobule průměru 3 - 4mm s vytrvalými 3úhlými kališními laloky délky 0,6 - 1mm.

Vaccinium glaucorubrum

synonyma: V. gaultheriifolium var. glaucorubrum

oblasti: J Čína, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu.

Vaccinium globosum

synonyma: V. globosum var. latifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vzpřímeného bohatě větveného keře. Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou husté, tmavězelené, obvejčité, zaoblené, řídce vroubkované, na okraji tlusté, podvinuté, dlouhé 0,4 - 1,2cm, široké 2 - 5mm, žilnatinu tvoří 1 - 4 zapuštěné žilky, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete samostatnými převislými květy v paždí listů, stopky jsou dlouhé 6 - 8mm, koruna je široce baňkovitá, dlouhá 4mm, široká 3,5mm a je bělavá a průsvitná. Plodem je kulovitá tmavě růžově fialová bobule.

Vaccinium globulare

Vaccinium goodenoughii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě šplhavé liány. Větve jsou mírně převislé a v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou řídké, kopinaté, ocasovité, kožovité, tuhé, holé, mírně lesklé, celokrajné, mohou být podvinuté, dlouhé 4 - 6,5cm, široké 1,5 - 3cm, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek, báze je zúžená a řapíky jsou dlouhé 3 - 4mm. Květenstvím je hrozen objevující se po 2 - 5ti ks, je řídce 8 - 15tičetný, vřeteno je dlouhé 2,5 - 5cm, vlastní květy mají 4 - 6mm stopky, listen délky 7mm, koruna je dlouze baňkovitá, bílá, holá a dlouhá 5 - 6mm.

Vaccinium gracile

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Povrch je v mládí řídce hrbolatě žláznatý a ochlupený. Listy jsou vejčité, ocasovité, mírně kožovité, lesklé, holé (kromě žilnatiny), dlouhé 6,5 -

10cm, široké 1,8 - 3,7cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 (i 4) páry žilek báze je zúžená a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenstvím je hrozen objevující se po 3 - 4ks, je řídký, 8 - 12tičetný, vřeteno je dlouhé 2,5 - 4,7cm, vlastní květy jsou převislé, mají 2,5 - 4,7cm stopku, koruna je baňkovitá, červená, dlouhá 1,1 - 1,4cm a široká 3mm.

Vaccinium gracilipes

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře v podobě stromu. Kmen má průměru 10cm. Listy jsou řídké, mírně kopinaté, ocasovité, mírně kožovité, holé, celokrajné, podvinuté, dlouhé 4 - 8cm, široké 1,5 - 3cm, spod ní strana řídce žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,1cm. Květenstvím je úžlabní hrozen objevující se po 2 - 5ti ks, vřeteno je dlouhé 5 - 9cm, vlastní květy mají stopky délky 1 - 1,7cm, koruna je baňkovitá, bílá, dlouhá 6 - 7mm a široká 3 - 4mm.

Vaccinium gracillimum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Listy jsou řídké, ocasovité, tuhé, mírně kožovité, holé, lesklé, celokrajné, dlouhé 3,5 - 6cm, široké 0,9 - 1,9cm, báze široce klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je hrozen objevující se po 3 - 5ti ks, je řídký, 8 - 11tičetný, vřeteno má délku 3,5 - 4,5cm, vlastní květy mají stopku délky 1,2 - 2cm, koruna je baňkovitá, narůžovělá, dlouhá 7mm a široká 3 - 4mm.

Vaccinium grandibracteatum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Listy jsou mírně obvejčité, kožovité, holé, dlouhé 8 - 11cm, široké 2,5 - 4cm a báze je klínovitá. Květenstvím je vzpřímený 15 - 20tičetný hrozen délky do 10cm, listen má délku 1cm, kalich je dlouhý 2,5mm, koruna je dlouze baňkovitá, bílá, holá, uvnitř ochlupená, dlouhá 9mm a široká 3mm.

Vaccinium griffithianum

synonyma: Epigynium griffithianum, V. eberhardtii

oblasti: Ásám, J Čína, JV Čína, Myanmar (Barma), Thajsko, V Himálaj, Vietnam

Roste v Číně, Indii, východním Himálaji, Myanmaru, Thajsku a Vietnamu.

Vaccinium guadalupensis

Vaccinium gualtheriifolium

Vaccinium gualtherioides

Vaccinium guangdongense

oblasti: Guangdong

Roste v Číně v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 6m. Větve jsou v mládí hranaté a holé. Listy jsou řídké, prakticky holé, špičaté, zubaté, eliptické až mírně kopinaté, kožovité, dlouhé 3,5 - 4,2cm, široké 1,2 - 1,6cm, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé (2 -) 2,5 - 3mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 3,5 - 4,5cm, vlastní květy mají 3 - 5mm stopky. Plody jsou kulovité, červené, ochlupené a v průměru mají 2,5mm.

Vaccinium habbemae

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. habbemae - výška 1 - 1,5m; větve v mládí nažloutle ochlupené; listy mírně vejčité, ocasovité, celokrajné, dlouhé 2,5 - 4,5cm, široké 1 - 1,5cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 žilky, řapíky dlouhé 2 - 4mm; 1 - 3ks úžlabních hroznů s 4 - 6ti květy, vřeteno dlouhé 1 - 4cm, květy mají stopky délky 1 - 1,5cm, koruna dlouze baňkovitá, dlouhá 1cm, široká 3mm
- var. parvifolium - listey vejčité, jemně vroubkované, špičaté až tupé, dlouhé 1,2 - 2cm, široké 0,6 - 1,1cm; hrozny až 13tičetné
- var. pluriglandulosum - asymetrické okrajové žlázy; květy růžově fialově červené

Vaccinium haematinum

oblasti: Guatemala, Honduras

Roste v Guatemale a Hondurasu v podobě keře (i poléhavého). Dorůstá výšky do 4,5m. Větve jsou červenohnědé, v mládí mohou být ochlupené. Listy jsou tuhé, kožovité, lesklé, eliptické, vroubkované až téměř celokrajné, tupé, dlouhé 2 - 6,5cm, široké 1,5 - 4cm, řapíky dlouhé 4 - 5mm, báze široce klínovitá, žilnatinu tvoří 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 5mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, chudé, dlouhé do 1cm, vlastní květy mají 4mm stopky, 2 listence, korunu bílou, dlouhou 6mm, širokou 3mm. Plodem je 5mm dlouhá bobule.

Vaccinium haematochroum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě poléhavého větveného keře. Dorůstá výšky do 35cm. Větve jsou v mládí hustě olistěné a ochlupené. Listy jsou eliptické, celokrajné, holé, na obou stranách zaoblené až zúžené, dlouhé 5 - 7mm, široké 3 - 4mm a řapíky dlouhé 1 - 1,5mm. Kvete samostatnými květy na 2 - 3mm převislé stopce, koruna baňkovitá, řídce ochlupená, červená, dlouhá 5mm a široká 2,5 - 3mm.

Vaccinium hagerupii

synonyma: Oxycoccus hagerupii, Oxycoccus palustris subsp. hagerupii

oblasti: Dánsko, Finsko, Švýcarsko

Roste ve Švýcarsku, Dánsku a Finsku.

Vaccinium hainanense

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě stálezeleného keře. Povrch je holý. Větve jsou mírně hranaté. Listy jsou řídké, úzce eliptické až mírně obvejčité, kožovité, celokrajné, tupé až špičaté, dlouhé 4 - 6cm, široké 2 - 3cm, báze je sbíhavá, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 6 - 8mm. Květenství úžlabní, hroznovité, bohaté, dlouhé 4 - 6cm, vřeteno hranaté, bez listenů a stopky mají délku 2,5 - 5mm. Plodem je červená holá bobule průměru 5mm.

Vaccinium haitangense

oblasti: Sichuan

Roste v Číně v podobě nízkého stálezeleného keře. Větve mohou být ochlupené. Listy jsou úzce eliptické, kožovité, dlouhé 2,2 - 2,6cm, široké 1 - 1,2cm, žilnatinu tvoří 3 páry zapuštěných žilek, báze klínovitá a řapíky dlouhé 1 - 2mm. Květenství hroznovité, dlouhé 2 - 3cm, holé, chudé, listeny podlouhlé, vlastní květy mají 4mm stopky, korunu narůžovělou, baňkovitou, dlouhou 4 - 5mm. Plody nejsou známé.

Vaccinium halconense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě stromovitého keře (může být i epifytický nebo šplhavý). Dorůstá výšky 3 - 15m. Větve jsou černohnědé, holé a hranaté. Listy jsou řídké, eliptické, špičaté (i zaoblené), kožovité, celokrajné, mírně zakřivené, dlouhé 6 - 11cm, široké 2 - 4cm, spodní strana řídce žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenstvím je úžlabní vzpřímený hrozen z 10 - 15ti květů, vřeteno dlouhé 3 - 7cm, vlastní květy mají 0,6 - 1cm stopky, koruna dlouze baňkovitá, dlouhá 5 - 7mm, široká 2,5 - 3mm a bílá. Plodem je kulovitá bobule průměru 8mm.

Vaccinium hamiguitanense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Vaccinium hansmeyeri

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium harmandianum

oblasti: Kambodža, Laos, Yunnan

Roste v Číně, Kambodži a Laosu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 10m. Listy jsou řídké, vejčité až kopinaté, mělce pilovité, srpovité, dlouhé 5,5 - 12,5cm, široké 2 - 5cm, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek, báze klínovitá a řapíky dlouhé 3 - 7mm. Květenství úžlabní, hroznovité, dlouhé 4 - 10cm, 10 - 15tičetné, listeny dlouhé 5 - 6mm, květy mají 4 - 5mm stopky, koruna bílá, narůžovělá a dlouhá 7 - 8mm. Plodem je kulovitá růžovofialová bobule průměru 6 - 7mm.

Vaccinium hatamense

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře (i epifytického). Dorůstá výšky 30 - 50cm. Větve jsou v mládí hranaté a drobně ochlupené. Listy jsou dlouze obvejčité, zaoblené až mělce vykrojené, kožovité, holé, celokrajné, okraje zakřivené, dlouhé 1 - 1,7cm, široké 4 - 7mm, báze klínovitá a řapíky dlouhé 1mm. Květy řídké, úžlabní, stopky dlouhé 1 - 1,5mm, koruna soudkovitá, dlouhá 4mm, široká 3,5mm, růžově červená a na vrcholu ochlupená.

Vaccinium hellwigianum
synonyma: V. acutissimum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře (i epifytického) nebo stromu. Listy úzce vejčité, ocasovité, kožovité, holé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 4 - 5,5cm, široké 1,2 - 2cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky dlouhé 3mm. Květenstvím je úžlabní 8 - 12tičetný hrozen s vřetenem délky 2,5 - 3cm, vlastní květy mají 4 - 6mm stopky, koruna válcovitá, dlouhá 6 - 7mm, široká 1,5 - 2mm a je růžová až červená. Plodem je zploštělá červeně růžově fialová bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium henrici

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě epifytického šplhavého keře. Větve jsou červenohnědé, v mládí plstnaté. Listy jsou vejčité, ocasovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 4,5 - 5cm, široké 1,5 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 2mm. Kvete v úžlabním řídkém hroznu, vřeteno má délku 3 - 4,5cm, vlastní květy mají stopky délky 4mm, listence čárkovité, koruna dlouze baňkovitá, dlouhá 4mm, široká 3,5mm a má barvu bílou až béžovou.

Vaccinium henryi (Brusnice Henryova)
synonyma: V. henryi var. henryi

oblasti: J Čína, JV Čína, V Čína

Roste v Číně v podobě opadavého bohatě větveného keře. Dorůstá výšky (0,5 -) 1 - 3m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, vejčité až podlouhlé, špičaté až zašpičatělé, ochlupené, dlouhé (1,5 -) 3 - 7 (i 8)cm, široké (0,7 -) 1,5 - 3 (i 4)cm, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek, báze klínovitá až zaoblená a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je terminální, hroznovité, vlastní květy mají 1 - 3mm stopky, listence 2, koruna žlutě zelená, zvonkovitá, dlouhá 3 - 5mm, laloky 3úhlé a dlouhé 0,5mm. Plody jsou tmavě růžově fialové, kulovité o průměru mají 7 - 9mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. chingii/V. chingii - větve hustě ochlupené; listy řídce ochlupené; květy mají stopky délky 1 - 3mm, kališní lístky holé
- var. henryi - větve ochlupené; listy hustě ochlupené; květy mají max. 1mm stopku, kališní lístky bývají ochlupené

Vaccinium hiepii

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Vaccinium hirsutum (Brusnice chlupatá)

synonyma: Cyanococcus hirsutus

oblasti: Georgia, Severní Karolína, Tennessee

Roste v USA v koloniích v podobě vzpřímeného opadavého keře. Dorůstá výšky do 0,6 (i 1)m. Větve jsou vystoupavé a ochlupené. Listy jsou úzce vejčité až eliptické, ochlupené, dlouhé 2,3 - 6,2cm, široké 1 - 3,6cm a spodní strana je bledší. Květenstvím je hrozen, vlastní květy mají zelený kalich, dlouze baňkovitou bílou korunu délky 0,5 - 0,9 (i 1,2)cm. Plodem je kulovitá červeně černá žláznatě ochlupená bobule průměru (6 -) 7 - 9mm obsahující 3 - 9 semen délky 1mm.

Vaccinium hirtum (Brusnice tuhosrstá)

synonyma: V. buergeri, V. kiusianum, V. motosukeanum, V. smallii

oblasti: Chabarovsko, Japonsko, Korea, Sachalin, Severní Amerika, SV Čína

Roste od Ruska přes Čínu, Japonsko, Koreu po Severní Ameriku v podobě opadavého rozložitého keře. Větve jsou hranaté a ochlupené. Borka je tmavěhnědá. Listy jsou mírně vejčité, bíle ochlupené, drobně zoubkované, špičaté, dlouhé 1,5 - 6,5cm, široké 0,5 - 3cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květy jsou seskupené v terminálních svazcích, mají 3 - 5mm stopku, listence opadavé, kalich 5tizubý, koruna válcovitá, dlouhá 6 - 8mm a v barvě načervenalé až růžovofialové. Plodem je červená až modročerná podlouhlá bobule délky 0,7 - 1cm a průměru 6 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. hirtum
- var. koreanum
- var. pubescens

Vaccinium hispidulissimum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Větve jsou v mládí hustě drobně ochlupené. Listy jsou řídké, mírně vejčité, ocasovité, v mládí ochlupené, celokrajné, na okraji podvinuté, dlouhé 3,5 - 5cm, široké 1 - 1,6cm, centrální žebro zapuštěné, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 3mm. Květenstvím je úžlabní prakticky chocholičnatý hrozen z 5ti květů, vřeteno má délku 1 - 1,5cm, stopky jsou dlouhé 0,8 - 1,2cm, koruna dlouze baňkovitá, dlouhá 1cm a široká 2,5mm.

Vaccinium hitchcockii

Povrch je v mládí ochlupený. Listy jsou eliptické, zašpičatělé, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 1 - 1,5cm, báze je zašpičatělá a řapíky dlouhé 1mm. Květenstvím je vrcholový až úžlabní řídce ochlupený hrozen délky 2,5cm, listeny jsou dlouhé 2mm, kalich má 5 laloků délky 2mm, koruna zvonkovitá, délky 4mm, s 5ti laloky délky 1,2mm.

Vaccinium holophyllum

Vaccinium hooglandii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře (i epifytického) nebo stromu. Povrch je holý. Větve jsou šedé, v mládí hranaté, u báze hustě olistěné, na vrcholu až střechovitě. Listy jsou vejčité, špičaté, objímavé, kožovité, celokrajné, zelené, v mládí načervenalé a modře ojíněné, spodní větší, okraj lehce podvinutý, dlouhé 5 - 9cm, široké 3 - 6cm, horní menší, dlouhé do 2,5cm, široké 1,5 - 2cm, žilnatinu tvoří 7- 8 párů žilek a řapíky dlouhé 1 - 3mm. Květenstvím je úžlabní krátký 5 - 12tičetný hrozen s 1cm vřetenem, vlastní květy mají stopky délky 0,8 - 1,3cm, listen délky 6mm, koruna zvonkovitě baňkovitá, růžová, dlouhá 5mm, široká 4mm. Plodem je kulovitá načervenalá bobule průměru 6mm.

Vaccinium hopei

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium horizontale

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vzpřímeného (i epifytického) keře. Větve jsou v mládí hranaté až křídlaté. Listy jsou obvejčité, kožovité, lesklé, holé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 2,5 - 4cm, široké 1 - 2cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, báze klínovitá, spodní strana žláznatá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství tvoří 1 - 2 hrozny s 5 - 12ti květy, vřeteno je dlouhé 3 - 4,5cm, vlastní květy mají 0,8 - 1,2cm stopky, koruna trubkovitě baňkovitá, růžová, řídce ochlupená, dlouhá 0,9 - 1cm a široká 3 - 5mm. Plodem je černá bobule.

Vaccinium hutchinsonii

Vaccinium hybridum
synonyma: Rhodococcum hybridum

oblasti: SZ Rusko

Roste v Rusku.

Vaccinium idsuroei

Vaccinium igneum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 80cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, eliptické, tupé až mírně vykrojené, kožovité, holé, celokrajné, okraj mírně podvinutý, dlouhé 0,8 - 1,5cm, široké 4 - 7mm, báze tupá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé do 1,5mm. Květy se objevují v paždí listů, jsou převislé, mají 6 - 8mm stopky, korunu baňkovitou, červenou, uvnitř řídce ochlupenou, dlouhou 7 - 8mm a širokou 8mm.

Vaccinium imbricans

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky do 2m. Větve jsou převislé, v mládí žlutě plstnaté. Listy jsou střechovité, srdčité, ocasovité, v mládí červené, prakticky kožovité, holé, dlouhé 5 - 8,2cm, široké 2,5 - 4,2cm, spodní strana řídce dlouze ochlupená, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je přisedlý 1 - 5tičetný úžlabní hrozen, vřeteno má délku 3mm, vlastní květy mají 1,5cm stopky, korunu dlouze báňovitou, dlouhou 1,4cm a širokou 5mm.

Vaccinium impressinerve

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného řídce větveného poléhavého keře. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy vyrůstají po 1 - 2ks na koncích větví, jsou mírně vejčité, kožovité, holé, celokrajné, tupé nebo vykrojené, dlouhé 4 - 8cm, široké 2,5 - 4cm, na spodní straně přitiskle ochlupené, žilnatinu tvoří 4 páry žilek, báze klínovitá a prakticky přisedlá. Květenství je úžlabní, hroznovité, dlouhé 1 - 2cm, obvykle 3četné, listeny dlouhé 1cm, vlastní květy mají 1 - 1,7cm stopky, koruna růžová, zvonkovitá a dlouhá 1,2cm. Plodem je kulovitá bobule průměru 8mm.

Vaccinium inconspicuum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou v mládí hranaté a jemně ochlupené, mírně obvejčité, zaoblené nebo vykrojené, kožovité, v mládí ochlupené, celokrajné, dlouhé 0,9 - 3cm, široké 0,7 - 1,2cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je úžlabní, samostatné, vlastní květy mají stopky délky 0,8 - 1cm, listence jsou drobné, koruna baňkovitá, červená, dlouhá 6mm a široká 4mm.

Vaccinium indutum

synonyma: V. macgregorii, V. sorsogonense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře (může být i epifytem). Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve jsou na koncích ochlupené. Listy jsou řídké, mírně vejčité, ocasovité, kožovité, celokrajné, v mládí ochlupené, dlouhé 7 - 18cm, široké 4 - 7cm, báze zaoblená až mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Květenstvím je úžlabní ochlupený hrozen z 5 - 15ti květů, vřeteno je hranaté, dlouhé 3 - 9cm, vlastní květy mají 1 - 1,5cm, listen délky do 3cm, koruna je dlouze zvonkovitá, červená a dlouhá 1,5cm. Plodem je ochlupená bobule s průměrem 5mm.

Vaccinium ingens

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě řídkého vzpřímeného (i epifytního) keře. Dorůstá výšky do 2m. Listy jsou mírně obvejčité až prakticky okrouhlé, kožovité, holé, celokrajné nebo drobně zoubkované, dlouhé 5,5 - 15cm, široké 3,5 - 11cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek, spodní strana žláznatě tečkovaná a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,5cm. Květenství je hroznovité, 12 - 15tičetné, vřeteno dlouhé 1,5 - 3,5cm, vlastní květy mají 7 - 8mm stopky, korunu zvonkovitou, zelenkavou nebo narůžovělou a dlouhou 6 - 7mm. Plodem je modrozelená kulovitá bobule průměru 6 - 7mm.

Vaccinium insigne

synonyma: Neojunghuhnia insignis

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Větve jsou v mládí dlouze ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, v mládí ochlupené, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 3 - 5,5cm, široké 1,5 - 3,5cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je úžlabní 4 - 8mičetný hrozen délky 1cm, vlastní květy mají korunu dlouze baňkovitou a holou.

Vaccinium interius

synonyma: Polycodium interius, V. stamineum var. interius

Vaccinium iragaense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Vaccinium irigaense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 4 - 8m. Listy jsou mírně obkopinaté, ocasovité, kožovité, řídce žláznatě tečkované, lesklé, celokrajné, dlouhé 4,5 - 6cm, široké 1,5 - 3cm, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm. Květenství tvoří 3 - 4 bohaté hrozny, mají 5 - 6cm vřeteno, vlastní květy mají 5 - 7mm stopky, korunu červenou a dlouhou 7 - 8mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 6mm.

Vaccinium iteophyllum

synonyma: V. iteophyllum var. fragrans, V. iteophyllum var. iteophyllum

oblasti: J Čína, JV Čína, Vietnam, Xizang (Tibet)

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 7m. Větve jsou v mládí žláznatě rezavě ochlupené. Listy jsou řídké, ochlupené, celokrajné, špičaté, dlouze vejčité, kožovité, žláznatě ochlupené, dlouhé 4 - 13cm, široké 2 - 4cm, žilnatinu tvoří 6 - 9 žilek, báze kulatě klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, bohaté, dlouhé 4 - 6cm, listeny kopinaté, dlouhé 3 - 7mm, vlastní květy mají stopky délky 2 - 4mm, koruna je bílá nebo narůžovělá, dlouze baňkovitá a dlouhá 5 - 7mm. Plodem je mírně ochlupená bobule průměru 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. glandulosum - Xizang; mladé větve, řapíky a spodní centrální žebro žláznatě štětinaté
- var. iteophyllum/var. fragrans - mladé větve, řapíky a spodní centrální žebro ochlupené až plstnaté

Vaccinium jacobeanum

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru.

Vaccinium jagori

synonyma: V. angustilimbum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 7m. Listy jsou obvejčité, špičaté, kožovité, holé, lesklé, dlouhé 5 - 8cm, široké 1 - 4cm, spodní strana žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 2 - 3 žilky a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní 8 - 20tičetné hrozny, vřeteno je dlouhé 3 - 5cm, vlastní květy mívají převislou stopku délky 4 - 5mm, korunu dlouze baňkovitou, červenou (i bílou), dlouhou 0,8 - 1cm a širokou 4mm. Plodem je kulovitá černá bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium jagorii

synonyma: V. angustilimbum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Vaccinium japonicum (Brusnice japonská)

synonyma: Hugeria incisa, Hugeria japonica, Oxycoccoides japonica, Oxycoccus japonicus, V. japonicum f. incisum, V. japonicum var. japonicum

oblasti: J Čína, Japonsko, JV Čína, Korea, Tchaj-wan, V Čína

Roste v Číně, Japonsku a Koreji v podobě vzpřímeného opadavého vystoupavého keře. Dorůstá výšky 0,4 - 0,7 (i 2)m. Listy mohou být drobně ochlupené, zelené, holé (i ochlupené), mírně svrasklé, v mládí načervenalé, špičaté, vejčité, dlouhé (1,5 -) 2 - 6cm, široké 0,7 - 2cm, spodní strana je namodralá, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete samostatnými postranními květy na 5 - 8mm stopce, mají 0,5 - 1,5cm stopky, korunu bílou nebo růžovou s 0,8 - 1cm hlubokými laloky. Plodem je hruškovitá až kulovitá červená převislá bobule průměru 5 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. lasiostemon/Hugeria japonica var. lasiostemon/Hugeria lasiostemon/Hugeria randaiensis/Hugeria vaccinioides var. lasiostemon/Oxycoccus japonicas var. lasiostemon - Tchaj-wan; listy kopinaté, dlouhé 1,2 - 4,2cm, široké 0,5 - 1,5cm, spodní strana holá, báze tupě klínovitá
- var. sinicum/V. siccum/Agapetes vaccinioidesa/Hugeria japonica var. sinica/Hugeria sinica/Hugeria vaccinioides/Oxzcoccoides japonica var. sinica - výšky 0,4 - 2m; listy vejčité, jemně pilovité, dlouhé 1,5 - 6cm, široké 0,7 - 2cm; květy mají 5 - 8mm stopky, listence délky 2 - 4mm, koruna délky 0,8 - 1cm; plodem je červená bobule průměru 5mm

Vaccinium javanicum

Vaccinium jefense

synonyma: Symphysia jefensis

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě keře (i epifytiního). Dorůstá výšky do 2m. Borka praská v podélných pruzích. Větve mohou být ochlupené. Listy jsou kožovité, celokrajné, eliptické, špičaté, tmavězelené, dlouhé 4,5 - 13,5cm, široké 2,5 - 7cm, žilnatinu tvoří 3 páry žilek, spodní strana světeljší a řapíky jsou dlouhé 5 - 9mm. Květenství je zdánlivě terminální, hroznovité až chocholičnaté, 8 - 17tičetné, vřeteno dlouhé 1 - 1,5cm, květy mají 1,5cm stopky, listence dlouhé 5 - 8mm, kalich dlouhý 7 - 9mm, koruna válcovitá, dlouhá 1,1 - 1,2cm a široká 5,5 - 7,5mm.

Vaccinium jevidalianum

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Vaccinium jiuwanshanense

Vaccinium jubatum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Vaccinium kachinense

oblasti: Myanmar (Barma), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě stálezeleného řídkého keře. Dorůstá výšky 0,5 - 4m. Kořeny mají hlízky. Větve jsou hranaté. Listy jsou hustě seskupené na koncích větví, jsou kopinaté, kožovité, špičaté, mírně podvinuté, dlouhé 7 - 15 (i 17)cm, široké 2 - 5cm, žilnatinu tvoří 7 - 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 5mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 3 - 5cm, bohaté, vlastní květy mají 1 - 1,4cm stopky, koruna narůžovělá, baňkovitá a dlouhá 5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 6mm.

Vaccinium kemulense
synonyma: Rigiolepis endertii, V. endertii

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře (i epifytického). Dorůstá výšky do 4m. Větve jsou v mládí hranaté a krátce ochlupené. Listy jsou úzce vejčité, mírně ocasovité, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 8,5 - 16cm, široké 2 - 4,5cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, spodní strana přitiskle žláznatě ochlupená a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, převislé, 10 - 18tičetné, krátce stopkaté, vřeteno dlouhé 2,5 - 5cm, listeny dlouhé 2,5mm, vlastní květy mají 1,5 - 5mm stopky, 2 listence, korunu široce baňkovitou, zelenou až růžovočervenou, dlouhou 4mm a širokou 3mm. Plodem je kulovitá žlutá až oranžová bobule.

Vaccinium kengii

oblasti: JV Čína, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě nízkého stromu. Listy jsou řídké, úzce vejčité, kožovité, holé, jemně vroubkované, špičaté, dlouhé 6,5 - 6 (i 7)cm, široké 1,8 - 2,2cm, žilnatinu tvoří 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 8mm. Květenství je hroznovité, terminální, dlouhé 5 - 6mm, listeny dlouhé 6mm, jemně vroubkované, vlastní květy mají 7mm stopku, kališní laloky 3úhlé, špičaté, koruna zvonkovitá, dlouhá 5mm, široká 6mm, laloky zašpičatěl a dlouhé 3mm. Plodem je bobule.

Vaccinium keysseri

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 6m. Listy jsou řídké, dlouze obvejčité, špičaté, kožovité, holé, lesklé, mírně podvinuté, dlouhé 3 - 11cm, široké 1,6 - 8cm, spodní

strana řídce tečkovaná, žilnatinu tvoří 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1cm. Květenství je husté, 10 - 15tičetné, vřeteno dlouhé 1,5 - 4,5cm, vlastní květy mají stopky délky 1 - 2cm, koruna zvonkovitá, růžová a dlouhá 6 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. acutatum - listy užší, oboustranně žláznatě tečkované, dlouhé 4 - 7cm, široké 1,8 - 3cm
- var. keysseri

Vaccinium kingdon-wardii

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v podobě stálezeleného keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 2 - 3m. Listy vytvářejí zdánlivé 5 - 6tičetné přesleny, jsou eliptické, tupě zubaté, špičaté, dlouhé 4 - 8 (i 14)cm, široké 2 - 5cm, žilnatin tvoří min. 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, objevuje se po 1 - 3ks, dlouhé 5cm, bohaté, vlastní květy mají 2 - 3mm stopky, listence dlouhé 2 - 3mm, kališní laloky 3úhlé, dlouhé 1,5mm, koruna béžová až nazelenalá, trubkovitá, dlouhá 5mm a laloky jsou dlouhé 0,5mm. Plody jsou růžově fialové.

Vaccinium kjellbergii

synonyma: V. malaccense var. celebense

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě keře až stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, ocasovité, kožovité, řídce ochlupené, řídce vroubkované, dlouhé 3 - 8,5cm, široké 1,5 - 3,3cm, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1,1cm. Květenství je úžlabní, řídce 8 - 12tičetné, vřeteno je dlouhé 4,5 - 10cm, vlastní květy mají 0,6 - 1,2cm, listen je dlouhý 1 - 3cm, koruna je dlouze baňkovitá, bílá nebo narůžovělá. Plodem je kulovitá krátce ochlupená bobule průměru 5mm.

Vaccinium kjellhergii

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Vaccinium koreanum (Brusnice korejská)

synonyma: V. hirtum var. smallii

oblasti: Korea, Liaoning

Roste v Číně a Koreji v podobě opadavého keře. Listy jsou řídké, eliptické až mírně vejčité, bíle ochlupené, vroubkované, špičaté, dlouhé 3 - 6,5cm, široké 1,3 - 3cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2m. Květenství je terminální, hroznovité, 1 - 5tičetné, vlastní květy mají 4 - 6mm stopku, kalich má z části rozdělené 3úhlé laloky délky 1mm, koruna bělavá, zvonovitá a dlouhá 7 - 8mm. Plodem je červená eliptická 5tikomorová bobule délky 8 - 9mm a šířky 6 - 7mm.

Vaccinium korinchense

synonyma: V. dempoense, V. eugenioides, V. parvibaccatum

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře v podobě bohatě větveného keře (i epifytického). Dorůstá výšky 1 - 5m. Větve jsou v mládí hranaté a řídce ochlupené. Listy jsou eliptické, tupé, mírně kožovité, trochu zakřivené, celokrajné, v mládí ochlupené, dlouhé 1,2 - 4cm, široké 0,8 - 2cm, spodní strana řídce tečkovaná, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenstvím je 1 - 3 téměř terminální bohaté hrozny délky 2 - 8cm, vlastní květy mají 2mm stopky, listen dlouhý do 1,5cm, listence délky 2 - 5mm, koruna je dlouze baňkovitá, bílá, béžová, na špičkách růžová, dlouhá 0,5 - 1cm a široká 2 - 3mm. Plodem je kulovitá tmavě růžově fialová bobule průměru 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. korinchense
- var. losirense - listy husté, dlouhé 0,8 - 1,5cm, široké 4 - 7mm; koruna červená, úzce vejčitá, dlouhá 6mm, široká 2 - 3mm

Vaccinium korthalsii

synonyma: Agapetes coriacea, Arbutus coriacea, Epigynium coriaceum, Thibaudia coriacea, V. coriaceum

oblasti: Bali, Jáva, Sumatra

Roste na Sumatře, Jávě a Bali v podobě obvykle epifytického keře. Větve jsou v mládí převislé a lesklé. Listy jsou řídké, kopinaté, ocasovité, kožovité, v mládí červené, celokrajné, podvinuté, dlouhé 6 - 12cm, široké 2 - 6,5cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenství je jednostranně hroznovité, 6 - 8mičetné, krátce stopkaté, vřeteno je dlouhé 4 - 10cm, vlastní květy mají 1 - 2cm stopky, koruna je bílá až růžová, dlouhá 1,2cm a široká 5 - 6mm. Plodem je kulovitá žlutá nebo oranžová bobule průměru 1 - 1,3cm.

Vaccinium kostermansii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 0,5 - 6m. Větve jsou převislé, na vrcholu ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, v mládí oboustranně ochlupené, celokrajné, mírně podvinuté, matné, šedě zelené, dlouhé 2,5 - 5,5cm, široké 1 - 2,2cm, žilnatinu tvoří 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je úžlabní 2 - 8mičetný žláznatě ochlupený hrozen s 0,5 - 1cm vřetenem, vlastní květy mají délky 1 - 1,5cm, koruna je dlouze baňkovitá, červená až tmavě růžová a dlouhá 1cm.

Vaccinium kunthianum

synonyma: Polycodium knuthianum, Polycodium kunthianum

oblasti: SV Mexiko, V Mexiko

Roste v Mexiku.

Vaccinium laevigatum

Vaccinium lageniforme

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou holé. Listy jsou řídké, obvejčité, zaoblené, kožovité, holé, celokrajné, podvinuté, dlouhé6,5 - 7,5cm, široké 3 - 3,5cm a řapíky jsou dlouhé 6 - 7mm. Květenstvím je úžlabní řídký 3 - 5tičetný hrozen s vřetenem délky 0,7 - 1cm, vlastní květy mají 1cm stopky, korunu široce baňkovitou, červenou uvnitř, řídce ochlupenou a dlouhou i širokou 8mm.

Vaccinium lamarckii

Vaccinium lamellatum

oblasti: Ásám

Roste v Indii.

Vaccinium lamii

Vaccinium lamprophyllum

oblasti: Guangdong

Roste v Číně v podobě stálezeleného bohatě větveného keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou obvejčité, kožovité, lesklé, celokrajné, špičaté, dlouhé 2 - 3cm, široké 0,9 - 1,4cm, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 3 páry žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, chudé, dlouhé 1,2 - 2cm, vlastní květy mají 7mm stopky a opadávající korunu. Plodem je kulovitá holá bobule na 7mm stopce.

Vaccinium lanceifolium
synonyma: Rigiolepis lanceifolia

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, špičaté, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 3 - 8cm, široké 0,5 - 1,2cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je hustý úžlabní 3 - 8mičetný hrozen s 1cm vřetenem, vlastní květy mají 0,5mm stopky, korunu široce baňkovitou, 5tihrannou, ochlupenou a dlouhou 2,5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 3mm.

Vaccinium lanceolatum

Vaccinium langloisii
synonyma: Polycodium langloisii, V. langloisii

Vaccinium lanigerum

oblasti: Myanmar (Barma), Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě stálezeleného obvykle epifytického řídce větveného keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, celokrajné, na okraji zakřivené, ocasovité, dlouhé 8,5 - 11cm, široké 3 - 4,5cm, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je svazečkovité, 2 - 3četné, úžlabní, listeny jsou dlouhé 0,7 - 1cm, vlastní květy mají max. 1mm stopky, kališní lístky dlouhé 2 - 3mm, koruna je zeleně hnědá, prakticky zvonkovitá a dlouhá 7mm. Plodem je tmavě růžově fialová až červená bobule.

Vaccinium latifolium

oblasti: Karibik, Návětrné ostrovy, Venezuela

Roste ve Venezuele, Návětrných ostrovech, Trinidadu a Tobagu.

Vaccinium latissimum

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 15m. Větve jsou v mládí načervenalé. Listy jsou řídké, široce eliptické, tupě špičaté, prakticky kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, žláznatě tečkované, dlouhé 9 - 13cm, široké 5 - 10cm, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Květenstvím je úžlabní 8 - 15tičetný hrozen s 0,5 - 2cm vřetenem, vlastní květy mají 1,5mm stopky, korunu zvonkovitou, bílou až zeleně žlutobílou (i načervenalou), dlouhou 8mm a širokou 6 - 8mm. Plodem je kulovitá temná bobule průměru 1cm.

Vaccinium laurifolium

synonyma: Agapetes floribunda, Agapetes laurifolia, Epigynium floribundum, Epigynium laurifolium, Thibaudia floribunda, Thibaudia laurifolium

oblasti: Bali, Borneo, Jáva, Lombok, Sumatra

Roste na Sumatře, Borneu, Jávě a Malých Sundách v podobě keře (i epifytického) nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 12m při průměru kmene do 30cm. Větve jsou v mládí tmavěčervené. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, holé, lesklé, celokrajné, podvinuté, dlouhé 4 - 12cm, široké 2,3 - 7,5cm, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Květenstvím je úžlabní bohatý hrozen s vřetenem délky 3 - 9cm, vlastní stopky mají délku 0,4 - 1,5cm, koruna je dlouze baňkovitá, dužnatá, bílá až růžová, dlouhá 0,7 - 1cm a široká 2 - 3mm. Plodem je kulovitá tmavě růžovofialová či namodralá bobule průměru 5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. ellipticum/Agapetes elliptica/Epigznium javanicum/Gaylussacia elliptica/Thibaudia elliptica/V. ellipticum/V. javanicum/var. arborescens/V. tezsmannii - Sumatra, Jáva; květenství má kyjovitě hrbolaté hnědě ochlupené vřeteno i stopky květů, květy mají 2 - 5mm stopky a korunu délky 0,5 - 1cm
- var. glanduligerum - Sumatra, Borneo; na koncích kališních lístků je žláza
- var. laurifolium
- var. pensile/V. pensile - Sumatra; strom; listy obkopinaté, dlouhé 4 - 6cm, široké 1,3 - 1,8cm;

květenství holé, stopky květů dlouhé 2 - 3mm s řídkými kyjovitě žláznatými hrbolky, kališní laloky dlouhé 1mm, koruna bílá, vonná, dlouhá 5mm a široká 2mm
- var. robustum - Sumatra; listy více špičaté; květenství holé, robustnější, stopky dlouhé 1 - 3, bývají zakřivené, koruna dlouhá 6mm a široká 2,5 - 3mm
- var. sarawakense/V. ellipticum var. macrocalyx/V. hosei - Borneo; listy eliptické; vřeteno a stopky květů robustní, nahnědle žláznatě hrbolkatě ochlupené
- var. trichodes - Sumatra; listy eliptické, špičaté, dlouhé 10 - 15cm, široké 4 - 6cm; vřeteno a stopky květů hustě nežláznatě ochlupené, stopky květů dlouhé 1 - 3mm, kalich řídce ochlupený, koruna bílá, holá, dlouhá 8mm a široká 2,5mm

Vaccinium lautum
synonyma: Polycodium lautum

Vaccinium leonis

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Vaccinium leptanthum
synonyma: Agapetes leptantha, Rigiolepis leptantha, V. acuminatissimum f. leptanthum

oblasti: Borneo, Jáva, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově, Jávě a Borneu v podobě epifytického keře. Dorůstá délky do 50cm při průměru kmínku do 1,5cm. Větve jsou převislé, v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, kopinaté, dlouze špičaté, mírně srpovité, mírně kožovité, bledězelené, mírně lesklé, řídce přitiskle žláznatě ochlupené, celokrajné, dlouhé 4,5 - 11cm, široké 1,3 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 3 - 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenství je hroznovité (i párovité), 10 - 15tičetné, vřeteno je dlouhé 4 - 5,5cm, vlastní květy mají 4 - 6mm stopky, korunu široce baňkovitou a žlutou až béžovou. Plodem je široce vejčitá žlutá až žlutooranžová bobule průměru 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. ellipticum/Rigiolepis leptantha f. elliptica/V. var. ellipticum - Borneo; listy eliptické, špičaté, dlouhé 4,5 - 7,5cm, široké 1,6 - 2,6cm
- f. leptanthum
- f. malayanum - Malajský poloostrov; listy mírně vejčité, dlouhé 6 - 11cm, široké 2,5 - 4cm; vlastní květy mají 2 - 4mm stopky

Vaccinium leptocladum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě epifytického keře. Listy jsou dlouze obvejčité, tupé až zakulacené, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 0,7 - 1cm, široké 2,5 - 3mm, žilnatinu tvoří 2 - 3 žilky, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý úžlabní hrozen (může mít pouze 2 květy), vlastní květy mají stopky délky 4 - 6 (i 7)mm, kalich ochlupený, koruna baňkovitá, dlouhá 3,5 - 4mm, široká 2,5mm, červená a uvnitř u báze ochlupená.

Vaccinium leptomorphum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Větve mají délku do 1m a v mládí jsou ochlupené. Listy jsou husté, vejčité, ocasovité, kožovité, holé, celokrajné, podvinuté, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 0,7 - 1,4cm, spodní strana žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je samostatný nebo párovitý 2 - 3četný hrozen, vřeteno je dlouhé 0,5 - 1cm, vlastní květy mají 1,2 - 1,5cm stopky, korunu trubkovitou a růžově bílou. Plodem je kulovitá bobule průměru 3mm.

Vaccinium leptosepalum
synonyma: Polycodium leptosepalum

Vaccinium leptospermoides
synonyma: V. urnigerum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 0,2 - 2m. Větve jsou plazivé (i vzpřímené), na konci jemně ochlupené. Listy jsou obvejčité, kožovité, celokrajné, dlouhé 0,5 - 1,8cm, široké 2 - 6mm, spodní strana tmavě hnědě tečkovaná, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5mm. Kvete obvykle samostatnými (i párovitými) květy, listeny jsou dlouhé 1 - 2mm, stopky dlouhé 0,6 - 1cm, kalich může být načervenalý, krátce ochlupený, koruna široce baňkovitá, tmavě růžová až růžově červená, uvnitř ochlupená, dlouhá 5 - 7mm a široká 4 - 5mm Plodem je kulovitá červená bobule průměru 5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. glabrum - kalich je v dospělosti holý
- f. leptospermoides

Vaccinium leucanthum
synonyma: Metagonia schlechtendalii, V. micranthum, V. schlechtendalii

oblasti: Guatemala, Honduras, J Mexiko, JV Mexiko, JZ Mexiko, S Mexiko, Střední Mexiko, SV Mexiko, V Mexiko, Z Mexiko

Roste v Mexiku a Guatemale v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 4,5m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté až vejčité, špičaté až zaoblené, kožovité, ostře vroubkovité, zelené, bývají lesklé, dlouhé 2 - 4,5 (i 5)cm, široké 1,2 - 2,6cm, spodní strana světlá, mírně černě tečkovaná, báze je zaoblená a řapíky jsou krátké. Květenstvím je hrozen délky 3 - 6cm, listeny má 2, čárkovité, dlouhé 1,5 - 2,5mm, vlastní květy mají stopku délky 0,15 - 0,7 (i 1,2)cm, kalich má velikost 2,5 - 2,7mm, koruna 4 (i 5)tičetné, široce baňkovitá a dlouhá 3mm. Plodem je černá bobule velikosti 5mm.

Vaccinium leucobotrys
synonyma: Epigynium leucobotrys, V. serratum var. leucobotrys

oblasti: Ásám, Bhútán, Myanmar (Barma), V Himálaj, Yunnan

Roste od Číny po Indii v podobě stálezeleného keře, který může být i epifytický. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Větve jsou v mládí hnědě ochlupené. Listy vyrůstají ve 4 - 6tičetných přeslenech, listy jsou dlouze vejčité, holé, na okraji vroubkované, špičaté, dlouhé 3 - 7cm, široké 1,8 - 3cm, žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek a řapíky jsou zakrnělé. Květenství je hroznovité, dlouhé 2 - 3cm, listeny opadavé, dlouhé do 6mm, kališní laloky 3úhlé, dlouhé 1 - 1,3mm, vlastní květy mají 2 - 3mm stopky, 2 listence, korunu bílou až nazelenalou, baňkovitou a dlouhou 5mm. Plodem je zelenobílá až bílá kulovitá mírně zploštělá bobule průměru 5 - 7mm na 0,7 - 1,2cm stopce.

Vaccinium ligustrifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou eliptické, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 1,8 - 3,3cm, široké 0,8 - 1,6cm a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3,5mm. Květenství je úžlabní, 4četné, vřeteno dlouhé 7mm, vlastní květy mají stopky délky 5mm, korunu baňkovitou, uvnitř řídce ochlupenou, růžovou, dlouhou 7,5mm a širokou 3mm.

Vaccinium liparum

Vaccinium littoreum

synonyma: V. bancanum, V. hasseltii, V. hasseltii var. sabuletorum, V. sabuletorum, V. sabuletrum

oblasti: Jáva, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Jávě a Malajském poloostrově v podobě keře (i epifytického) nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 10m. Borka je tmavá. Listy jsou eliptické, ocasovité, kožovité, lesklé, celokrajné, podvinuté, dlouhé 3,5 - 7cm, široké 1,4 - 3,5cm, spodní strana žláznatě tečkovaná, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 3 - 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenstvím je úžlabní bohatý jednostranný hrozen, vřeteno je dlouhé 3 - 7cm, vlastní květy mají stopky délky 2,5 - 4mm, koruna je dlouze baňkovitá, červená až bílá, holá, dlouhá 7 - 8mm a široká 2,5mm. Plodem je kulovitá černá bobule průměru 6 - 7mm.

Vaccinium lobbii

synonyma: Rigiolepis lobbii

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě šplhavého nebo epifytického keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Větve jsou na koncích ochlupené. Listy jsou vejčité, otupělé, kožovité, holé, mírně lesklé, celokrajné, dlouhé 2 - 5cm, široké 1 - 2,5cm, spodní strana v mládí krátce ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 5 žilky a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství tvoří 2 - 5tičetný hrozen s až 5mm vřetenem, vlastní květy mají max. 1mm stopky, 2 listence, korunu baňkovitou, bílou, dlouhou 2,5mm a širokou 2mm. Plodem je široce vejčitá ochlupená bobule průměru 6 - 7mm.

Vaccinium longepedicellatum

synonyma: V. ardisioides

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, oboustranně zúžené, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 3 - 3,8cm, široké 0,8 - 1cm, spodní strana žláznatě tečkovaná a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je úžlabní řídký 10 - 15tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé 4 - 6cm, vlastní květy mají stopku délky 1,2 - 1,5cm, koruna je široce baňkovitá, holá, dlouhá 5 - 6mm a široká 3mm.

Vaccinium longicaudatum

synonyma: V. carlesii var. longicaudatum

oblasti: Guangdong, Guangxi, Hunan

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 1,5 - 4m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, jemně ochlupené, řídce pilovité, ocasovité, mírně kopinaté, kožovité, dlouhé 4,5 - 7cm, široké 1,8 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 6 párů žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 6 - 7mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 1,5 - 2cm, 10 - 15tičetné, vlastní květy mají 1 - 1,5mm stopky, kališní laloky 3úhlé, dlouhé 1mm, koruna bílá, trubkovitá a dlouhá 4 - 5mm. Plodem je červená kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium longipedicellatum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium longiporum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vzpřímeného řídkého keře. Dorůstá výšky 50 - 90cm. Listy jsou kopinaté, ocasovité, kožovité, holé, lesklé, celokrajné, podvinuté, dlouhé 5 - 7cm, široké 1,4 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 3mm. Květenství tvoří samostatný nebo párovitý řídký 5 - 10tičetný hrozen, vlastní květy jsou převislé, mají 4 - 7mm stopku, korunu dlouze baňkovitou, dlouhou 6 - 7mm, širokou 2,5mm a má světle růžovou barvu.

Vaccinium longisepalum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného epifytického keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, celokrajné, podvinuté, kožovité, v mládí ochlupené, dlouhé 1,8 - 3,1cm, široké 0,6 - 1,2cm, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek, báze je tupá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je úžlabní prakticky 3 - 6tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé 0,6 - 1,2cm, vlastní květy mají 6 - 8mm stopky, korunu trubkovitě baňkovitou, holou, tmavěčervenou, dlouhou 8 - 9mm a širokou 3mm.

Vaccinium loranthifolium

oblasti: Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově v podobě stromu. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou obvejčité, zaoblené, tuhé, kožovité, mírně ochlupené, celokrajné, dlouhé 4 - 6,5cm, široké 2,5 - 3,5cm, na spodní straně žláznatě tečkované, báze široce zúžená, žilnatinu tvoří 4 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenství tvoří 2 - 3 úžlabní vzpřímené 10 - 20tičetné hrozny, vlastní květy jsou převislé, vřeteno je dlouhé 3 - 6cm, vlastní květy mají 1,5 - 3mm stopky, listen délky do 7mm, koruna je baňkovitá, holá, dlouhá 6 - 7mm a široká 3 - 4mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium lorentzii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě obvykle epifytického keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou řídké, obvejčité, tupě zaoblené (i mírně vykrojené), kožovité, v mládí ochlupené, celokrajné, podvinuté, dlouhé 1,2 - 3,8cm, široké 0,8 - 1,6cm, báze řídce žláznatě tečkovaná a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Kvete samostatnými úžlabními květy, stopky jsou hrbolkaté, dlouhé 2 - 5mm, koruna je široce baňkovitá, žláznatě hrbolatá, červená, dlouhá 7 - 9mm a široká 5 - 6mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 3mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. lorentzii
- f. puberulum - stopky květů a kalich hustě ochlupený

Vaccinium lucidum

synonyma: Agapetes lucida, Epigynium lucidum, Glaphyria nitida, Thibaudia lucida, V. lucidum f. epiphyticum, V. lucidum f. terrestre, V. lucidum var. micranthum, V. lucidum var. typicum

oblasti: Jáva, Malé Sundy, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste na Sumatře, Jávě, Malých Sundách a Sulawesi v podobě bohatě větveného keře, obvykle epifytického. Dorůstá výšky 0,5 - 12m při průměru kmínku do 8cm. Větve jsou v mládí ochlupené a načervenalé. Listy jsou řídké, eliptické, zaoblené až špičaté, mírně kožovité, v mládí načervenalé, celokrajné, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 0,6 - 1,2cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, báze klínovitá a řapíky dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je prakticky terminální 6 - 10tičetný hrozen s 1,3 - 3cm vřetenem, vlastní květy mají stopky délky 0,4 - 1cm, listen délky 5 - 9mm, koruna dlouze baňkovitá, holá, bíle ochlupená, tmavě růžově fialová až červená, dlouhá 8 - 9mm a široká 3 - 5mm. Plodem je kulovitá tmavě modrá až růžově fialová bobule průměru 5 - 6mm, která může být i ochlupená. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. lucidum
- var. roseitinctum - květy mají korunu tmavě matně růžovou a hustě ochlupenou

Vaccinium lundellianum

synonyma: Malea pilosa, V. pilosum

oblasti: Guatemala, Honduras, JV Mexiko

Roste v Guatemale, Hondurasu a Mexiku v podobě epifytického (i šplhavého) keře. Povrch je bíle ochlupený. Listy jsou kopinaté, oboustranně tupé, krátce ochlupené, dlouhé 3 - 5,5cm, široké 1 -

2cm a řapíky jsou dlouhé 3- 6mm. Květenství je bohaté, vřeteno dlouhé 5mm, vlastní květy mají max. 8mm stopky a bílou korunu délky 0,8 - 1cm. Plodem je kulovitá krátce ochlupená bobule průměru 4mm.

Vaccinium luteynii

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě stromu. Dorůstá výšky 4m. Listy jsou vejčité, dlouhé 5 - 15cm a široké 3 - 6cm. Květenství je hroznovité, 10 - 13tikvěté, vřeteno dlouhé 1,5 - 4,5cm, listeny jsou dlouhé 1,2 - 2mm, vlastní květy mají 2 - 4cm stopku, kalich je dlouhý 4 - 4,2mm, trubka dlouhá 1mm, široká 4 - 4,5mm, koruna je 5tičetná, urnovitě zvonkovitá, dlouhá 1cm a široká 8mm.

Vaccinium luzoniense

oblasti: Luzon

Roste na Filipínách v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 4m. Větve jsou v mládí načervenalé a ochlupené. Listy jsou řídké, eliptické, špičaté, kožovité, mírně podvinuté, dlouhé 6 - 9cm, široké 2,5 - 4,5cm, spodní strana řídce žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 7mm. Květenstvím je úžlabní vzpřímený řídký hrozen délky 0,7 - 1cm, vřeteno je hranaté, vlastní květy mají stopky délky 0,8 - 1cm, koruna baňkovitá, holá, růžová až červená, dlouhá 7 - 8mm a široká 5mm. Plodem je kulovitá načernalá bobule průměru 8mm.

Vaccinium macbainii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 2 - 12m. Listy jsou husté, vejčité, tupé, kožovité, tuhé, lesklé, řídce vroubkované, dlouhé 2 - 4,5cm, široké 1,3 - 2,5cm, spodní strana žláznatě ochlupená, báze oblá až mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 7mm. Květenstvím je úžlabní bohatý hrozen s vřetenem délky 0,5 - 3cm, vlastní květy mají stopky, 2 listence délky 1 - 2cm, korunu zvonkovitou, 5tilaločnou v barvě růžové až růžovobílé a dlouhé 7 - 9mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium macgillivrayi

oblasti: Nová Kaledonie, Tichý oceán

Roste na Nové Kaledonii a Vanuatu.

Vaccinium macilentum

synonyma: Polycodium macilentum

Vaccinium macrocarpon (Klikva velkoplodá)

synonyma: Oxycoca berberidacea, Oxycoca macrocarpa, Oxycoccus macrocarpus, Oxycoccus palustris var. macrocarpos, Schollera macrocarpa, Schollera macrocarpos, V. oblongifolium, V.

propinquum

oblasti: Aljaška, Belgie, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Kalifornie, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York , Newfoundland, Nizozemí, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Tennessee , Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě v podobě stálezelené keře a zavlečená byla do Evropy. Plazivé větve jsou vystoupavé, dorůstají délky 1 - 2m a výšky 5 - 20cm. Listy jsou drobné, eliptické až podlouhlé, tmavě zelené, dlouhé 0,5 - 1,8cm a spodní strana je bělavá. Květenství je vrcholové, 2 - 6tikvěté, listeny zelené, dlouhé 2 - 4mm, široké 1 - 2mm, vlastní květy mají 1 - 3cm stopku, jsou 4četné, růžové nebo světle fialové. Plodem je jedlá červená bobule průměru 0,9 - 1,4cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Ben Lear'
- 'Early Black'
- 'Pilgrim'
- 'Stankavich'

Dobře ji vyhovuje prostředí rašeliniště.

Vaccinium madagascariense

synonyma: Agapetes madagascariense, V. dichotomum, V. emirnense, V. fasciculatum, V. forbesii, V. laevigatum, V. secundiflorum, V. suaveolens

oblasti: Madagaskar, Mosambik

Roste na Madagaskaru a v Mosambiku v podobě keře. Listy jsou střídavé, široce vejčité, špičaté, drobně zubaté, dlouhé 3 - 4,5cm, široké 2 - 2,7cm, báze je sbíhavá a řapíky jsou dlouhé 3 - 3,5mm. Květenstvím je úžlabní 3 - 5tikvětý hrozen, listeny jsou špičaté, dlouhé i široké 2mm, vlastní květy mají 3 - 3,5mm stopku, jsou 5tičetné, žluté až zeleně bílé, obkuželovité, dlouhé 8mm, široké 4 - 6mm, kališních lístků je 5, jsou široce 3úhlé, dlouhé 0,5mm, široké 1,5mm, koruna má laloky zašpičatělé a dlouhé 2,5 - 4mm. Plodem je bobule.

Vaccinium madanii

Vaccinium majusculum

Vaccinium malacothrix

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě šplhavého keře. Dorůstá výšky až 15m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, mírně vejčité, špičaté, v mládí červené, celokrajné, povinuté, dlouhé 2,5 - 4cm, široké 1 - 1,5cm, spodní strana je přitiskle ochlupená a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Kvete samostatnými nebo párovými květy na 1 - 1,5mm stopce, koruna je dlouze baňkovitá, narůžovělá až načervenalá a dlouhá 1,3cm. Plodem je kulovitá ochlupená bobule průměru 5mm.

Vaccinium maliauense

Vaccinium mandarinorum
synonyma: Lyonia bracteata, Pieris bracteata, Pieris esquirolii, Pieris esquirolii var. discolor, Pieris longicornuta, V. donianum var. austrosinense, V. donianum var. hangchouense, V. donianum var. laetum, V. hangchouense, V. laetum, V. laetum var. undulatum, V. mandarinorum var. austrosinense, V. mandarinorum var. laetum, V. mandarinorum var. mandarinorum, V. parvibracteatum, V. parvibracteum

oblasti: J Čína, JV Čína

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 4 (i 7)m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, vejčité, kožovité, holé, zubaté, špičaté, dlouhé 3 - 9cm, široké 1,5 - 3,5cm, báze klínovitá až oblá, žilnatinu tvoří 5 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 2,5 - 10cm, listeny vejčité, dlouhé 0,2 - 1,5cm, vlastní květy mají 2 - 8mm stopky, listeny délky 1 - 4mm, kališní lístky jsou stočené, dlouhé 0,5 - 1,5mm, koruna bílá nebo narůžovělá, dlouze baňkovitá a dlouhá 5 - 7mm. Plodem je tmavě růžově fialová holá bobule průměru 4 - 7mm.

Vaccinium manipurense
synonyma: Agapetes manipurensis

oblasti: Ásám, V Himálaj

Roste v Indii a východním Himálaji.

Vaccinium marginellum

Vaccinium marianum

oblasti: Jižní Karolína, Maryland, New York, Severní Karolína, Virginie

Roste v USA.

Vaccinium mathewsii
synonyma: Thibaudia serrata, V. serratum

oblasti: Peru

Roste v Peru. Větve jsou drobně ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, pilovité, v mládí jemně ochlupené, dlouhé 1,5 - 2,5cm a široké 0,9 - 1,7cm. Květenstvím je úžlabní hrozen, vlastní květy mají 1cm stopky, korunua 5tizubá, baňkovitá a dlouhá 8mm.

Vaccinium matudae
synonyma: V. matudai

oblasti: Guatemala, Mexiko

Roste v Guatemale a Mexiku v podobě keře, který může být i epifytem. Větve jsou v mládí řídce ochlupené. Listy jsou tuhé, kožovité, lesklé, holé, vejčité, řídce vroubkovaněpilovité až prakticky celokrajné, dlouhé 3 - 8cm, široké 2,5 - 5cm, báze je mělce srdčitá a téměř přisedlá. Květenství je hroznovité, bohaté, dlouhé do 10cm, vlastní květy mají bílou nebo narůžovělou korunu délky7 - 8mm s 5ti laloky. Plodem je bobule průměru 5mm.

Vaccinium megalophyes

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky do 13m při průměru kmene do 25cm. Borka je hnědá a hladká. Listy jsou řídké, eliptické, zašpičatělé, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 5 - 10cm, široké 2,5 - 4cm, na spodní straně řídce žláznatě tečkované, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenství je řídké, 10 - 15tičetné, vřeteno má délku 1,5 - 3cm, vlastní květy mají 0,8 - 1,1cm stopky, korunu dlouze baňkovitou, růžovou nebo bílou, dlouhou 0,8 - 1cm a širokou 3 - 4mm. Plodem je zploštělá tmavě červená bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium megaphyllum

synonyma: Rigiolepis macrophylla, V. macrophyllum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 20 - 30cm, široké 6 - 9cm, na spodní straně žláznatě ochlupené, báze zakulacená, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Květy nejsou známé. Plodenství je úžlabní, svazčité, až 15tičetné, vřeteno dlouhé 3 - 3,5cm, stopky dlouhé 4 - 5mm, vlastní plody jsou kulovité, řídce ochlupené a v průměru mají 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. adenophorum - listy podlouhlé, na vrcholu dloužeji ocasovité, dlouhé 12 - 19cm, široké 4 - 6cm
- var. megaphyllum

Vaccinium melanocarpum (Brusnice černoplodá)

oblasti: JV USA, SV USA, V Kanada, V USA

Roste na východě Severní Ameriky v podobě rozložitého řidšího keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou bíle ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, dlouhé 3 - 10cm a spodní strana bývá bíle plstnatá. Květenství tvoří postranní hrozen, vlastní květy jsou zvonkovité, bílé až nazelenalé, dlouhé 6mm, 5ticípé a bíle plstnaté. Plodem je červenofialová jedlá bobule průměru 0,8 - 1cm.

Vaccinium melliflorum

Vaccinium membranaceum (Brusnice blanitá)

synonyma: V. coccinium, V. globulare, V. macrophyllum, V. membranaceum var. membranaceum, V. membranaceum var. rigidum, V. myrtilloides

oblasti: Alberta, Arizona, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Michigan, Minnesota, Montana, Ontario, Oregon, Severozápadní Teritorium, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Roste v USA a Kanadě v alpinském pásmu v podobě rozložitého opadavého keře. Dorůstá výšky (0,2 -) 0,3 - 1 (i 3)m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou střídavé, tuhé, mírně obvejčité či obvejčité, tlusté, řídce drobně pilovité, oboustranně špičaté, zelené, dlouhé 2,5 - 5 (i 6)cm, široké 1,1 - 2,3cm, spodní strana je namodralá a řapíky jsou krátké. Kvete samostatnými baňkovitými narůžovělými nebo nazelenalými květy, kalich je zelený, zašpičatěle laločnatý, koruna kulatá až urnovitá, dlouhá 3 - 5mm a široká 5 - 7mm. Plodem je černá nebo načervenalá kulovitá bobule průměru 0,9 - 1,3cm a obsahuje semena délky 1mm.

Vaccinium meridionale

synonyma: Metagonia meridionalis, V. caracasanum

oblasti: Jamajka, Kolumbie, Venezuela

Roste ve Venezuele, Kolumbii a zavlečená byla na Jamajku.

Vaccinium microcarpum (Klikva maloplodá)

synonyma: Oxycoccus microcarpus, Oxycoccus microcarpus f. bulboidaeus, Oxycoccus microcarpus f. elongatus, Oxycoccus microcarpus var. kirigaminensis, Oxycoccus palustris var. pusillus, Oxycoccus pusillus, Oxycoccus quadripetalus subsp. microcarpus, V. microcarpum, V. oxycoccos subsp. microcarpum, V. oxycoccus subsp. microcarpum

oblasti: Alberta, Aljaška, Bělorusko, Britská Kolumbie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mongolsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, S Čína, Sachalin, Severozápadní Teritorium, SV Čína, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie

Roste od Islandu a Velké Británie přes Evropu a Asii až po Kanadu v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou hustější, vejčité až eliptické, špičaté, kožovité, ochlupené, dlouhé 2 - 6mm, široké 1 - 2 (i 3)mm a báze zakulacená. Kvete po 1 - 2 (i 3)ks růžově červenými 4četnými květy na tenkých stopkách délky 1,5 - 2,5cm, listeny jsou vejčité, dlouhé 1mm, koruna má laloky podlouhlé, dlouhé 5mm a dělené téměř k bázi. Plodem je kulatá růžově červená 4komorová bobule o velikosti kolem 6mm. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovují ji vyvýšená sušší místa v rašeliništích.

Vaccinium microphyllum

synonyma: Gaultheria blumei, V. mindorense, V. mindoroense

oblasti: Filipíny, Melanésie, Tichý oceán

Roste na Nových Hebridách, Filipínách a Moluckých ostrovech v podobě keře, obvykle epifytického. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou eliptické, oboustranně zaoblené, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 0,6 - 2cm, široké 0,4 - 1,2cm, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek, konec bývá občas trochu vykrojený a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete samostatnými úžlabními květy, listeny jsou dlouhé do 1,5mm, vlastní květy mají 5 - 7mm stopky, koruna je baňkovitá, červená, žlutá nebo až bílá, dlouhá 4 - 6mm a široká 3 - 4mm. Plodem je vejčitá růžově fialová až

namodralá bobule průměru 3 - 4mm.

Vaccinium minarum

oblasti: Guatemala

Roste v Guatemale v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Větve jsou v mládí načervenalé a ochlupené. Listy jsou kožovité, eliptické, řídce drobně vroubkované, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 0,8 - 1,5cm, báze špičatá až klínovitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je úžlabní chudý hrozen, vlastní květy mají stopky délky 3 - 7mm, koruna je tmavěrůžová, dlouhá 6mm a široká 2mm.

Vaccinium minimiflorum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 3 - 4cm, široké 1 - 1,5cm, spodní strana žláznatě tečovaná, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 2,5 - 3cm, vlastní květy mají 1,5 - 2mm stopky, korunu baňkovitou a světlezelenou.

Vaccinium minus

synonyma: Rhodococcum minus, V. vitis-idaea subsp. minus, V. vitis-idaea var. minus

Vaccinium minusculum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromovitého keře. Dorůstá výšky 3m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou dlouze vejčité, špičaté, kožovité, lesklé, holé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 1,2 - 1,5cm, široké 4 - 8mm, báze je zúžená a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenství je hroznovité, řídké, 3 - 5tičetné, v počtu 2 - 3ks, vřeteno má délku 0,5 - 1cm, vlastní květy mají stopku délky 0,6 - 1cm, koruna je široce baňkovitá a růžově bílá.

Vaccinium minuticalcaratum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 16m. Větve jsou hranaté a holé. Listy jsou eliptické, téměř ocasovité, kožovité, mírně lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 3,8 - 9,5cm, široké 1,7 - 5cm, žilnatinu tvoří 7 - 9 žilek s 3 - 4mi páry, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenstvím je 2 - 4 úžlabních hroznů z 10 - 15ti květů, vlastní květy jsou převislé, vřeteno dlouhé 2 - 3cm, vlastní květy mají 5 - 7mm stopky, korunu zvonkovitou, dlouhou 7 - 9mm, uvnitř ochlupenou, červenou, růžovou a nebo bílou. Existují vnitrodruhové taxony:

- f. glabrum/f. latifolium - kališní trubka holá
- f. minuticalcaratum

Vaccinium miquelii
synonyma: V. dempoense, V. forbesii

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 6m. Větve jsou v mládí hranaté a krátce ochlupené. Listy jsou eliptické, tupě špičaté, kožovité, holé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 1 - 2cm, široké 4 - 8mm, spodní strana řídce nahnědle tečkovaná, báze zaoblená, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé do 1mm. Květenstvím je úžlabní 10 - 20tičetný hrozen, má vřeteno délky 2 - 10cm, vlastní květy mají laloky délky 1,5 - 2mm, baňkovitou červenou korunu délky 5 - 7mm a šířky do 3mm. Plodem je kulovitá ochlupená tmavě modročerná bobule průměru 4 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. athjehense - nízký až plazivý keř; listy dlouhé 0,7 - 1cm, široké 4 - 8mm; koruna dlouze baňkovitá, dlouhá 4 - 5mm, široká 2,5mm, uvnitř ochlupená
- var. miquelii

Vaccinium missouriense
synonyma: V. vacillans var. missouriense

Vaccinium mjoebergii

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě epifytického a občas i šplhavého keře. Listy jsou mírně obvejčité, tupé, kožovité, celokrajné, podvinuté, dlouhé 5 - 7,2cm, široké 2 - 3,2cm, spodní strana žláznatě hrbolatá, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 4mm. Květenstvím je úžlabní hrozen vyrůstající po 2 - 4ks, jsou 15 - 25tičetné, vřeteno dlouhé 3 - 3,5cm, vlastní květy mají 1,5mm stopky a korunu baňkovitou, dlouhou 4 - 5mm a širokou 2mm.

Vaccinium modestum

oblasti: Ásám, Myanmar (Barma), V Himálaj, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně nebo Indii v podobě plazivého keře. Dorůstá výšky 5 - 10 (i 15)cm. Listy jsou řídké, vejčité až obvejčité, celokrajné, zaoblené (i hrotité), dlouhé 1,3 - 4cm, široké 4 - 9mm, báze klínovitá až špičatá, žilnatinu tvoří 2 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé do 2mm. Květe po 1 - 3ks, mají 2 - 4mm stopky, listeny dlouhé 3 - 4,5mm, kališní laloky jsou široce 3úhlé až kulaté, dlouhé 1 - 1,5mm, koruna je narůžovělá až hnědě červená, soudkovitá a dlouhá 4 - 6mm. Plodem je tmavě růžově fialová ojíněná 5tikomorová bobule průměru 1cm.

Vaccinium molle

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě řídkého keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3 (i 5)m. Povrch je v mládí žlutě sametový. Listy jsou vejčité, přišpičatělé, přisedlé, kožovité, tmavězelené, v mládí plstnaté, celokrajné, dlouhé 1,5 - 4cm, široké 0,7 - 2,7cm, báze srdčitá, spodní strana vytrvale ochlupená,

žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenství tvoří 1 - 4 úžlabní jednostranné hrozny s 8 - 20ti květy, vřetenem délky 2 - 6cm, vlastní květy mají 0,4 - 1cm, koruna je zvonkovitá, béžová až nazelenalá, dlouhá 5 - 6mm a široká 3mm. Plodem je kulovitá růžově fialová bobule průměru 5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. molle
- var. mollissimum/V. mollissimum - hustý téměř vzpřímený keř; výška 1 - 3m; listy husté, vejčité, báze uťatá; koruna dlouze zvonkovitá, dlouhá 4 - 5mm, široká 2 - 2,5mm

Vaccinium mollissimum

Vaccinium monanthum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve jsou v mládí jemně plstnaté. Listy jsou kopinaté, ocasovité, mírně zakřivené, otupělé, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 3 - 5,5cm, široké 0,8 - 1,5cm, na spodní straně na centrálním žebru ochlupené a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete samostatnými nebo párovitými květy na 3mm stopce, koruna široce baňkovitá, bílá až růžová a dlouhá 2mm. Plodem je kulovitá oranžovožlutá bobule průměru 4mm.

Vaccinium monetarium

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru.

Vaccinium monteverdense

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice jako epifyt. Dorůstá délky do 1,5m. Listy jsou vejčitě kopinaté, zašpičatělé, dlouhé (2,4 -) 3,4 - 5,2 (i 6,3)cm, široké (0,8 -) 1,2 - 2 (i 2,7)cm a řapíky dlouhé 4 - 8mm. Květenství je hroznovité, 7 - 9 (i 13)tikvěté, vřeteno dlouhé 2 - 3 (i 4,7)cm, listeny dlouhé 0,8 - 1,5mm, listeny dlouhé 0,8 - 1,5mm, vlastní květy mají 1,4 - 1,9cm stopku, kalich je dlouhý 1 - 1,6cm, trubka 4,5 - 8,5mm, laloky dlouhé 2,5 - 3,5mm, koruna je zelená, dlouhá 1,3 - 1,8cm. Plodem je kulatá bobule o průměru do 8mm.

Vaccinium montis-ericae

oblasti: Nová Guinea, Západní Papua

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky do 4m. Listy jsou obvejčité, přišpičatělé, kožovité, tuhé, lesklé, holé, podvinuté, celokrajné, dlouhé 4,5 - 5,5cm, široké 2 - 3cm, báze klínovitá, spodní strana řídce žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 4mm. Květenství je prakticky terminální, vzpřímené, bohaté, vřeteno dlouhé 8 - 10cm, vlastní květy mají 5 - 7mm stopky, korunu baňkovitou a bledě červenou.

Vaccinium morobense

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium motuoense

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu.

Vaccinium moultonii

synonyma: Rigiolepis moultonii, V. borneense

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře nebo stromu. Listy jsou vejčité, ocasovité, prakticky kožovité, lesklé, holé, celokrajné, dlouhé 10 - 15cm, široké 4 - 7cm, báze zúžená, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Hrozny jsou samostatné nebo párovité, úžlabní, řídké, 8 - 12tičetné, vřeteno dlouhé 4 - 5cm, vlastní květy mají stopku délky 2 - 4mm, koruna je baňkovitá, světle béžová nebo nazelenalá, dlouhá 3 - 4mm a široká 2,5mm.

Vaccinium moupinense

synonyma: V. sikangense

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě stálezeleného epifytického hustého keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1,2m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou seskupené k sobě, na konci vykrajované, eliptické kožovité, vrásčité, ochlupené, podvinuté, dlouhé 0,7 - 1,7cm, široké 4 - 8mm, žilnatinu tvoří 3 páry žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je červeně hnědý hrozen délky 1,5 - 3cm, vlastní květy mají 3 - 4mm stopky, kališní laloky jsou široce 3úhlé, dlouhé 1mm, koruna baňkovitá, růžová, červená nebo až hnědá a dlouhá 4 - 5mm. Plodem je černě červená bobule průměru 6mm.

Vaccinium muriculatum

synonyma: V. muriculatum var. albidum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 5m. Listy jsou řídké, kopinaté, ocasovité, kožovité, tmavězelené, v mládí hnědočervené, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 4 - 10cm, široké 1,2 - 3,5cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství tvoří 2 - 4 úžlabní hrozny s 3 - 6,5cm vřetenem, vlastní květy mají stopky délky 3 - 6mm, koruna růžová, bílá nebo nazelenalá, dlouhá 6 - 7mm a široká 2,5 - 3,5mm. Plodem je zploštěle kulovitá bobule průměru 6mm.

Vaccinium myodianum

oblasti: V Himálaj

Roste ve východním Himálaji.

Vaccinium myrsinites
synonyma: Cyanococcus myrsinites, V. nitidum

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Roste v USA v podobě stálezeleného poléhavého keře. Dorůstá výšky 0,1 - 0,5 (i 1)m. Větve bývají v mládí ochlupené. Listy jsou mírně obvejčité, asymetricky žláznatě pilovité, holé, tmavě zelené, dlouhé 5 - 9mm, široké 3 - 5mm, na spodní straně bledší a žláznatě ochlupené. Květenstvím je terminální či úžlabní svazeček, vlastní květy mají kalich růžově bílý, později zelený, koruna vejčitá až baňkovitá, bílá nebo růžová a dlouhá 4 - 8mm. Plodem je modře černá kulovitá bobule průměru 7 - 9mm obsahující 4 - 13 semen velikosti 1mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. glaucum - povrch holý; listy i plody namodralé

Vaccinium myrsinoides
synonyma: V. collivagum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 1,2m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou bohaté, obvejčité, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 0,8 - 1,3cm, široké 3 - 7mm, na spodní straně řídce přitiskle žláznatě ochlupené, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete v úžlabí samostatnými prakticky přisedlými květy s korunou dlouze baňkovitou, dužnatou, tmavě červenou až červenou, dlouhou 5 - 6mm a širokou 2,5mm.

Vaccinium myrtilloides (Brusnice kanadská)
synonyma: Cyanococcus canadensis, V. angustifolium var. myrtilloides, V. canadense, V. myrtilloides f. myrtilloides

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, New Hampshire, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Saskatchewan, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě v podobě opadavého rozložitého asymetrického keře. Dorůstá výšky (0,1 -) 0,2 - 0,5 (i 1,15)m. Větve jsou hranaté a ochlupené. Listy jsou kožovité, kopinaté až eliptické, špičaté, celokrajné, jemně ochlupené, zelené, dlouhé (1,5 -) 2,3 - 3,5 (i 4)cm a široké 0,8 - 1,6cm. Kvete bílými zvonkově tvarovanými nazelenalými až načervenalými trubkovitě zvonkovitými až urnovitými květy délky (3 -) 4 - 5 (i 6)mm se špičatými cípy. Plodem je sladká tmavě modrá ojíněná bobule průměru 6 - 8mm obsahující 10 - 40 semen.

Vaccinium myrtillus (Borůvka černá)

synonyma: Myrtillus niger, Myrtillus nigra, Myrtillus sylvaticus, Myrtillus uliginosus var. microphylla, V. angulosum, V. myrtillum, V. myrtillus subsp. oreophilum, V. myrtillus var. oreophilum, V. oreophilum, Vitis-idaea myrtillus

oblasti: Albánie, Alberta, Altaj, Alžírsko, Anglie, Apeniny, Arizona, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Gruzie, Idaho, Irsko, Island, J Rusko, Japonsko, Jugoslávie, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Kolorado, Korsika, Laponsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Montana, Německo, Nevada, Nizozemí, Norsko, Nové Mexiko, Oregon, Polsko, Portugalsko, Pyreneje, Rakousko, Řecko, Rumunsko, S Mongolsko, Sajany, Skotsko, Slovensko, Střední Rusko, SV Evropa, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Utah, V Karpaty, Wales, Washington, Wyoming, Z Čína, Z Rusko, Zakavkazsko

Roste v Evropě, severní Asii, Grónsku, západní Kanadě a na západě USA. Patří mezi opadavé nepravidelné řidší keře. Dorůstá výšky 0,2 - 0,4 (i 1,2)m. Pod zemí vytváří dřevnatějící kořenující výběžky. Stonek je přímý nebo vystoupavý, zelený, 3hranný a bohatě větvený. Listy jsou holé, okrouhle vejčité až vejčitě kopinaté špičaté, drobně pilovité, dlouhé 1 - 3cm, široké 0,6 - 1,9cm, báze zakulacená až klínovitá, žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5mm. Kvete samostatnými nebo párovitými bílými nebo narůžovělými převislými květy v paždí listů na 3 - 6mm stopkách, koruna má kulovitě baňkovitý tvar s krátkými nazpět ohnutými cípy, je bílá a načervenalá, dlouhá 3 - 6mm, cípy jsou krátké, zpětně ohnuté, kalich zelený a má 8 - 10 tyčinek. Plodem je modře černá (i bělavá, červená nebo nazelenalá) ojíněná kulovitá bobule o průměru 0,5 - 0,7 (i 1)cm, dužina je modře fialová. Využívá se v lidovém léčitelství. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. alpinum - drobné okrouhlé listy
- 'Leucocarpum'/f. leucocarpa - plody špinavě bílé
- var. nanum - nízké keříky; listy drobné, kulaté
- subsp. oreophilum/V. oreophilum - západ USA a jihozápadní Kanada
- var. turfosum - ekotyp

Vyhovují ji smíšené nebo jehličnaté lesy, rašeliniště, atp. s kyselou půdou, najde se i na pasekách, chudých skalách, okrajích rašelinišť, atp. Pro růst vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost a mykorhizu, kvůli které se ve běžné zahradě s velkou pravděpodobnosti neujme.

Vaccinium myrtoides

synonyma: Agapetes myrtoidea, Agapetes myrtoides, Epigynium myrtoideum, Thibaudia myrtoides, V. microphyllum, V. myrtoides var. celebicum, V. varingiaefolium, V. villarii

oblasti: Filipíny, Melanésie, Sulawesi (Celebes), Sumatra

Roste na Filipínách, Sumatře a Moluckých ostrovech v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 0,3 - 2m. Větve jsou v mládí krátce ochlupené. Listy jsou husté, téměř střechovité, vejčité až eliptické, přišpičatělé, kožovité, dlouhé 1,3 - 2,5cm, široké 0,6 - 1,8cm, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek, spodní strana řídce žláznatě tečkovaná, báze kulatá až mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé do 1,5mm. Květenstvím je úžlabní řídký 4 - 12tičetný hrozen s vřetenem délky 1 - 4cm, vlastní květy mají stopku délky 0,5 - 1,4cm, koruna je dlouze baňkovitá, červená až bílá či béžová, dlouhá 4 - 5mm a široká 2,5mm. Plodem je kulovitá černě modrá bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium nagamasu

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Vaccinium nagurae

Vaccinium napoense

oblasti: JV Čína

Roste v Číně.

Vaccinium neglectum

Vaccinium neilgherrense
synonyma: Epigynium neilgherense

oblasti: Indie

Roste v Indii.

Vaccinium nhatrangense

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Vaccinium nitens

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 7m při průměru kmene 15cm. Listy jsou mírně obvejčité, tupě špičaté, kožovité, lesklé, celokrajné, podvinuté, dlouhé 4 - 7cm, široké 2,5 - 4cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství je úžlabní řídký mnohokvětý hrozen, vlastní květy mají 5 - 7mm stopky, koruna dlouze baňkovitá, bílá, dlouhá 6 - 7mm a široká 2,5mm.

Vaccinium nubigenum

oblasti: Newfoundland, Quebec

Roste v Kanadě.

Vaccinium nummularia
synonyma: V. nummularia var. oblongifolium

oblasti: Bhútán, JZ Čína, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, V Himálaj, Z Čína

Roste v Indii, Číně, Nepálu, Myanmaru a Bhútánu v podobě stálezeleného bohatě větveného (i epifytického) keře. Dorůstá výšky (30 -) 50 - 70cm. Větve jsou převislé a v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, kožovité, mírně svrasklé, drobně pilovité, podvinuté, oboustranně zaoblené, dlouhé 1 - 2,3cm, široké 0,7 - 1,2cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenstvím je postranní hrozen délky 0,6 - 1,5cm, vlastní květy mají 6 - 7mm stopky, korunu bílou, na vrcholu narůžovělou, baňkovitou, dlouhou 5 - 6mm. Plodem je černá až tmavě růžově fialová široce vejčitá bobule délky 6mm.

Vaccinium nuttallii

oblasti: Myanmar (Barma), V Himálaj

Roste ve východním Himálaji a Myanmaru.

Vaccinium obatapaquiniorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium obedii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium oblongifolium
synonyma: V. oxycoccos var. oblongifolium

Vaccinium obversum

Vaccinium oldhamii (Brusnice Oldhamova)
synonyma: V. ciliatum

oblasti: Japonsko, Korea, V Čína

Roste v Japonsku, Koreji a Číně v podobě hustě větveného polokulovitého opadavého keře. Dorůstá výšky 1 - 3m. Větve jsou žláznatě ochlupené. Listy jsou řídké, vejčité až obvejčité, přitiskle ochlupené, špičaté, dlouhé 2,5 - 8cm, široké 1,2 - 4,5cm, žilnatinu tvoří (5 -) 7 - 8 párů žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenstvím je úžlabní ochlupený 1 - 17tičetný hrozen délky 3 - 6cm, listeny jsou vejčitě kopinaté až čárkovité, dlouhé 2,5 - 7mm, vlastní květy mají 1 - 4mm stopky, korunu zvonkovitou, narůžovělou nebo žlutě zelenou a dlouhou 3 - 5mm a laloky jsou dlouhé 0,5mm. Plodem je kulovitá tmavě růžově fialová až černá bobule průměru 0,7 - 1cm.

Vaccinium oliganthum
synonyma: Polycodium oliganthum

Vaccinium omeiense

oblasti: Guangxi, Guizhou, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného (i epifytického) keře. Dorůstá výšky 0,3 - 4m. Větve jsou bohaté, v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou eliptické, kožovité, v mládí jemně ochlupené, podvinuté, špičaté, dlouhé 1,4 - 3,5cm, široké 0,8 - 1,4cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, dlouhé 2,5 - 3cm, vlastní květy mají 2 - 3mm stopky, korunu červenou nebo narůžovofialovělou, baňkovitou, dlouhou 4 - 5mm, laloky jsou stočené a dlouhé 0,6mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium omeiensis

Vaccinium onimense

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium oranjense
synonyma: V. buxoides, V. disterigmoides

oblasti: Nová Guinea, Západní Papua

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického (i pozemního) keře. Dorůstá velikosti 30cm. Větve jsou plazivé a občas i kořeňující, v mládí ochlupené a hustě olistěné. Listy jsou eliptické, zaoblené i mírně vykrojené, kožovité, tuhé, v mládí ochlupené, celokrajné, podvinuté, dlouhé 0,8 - 2,2cm, široké 0,5 - 1,2cm, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3mm. Kvete samostatnými úžlabními převislými květy na 6 - 9mm stopce, koruna je široce baňkovitá, červená až narůžovělá (i zelenavá), dlouhá 0,6 - 1cm a široká 5 - 6mm. Plodem je kulovitá modrá bobule průměru 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. marginellum/V. marginellum - kalich srstnatě ochlupený; listy dlouhé 1 - 2cm a široké 0,6 - 1cm
- var. oranjense

Vaccinium oreites

oblasti: Nová Guinea, Západní Papua

Roste na Nové Guineji v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 4m. Větve jsou převislé, v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, prakticky kožovité, v mládí ochlupené, celokrajné, podvinuté, dlouhé 2,5 - 3,3cm, široké 0,8 - 1,4cm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů nervů a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenstvím je 6 - 8mičetný hrozen s 1 - 1,5cm vřetenem, vlastní květy mají 0,8 - 1cm stopky, korunu dlouze baňkovitou, sivě růžovou až červenou a dlouhou 8 - 9mm. Plodem je kulovitá

modře černá bobule průměru 5mm.

Vaccinium oreogenes

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru.

Vaccinium oreomyrtus
synonyma: V. luridum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guinei v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou na koncích ochlupené a žláznatě hrbolaté. Listy jsou mírně vejčité, špičaté, kožovité, celokrajné, podvinuté, dlouhé 0,6 - 1,2cm, široké 3 - 5mm, spodní strana žláznatě ochlupená a řapíky jsou dlouhé 2mm. Kvete samostatnými úžlabními květy na 6 - 8mm stopce, koruna je baňkovitá, červená, dlouhá 7 - 8mm a široká 4 - 5mm.

Vaccinium orientale

Vaccinium orosiense
synonyma: Symphysia orosiensis

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Kostarice a Panamě v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou v mládí šedě zelené až narůžověle fialové. Listy jsou dlouze vejčité, kožovité, špičaté, celokrajné, dlouhé (2 -) 4 - 9 (i 14)cm, široké (1,5 -) 3 - 5 (i 7)cm, báze srdčitá, objímavá, žilnatinu tvoří 5 - 7 (i 9) žilek. Květenství je úžlabní, hroznovitě okoličnaté, vřeteno má délku 1 - 1,5cm, listeny jsou dlouhé 0,8 - 1,5mm, vlastní květy jsou 5tičetné, mají 1,5 - 2,5mm stopky, kališní laloky jsou 3úhlé, špičaté, dlouhé 0,8 - 1,2mm, korunu dlouze baňkovitou, žlutě zelenou, nahnědlou, dlouhou 5 - 8mm a širokou 5 - 7mm.

Vaccinium ortizii

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě epifytického keře. Větve mají délku 0,5 - 1,2m. Listy jsou střídavé, eliptické až kopinaté, dlouhé 3,2 - 4,8cm, široké 0,8 - 1,5cm, báze je sbíhavá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je 1 - 4květé, vlastní květy jsou přisedlé, 4četné, kalich obkuželovitý, dlouhý 1,5 - 2mm, lem vzpřímený, dlouhý 0,5mm, laloky dlouhé 0,8 - 1mm, široké 1,3 - 1,5mm, koruna bílá až nazelenalá, dlouhá 1,5 - 2mm, průměru 2mm. Plodem je modře černá kulovitá bobule průměru 4mm.

Vaccinium oscarlopezianum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách.

Vaccinium otophyllum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou střechovité, vejčité, špičaté, prakticky přisedlé, kožovité, holé, mírně lesklé, celokrajné, dlouhé 6 - 8cm, široké 3,5 - 4,5cm, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek, spodní strana jemně plstnatá, báze srdčitá, ouškatá, objímavá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je úžlabní 4 - 12tičetný hrozen s 1 - 4cm vřetenem, vlastní květy mají 1 - 1,5cm stopky, korunu široce baňkovitou, dlouhou 5 - 6mm a širokou 6 - 7mm.

Vaccinium ovalifolium (Brusnice vejčitolistá)

synonyma: V. alaskaense, V. axillare, V. chamissonis, V. oblatum

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Labrador, Michigan, Montana, Newfoundland, Nové Skotsko, Ontario, Oregon, Quebec, Severozápadní Teritorium, Washington, Yukon

Pochází z pobřeží jižní Aljašky a Aleutských ostrovů. Roste v podobě opadavého řídkého keře. Dorůstá výšky (0,3 -) 1,5 - 3 (i 4)m. Větve jsou vystoupavé, v mládí hranaté. Listy jsou eliptické až vejčité, přišpičatělé, mohou být pilovité, kožovité, světle zelené, dlouhé 2,5 - 3,9 (i 5)cm, široké 1,6 - 2cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete samostatnými růžovými úžlabními květy na 0,4 - 1,2cm stopce, kalich je světle zelený, koruna je vejčitě baňkovitá až kulatá, růžová až bronzově růžová a dlouhá 4 - 9mm. Plodem je kulovitá tmavě modrá až šedě modrá ojíněná kyselá bobule velikosti 1cm a obsahuje semena délky 1mm.

Vaccinium ovatum

synonyma: Metagonia ovata, Metagonia pyxothamnus, V. lanceolatum, V. ovatum var. ovatum, V. prunifolium

oblasti: Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste v USA a Kanadě v podobě stálezeleného vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve jsou v mládí ochlupené a červené. Listy jsou střídavé, vejčité, špičaté, pilovité, lesklé, zelené, řídce ochlupené, dlouhé 2,1 - 2,9cm, široké 0,8 - 1,2cm, báze je klínovitá, může být i mírně srdčitá. Kvete samostatnými květy v úžlabních hroznech, koruna je bílá, načervenalá, mírně zvonkovitá a dlouhá 3 - 5mm. Plodem je černá jedlá bobule průměru 0,6 - 0,8 (i 1)cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Thunderbird' - výška 1 - 4m; listy jsou v mládí růžově bronzové
- 'Wunderlich' - výška do 2,4m; listy kožovité, oválné, lesklé; květy drobné, bílé; plodem je černá bobule

Vaccinium oxycoccos (Klikva bahenní)

synonyma: Oxycoca vulgaris, Oxycoccus europaeus, Oxycoccus gigas, Oxycoccus intermedius, Oxycoccus ovalifolius, Oxycoccus oxycoccos, Oxycoccus palustris, Oxycoccus quadripetalus,

Oxycoccus vulgaris, Schollera europaea, Schollera oxycoccos, Schollera oxycoccus, Schollera paludosa, Schollera palustris, V. oxycoccos f. oxycoccos, V. oxycoccos subsp. microphyllum, V. oxycoccos var. intermedium, V. oxycoccos var. oxycoccos, V. palustre

oblasti: Alberta, Aljaška, Anglie, Belgie, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Idaho, Illinois, Indiana, Irsko, Itálie, J Rusko, Jugoslávie, JV Rusko, JZ Rusko, Labrador, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts , Michigan, Minnesota, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rakousko, Rhode Island, Rumunsko, Sachalin, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Skotsko, Slovensko, Střední Rusko, Střední Sibiř, SV Rusko, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, V Rusko, Vermont, Virginie, Wales, Washington, Wisconsin, Yukon, Z Rusko, Z Sibiř, Západní Virginie

Pochází z mírného pásma severní polokoule. Roste v podobě poléhavého plazivého dřevnatějícího keříku. Výška dosahuje 1 - 6 (i 10)cm a délka 0,1 - 0,3 (i 80)cm. Listy jsou drobné, lesklé, tmavě zelené, vejčitě kopinaté, zašpičatělé, podvinuté, dlouhé 0,3 - 1cm a široké 1 - 5mm. Kvete růžovými květy po 1 - 4ks na koncích 2 - 4cm stopek. Plodem je jedlá červená bobule obsahující velké množství vitamínu C. Konzumujeme je až když projdou mrazem. Patří k ohroženým druhům C3.

Vyhovují ji rašeliniště a jiné mokré kyselé půdy.

Vaccinium pachydermum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 6m při průměru kmene do 20cm. Větve jsou v mládí hranaté a jemně ochlupené. Listy jsou eliptické, tupě špičaté, celokrajné, kožovité, tuhé, u báze zakřivené, dlouhé 3 - 15cm, široké 2,5 - 10cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květenstvím je úžlabní hrozen vyrůstající po 2 - 3ks, vřeteno je dlouhé 4 - 9cm, vlastní květy mají stopky délky 0,6 - 1,2cm, koruna je dlouze baňkovitá, růžová nebo bílá, dlouhá 8 - 9mm a široká 3 - 6mm. Plodem je zploštělá modrá bobule průměru 6 - 7mm.

Vaccinium paddywoodsii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium padifolium
synonyma: V. maderense

oblasti: Makaronésie

Roste na Madeiře v podobě stálezeleného (občas pouze v zimě zeleného) hustého keře až stromu. Dorůstá výšky 2m nebo i více. Větve jsou v mládí načervenalé a ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, špičaté či kulaté, dlouhé 2,5 - 5cm a báze je srdčitá nebo klínovitá. Kvete v úžlabních hroznech s délkou 2,5 - 5cm, vlastní květy jsou žluté, červeně pruhované, zvonkovité s 5ti zpětně zahnutými cípy a dlouhé 1cm. Plodem je kulovitá černá bobule průměru 1,2cm.

Vaccinium pahalae

Vaccinium palawanense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě stromu nebo keře (může být i epifytem). Dorůstá výšky do 6m. Větve jsou v mládí hranaté, řídce ochlupené a žláznatě hrbolaté. Listy jsou mírně obkopinaté, tupě přišpičatělé, kožovité, holé, celokrajné, podvinuté, na spodní straně žláznatě tečkované, dlouhé 4 - 7cm, široké 1,5 - 3cm a řapíky jsou dlouhé 2 - 6mm. Květenstvím je řídce 6 - 14tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé 3,5 - 4,5cm, vlastní květy mají 4 - 8mm stopky, korunu trubkovitou, dlouhou 6 - 8mm, širokou 2,5mm a barvu bílou až červenou. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. foxworthii/V. foxworthii - listy dlouhé 2,5 - 4,5cm, široké 1 - 1,5cm; květy s trubkou jsou hustě nažloutle ochlupené
- var. palawanense

Vaccinium pallidum (Brusnice bledá)

synonyma: Cyanococcus liparis, Cyanococcus liparus, Cyanococcus pallidus, Cyanococcus subcordatus, Cyanococcus tallapusae, Cyanococcus vacillans, V. altomontanum, V. corymbosum var. pallidum, V. liparum, V. missouriense, V. pennsylvanicum, V. subcordatum, V. tallapusae, V. torreyanum, V. vacillans, V. vacillans var. crinitum, V. vacillans var. missouriense, V. vacillans var. vacillans, V. viride

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA a Kanadě v podobě hustého opadavého keře v pravidelném polokulovitém habitu. Dorůstá výšky 0,2 - 0,8 (i 1)m. Větve mohou být v mládí ochlupené a žlutozelené. Listy jsou mírně vejčité až široce eliptické, špičaté, zelené, drobně pilovité, brvité a dlouhé (2,5 -) 3 - 4 (i 5,5)cm a široké 1,3 - 2,2cm. Květenstvím je hustý svazeček, vlastní květy jsou krátce trubkovité, bílé nebo zelenobílé s růžovými skvrnami, dlouhé (0,4 -) 0,5 - 0,8 (i 1)m. Plodem je modrá ojíněná bobule průměru (4 -) 6 - 8mm.

Vaccinium paludicolum

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou bohaté, vejčité, špičaté nebo tupé, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 0,6 - 1,2cm, široké 4 - 8cm, báze zakulacená a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenstvím je úžlabní 5 - 10tičetný jednostranný hrozen, vřeteno je dlouhé 1 - 3cm, vlastní květy mají 3mm stopky, korunu tmavěčervenou, dlouze lahvovitou, dlouhou 7 - 8mm a širokou 2mm.

Vaccinium palustre

Vaccinium papillatum
synonyma: Agapetes poilanei

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stálezeleného obvykle epifytického keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou husté, eliptické, kožovité, holé, podvinuté, celokrajné, tupé až vykrojené, dlouhé 1,5 - 2,6cm, široké 0,9 - 1,2cm, báze klínovitá a řapíky dlouhé 2mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, 3 - 6tičetné, dlouhé 1,5 - 2,5cm, listeny jsou vejčité, dlouhé 2mm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopky, kališní laloky 3úhlé, dlouhé 1,5 - 2,1mm, koruna růžově fialově červená až růžová, zvonkovitá, dlouhá 4,5 - 6mm a laloky dlouhé 1,5mm. Plodem je ojíněná kulovitá bobule průměru 5mm mající 1,3cm stopku.

Vaccinium papulosum

oblasti: V Himálaj, Xizang (Tibet)

Roste v Číně v podobě stálezeleného řidšího keře. Dorůstá výšky 1m. Listy jsou řídké, kosočtvercovité až kopinaté, mírně kožovité, holé, řídce tupě zubaté, špičaté, dlouhé 12 - 18,5cm, široké 3,5 - 9cm, žilnatinu tvoří 8 - 14 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 6mm. Květenstvím je úžlabní, hroznovité, bohaté, jednostranné, dlouhé 2 - 3,5cm, vlastní květy mají stopky délky 6 - 7mm, koruna je žlutá, baňkovitá a dlouhá 5mm.

Vaccinium paradisearum
synonyma: V. profusum, V. psittacobium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 5m. Větve jsou v mládí načervenalé a jemně ochlupené. Listy jsou husté, dlouze vejčité, ocasovité, kožovité, žláznatě ochlupené, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 2,5- 7cm, široké 0,7 - 2,5cm, báze 5tižilná a řapíky jsou dlouhé 4 - 7mm. Květenstvím je bohatý hrozen, vřeteno je dlouhé 2 - 9cm, vlastní květy mají 0,5 - 1,2cm stopky, koruna je růžově fialová až bílá, dlouhá 1 - 1,3cm a široká 2 - 4mm. Plodem je modrá kulovitá bobule průměru 6 - 7mm.

Vaccinium parvibaccatum

Vaccinium parvifolium (Brusnice drobnolistá)

oblasti: Aljaška, Britská Kolumbie, Kalifornie, Oregon, Washington

Roste v USA a Kanadě v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky (1 -) 1,5 - 7m. Větve jsou v mládí holé a hranaté. Listy jsou eliptické až vejčité, dlouhé (1 -) 1,3 - 2,5 (i 3,5)cm, široké (0,5 -) 0,8 - 1,5cm a báze je kulatá. Kvete nažloutlými, zelenavými nebo narůžovělými samostatnými květy o šířce 6mm na převislých stopkách, kalich je světle zelený, široce vejčitý, 5tilaločný, velikosti 0,4 - 0,6mm, koruna je kulovitá až urnovitá, voskovitá, dlouhá 4 - 6mm a široká 3 - 5mm. Plodem je jedlá červená nebo modrá bobule průměru 0,5 - 1 (i 1,2)cm.

Vyhovují ji pobřežní oblasti.

Vaccinium parvulifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě hustého epifytického keře. Větve jsou v mládí mírně hranaté a jemně ochlupené. Listy jsou široce obvejčité, zaoblené, kožovité, holé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 4 - 8mm, široké 3 - 5mm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2mm. Kvete samostatnými převislými květy na 2mm stopce, koruna je baňkovitá, béžová, dlouhá 4mm a široká 2,5mm. Plodem je široce vejčitá bobule průměru 3mm.

Vaccinium parvum
synonyma: Polycodium parvum

Vaccinium paucicrenatum

oblasti: Myanmar (Barma), V Himálaj

Roste v Myanmaru a východním Himálaji.

Vaccinium peleanum

Vaccinium penaeoides

Vaccinium pensile

Vaccinium perakense

Vaccinium perrigidum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou mírně zploštělé. Listy jsou eliptické, ocasovité, tuhé, kožovité, lesklé, tmavě zelené, celokrajné, podvinuté, dlouhé 7 - 10cm, široké 3 - 6cm, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenství tvoří 1 - 2 úžlabní prakticky vzpřímené 8 - 12tičetné hrozny s vřetenem délky 5 - 8cm, vlastní květy korunu baňkovitou, bílou, délky 0,9 - 1,2cm a šířky 4mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 9mm.

Vaccinium petelotii
synonyma: Agapetes parviflora

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stálezeleného vzpřímeného či šplhavého (i epifytického) řídkého keře. Dorůstá výšky 2 - 5m. Listy jsou řídké, dlouze vejčité, kožovité, mírně ocasovité, dlouhé 14 - 21cm, široké 4,5 - 8,5cm, báze kulatá až mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 9 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 6mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 3cm, 6 - 7mikvěté, vlastní květy mají kališní laloky 3úhle vejčité, dlouhé 3mm a béžovou zvonkovitou korunu délky 0,6 - 1,1cm. Plodem je tmavě červená kulovitá bobule průměru 6 - 9mm na 1,5 - 2cm stopce.

Vaccinium philippinense (Brusnice filipínská)

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 5m. Listy jsou eliptické, ocasovité, kožovité, holé, mírně lesklé, mírně podvinuté, celokrajné, dlouhé 5 - 10cm, široké 2,5 - 5cm, báze klínovitá a řapíky dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství tvoří 1 - 3 vzpřímené hrozny, vřeteno je dlouhé 6 - 12cm, vlastní květy mají zakřivené stopky délky 0,6 - 1,2cm, korunu široce baňkovitou, dlouhou 5 - 6mm a širokou 4 - 5mm. Plodem je kulovitá holá tmavá bobule průměru 5mm.

Vaccinium phillippsiae

synonyma: V. bancanum var. kemulense

oblasti: Borneo

Roste na Borneu.

Vaccinium phillyreoides

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře, který může být šplhavý nebo epifytický. Konce větví jsou hranaté a jemně ochlupené. Listy jsou kopinaté, ocasovité, kožovité, řídce jemně žláznatě hrbolaté, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 2,2 - 3,5cm, široké 0,5 - 1cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství tvoří úžlabní 6 - 10tičetný hrozen s vřetenem délky 1,5 - 3cm, vlastní květy mají stopky délky 5 - 7mm, koruna je červená, dlouhá 8 - 9mm a široká 2,5mm. Plodem je kulovitá krátce ochlupená bobule průměru 5mm.

Vaccinium piceifolium

synonyma: V. crassiflorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky až 50cm. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou bohaté, kožovité, holé, lesklé, dlouhé 0,7 - 1,2cm, široké 2 - 3mm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé do 1mm. Kvete samostatnými převislými květy na 5 - 7mm stopkách, koruna je baňkovitá, uvnitř ochlupená, červená, dlouhá 6mm a široká 4mm.

Vaccinium pilosilobum

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě šplhavého keře. Listy jsou řídké, vejčité, ocasovité, kožovité, holé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 5 - 10cm, široké 2,5 - 5cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, báze je mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,1cm. Květenstvím je úžlabní 5 - 10tičetný hrozen s vřetenem délky 0,4 - 3cm, vlastní květy mají stopky délky 0,8 - 1,2cm, koruna je trubkovitá, dlouhá 2,5 - 3cm a široká 4 - 7mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium piperifolium

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky 3m. Listy jsou eliptické, ocasovité, kožovité, celokrajné, podvinuté, dlouhé 20 - 27cm, široké 6 - 9cm, žilnatinu tvoří 7 žilek se 2mi páry a řapíky jsou dlouhé 5 - 6mm. Květenstvím je úžlabní 10tičetný hrozen, vlastní květy mají stopku délky 2 - 3mm, koruna je baňkovitá a dlouhá 3mm.

Vaccinium pipolyi

oblasti: S Brazílie, SZ Brazílie

Roste v Brazílii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Listy jsou vejčité, kožovité, tupé, celokrajné, dlouhé 0,8 - 1,9cm, široké 0,5 - 1,8cm, báze kulatá i mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství je téměř terminální, hroznovité, 10 - 20tičetné, vřeteno dlouhé 1,5 - 3 (i 5)cm, vlastní květy mají 3 - 4mm stopky, korunu bílou, válcovitou a dlouhou 4mm. Plodem je růžově fialová bobule průměru 6 - 8mm.

Vaccinium platyphyllum

synonyma: V. ilocanum, V. rizalense

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře nebo stromu. Větve jsou v mládí červeně hnědé a mírně hranaté. Listy jsou řídké, eliptické, tupě špičaté, kožovité, tuhé, celokrajné, dlouhé 6 - 14cm, široké 3 - 7cm, báze zúžená, spodní strana tmavě hnědě tečkovaná a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenství je úžlabní, hroznovité, bohaté, má 4 - 8cm vřeteno, vlastní květy mají 3 - 7mm stopky, korunu baňkovitou, červenou až růžově fialovou, dlouhou 5 - 6mm a širokou 3 - 4mm.

Vaccinium poasanum

synonyma: Symphysia poasana

oblasti: Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador

Roste ve střední Americe v podobě keře (může být i epifytický) nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 10m. Listy jsou vejčité až kopinaté, kožovité, oboustranně špičaté, celokrajné, mírně podvinuté, žláznatě hřebílkaté, dlouhé 3 - 10cm, široké 1 - 6cm a řapíky jsou dlouhé 1 - 4mm. Květenstvím je úžlabní hrozen délky 2 - 4cm, vřeteno je dlouhé 0,5 - 2cm, vlastní květy mají 0,7 - 1,5cm stopky, koruna je válcovitá, nažloutlá až nazelenalá, dlouhá 0,8 - 1,2cm a široká 0,6 - 1cm. Plodem je žlutá až růžově fialová kulovitá bobule průměru 0,7 - 1cm.

Vaccinium podocarpoideum

oblasti: Guangxi, Hunan

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 40 - 90cm. Listy jsou husté, úzce kopinaté, kožovité, holé, mírně podvinuté, špičaté, dlouhé 2,5 - 3,2cm, široké 3 - 8mm, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a báze je klínovitá a řapíky dlouhé 1,5mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, dlouhé 4 - 5cm, vlastní květy mají 6 - 8mm stopky, kališní laloky jsou 3úhlé a dlouhé 1,5 - 2mm. Plodem je kulovitá ojíněná bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium polyanthum

Vaccinium praeces

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru.

Vaccinium praestans (Brusnice honosná)

oblasti: Chabarovsko, Kamčatka, S Japonsko, Sachalin

Roste na Dálném východě, Kurilských ostrovech a Sachalinu v podobě opadavého rozložitého nepravidelného keře. Dorůstá výšky 15cm. Listy se objevují na koncích sterilních větví obvykle po 3ks, jsou mírně obvejčité, tupé nebo špičaté, holé, jemně pilovité, dlouhé 2 - 6cm, široké 2,5 - 3,5cm, báze zúžená a řapíky jsou dlouhé 0,4 - 1cm. Na fertilních větvích se vytváří zpravidla 1 obvejčitý list délky 2 - 2,5cm, šířky 1 - 1,5cm. Květy vyrůstají po 1 - 3ks, koruna je bílá, nažloutlá nebo růžová a dlouhá 4 - 6mm. Plodem je červená sladkokyselá kulovitá bobule průměru 0,8 - 1,2cm.

Vyhovuje ji polostín, propustná lehká až středně těžká písčitá až hlinitá půda s dostatkem živin s kyselým pH 4,5 - 6.

Vaccinium pratense

oblasti: Guangdong

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Větve jsou hranaté a hustě ochlupené. Listy jsou řídké, ochlupené, eliptické, špičaté, mírně podvinuté, kožovité, dlouhé 2,4 - 3,6cm, široké 1,3 - 2cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství je hroznovité, 5 - 10tičetné, dlouhé 4,5 - 6,5cm, vlastní květy mají 4 - 6mm stopky, koruna je růžově fialově červená, zvonkovitá a dlouhá 6 - 7mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 4mm.

Vaccinium prostratum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě rozložitého polokeře. Dorůstá výšky 30 - 60cm. Listy jsou husté, v mládí ochlupené, kopinaté, špičaté, kožovité, tmavězelené, drobně zubaté, mírně lesklé, dlouhé 0,7 - 1cm, široké 3mm, báze zúžená a řapíky dlouhé 1mm. Kvete samostatnými květy na 3 - 4mm stopce, koruna je baňkovitá, bílá nebo růžová a dlouhá 2,5 - 3mm.

Vaccinium psammogenes

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě šplhavého keře nebo liány. Listy jsou eliptické, špičaté nebo tupé, kožovité, lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 4,5 - 6cm, široké 2,3 - 3cm, žilnatinu tvoří 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 6mm. Květenství tvoří 4 - 6 úžlabních řídkých 10 - 15tičetných hroznů, vřeteno je dlouhé 3 - 5cm, vlastní květy mají stopku délky 5 - 7mm, koruna je baňkovitá, bílá, dlouhá 6mm a široká 2mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium pseudobullatum

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře, který může být i šplhavý. Dorůstá výšky 3m. Listy jsou řídké, mírně vejčité, kožovité, krátce ocasovité, prakticky holé, dlouhé 11 - 18cm, široké 5 - 9cm, žilnatinu tvoří 8 - 12 párů žilek, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 6 - 8mm. Květenství je hroznovité, 6 - 10tičetné, dlouhé 1,5 - 3cm, listeny obvejčitě lžičkovité, dlouhé 1 - 1,2cm, vlastní květy mají 4 - 7mm stopky, kališní laloky 3úhle kopinaté, dlouhé 4 - 6mm, koruna zvonkovitá, bílá až růžová, dlouhá 0,8 - 1cm, laloky vejčitě 3úhlé a dlouhé 2,5 - 4mm. Plodem je kulovitá bobule.

Vaccinium pseudocaracasanum

oblasti: Peru

Roste v Peru. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou dlouze vejčité, zašpičatělé, kožovité, holé, jemně pilovité, dlouhé 2 - 3,5cm, široké 1 - 2cm, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je 10 - 15tičetný hrozen délky 2,5 - 6cm, koruna je baňkovitá a dlouhá 5 - 6mm.

Vaccinium pseudocaudatum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 4m při průměru kmene 5cm. Listy jsou řídké, ocasovité, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 5 - 8cm, široké 1,5 - 2,5cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1cm. Květenstvím je úžlabní hrozen vyrůstající v počtu 5 - 12ks, je 10 - 15tičetný, vlastní květy mají 3 - 5mm stopky, korunu baňkovitou, bílou, dlouhou 6 - 7mm a širokou 2,5mm.

Vaccinium pseudodialypetalum

oblasti: Malajsie, Malajský poloostrov

Roste v Malajsii.

Vaccinium pseudonanum

Vaccinium pseudopubicalyx

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu.

Vaccinium pseudorobustum

oblasti: Guangdong, Guangxi

Roste v Číně v podobě stálezeleného řídce větveného keře nebo stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, eliptické, kožovité, žláznatě ochlupené, ocasovité, dlouhé 5 - 8 (i 10)cm, široké 3 - 4 (i 5)cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 3 - 5cm, více než 10tičetné, kališní laloky 3úhlé, dlouhé 2mm, koruna je zeleně bílá, zvonkovitá, dlouhá 7mm, laloky 3úhlé a dlouhé 2,5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium pseudospadiceum

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stálezeleného řídkého keře. Dorůstá výšky 2m. Listy jsou vejčité až srdčité, kožovité, zašpičatělé, dlouhé 8 - 12cm, široké 3,5 - 5,5cm, báze srdčitá až zašpičatělá, žilnatinu tvoří 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenství je hroznovité, 3 - 8mičetné, vyrůstá po 1 - 3ks, má délku 3,5 - 8cm, vlastní květy mají 5 - 8mm stopky, kališní laloky 3úhlé, dlouhé 2 - 4mm, koruna je nazelenalá, široce zvonkovitá a dlouhá 5,5cm. Plody nejsou známé.

Vaccinium pseudotonkinense

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stálezeleného epifytického keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, mírně obvejčité, kožovité, celokrajné, podvinuté, oboustranně ochlupené, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 0,8 - 1,1cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete samostatnými nebo párovými květy na 4mm stopce, listeny jsou vejčité, dlouhé 2mm, kališní laloky jsou 3úhle kopinaté, dlouhé 2mm, koruna je zeleně hnědá a dlouhá 5 - 7mm. Plodem je žlutě zelená až růžová kulovitá bobule průměru 7mm.

Vaccinium pterocalyx

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele v podobě epifytického keře. Listy jsou kožovité, vejčité, špičaté, celokrajné, podvinuté, dlouhé 10 - 17cm, široké 3 - 10cm a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Květenství je úžlabní, hroznovité, max. 15tičetné, vřeteno má délku 4 - 10cm, vlastní květy mají 2,2cm stopku, korunu válcovitou, bílou a dlouhou 5,3mm.

Vaccinium puberulum

synonyma: Eurygania subcrenulata, Thibaudia subcrenulata, V. puberulum var. puberulum, V. puberulum var. subcrenulatum, V. subcrenulatum

oblasti: Guyana, S Brazílie, SZ Brazílie, Venezuela

Roste ve Venezuele, Guyaně a Brazílii v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky do 4m. Některé plody jsou jedovaté. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. cardonae/V. cardonae - Venezuela; výška 3m; listy jsou vroubkovaně pilovité, mírně kopinaté
- var. hitchchockii - Venezuela; výška 1,5 - 4m; kalich a semeníky holé; plody jedovaté
- var. jauaense - Venezuela; listy eliptické, dlouhé 1,5 - 3,5cm
- var. puberulum - Venezuela, Guyana, Brazílie; výška 0,5 - 4m; řapíky a květy ochlupené; listy vroubkovaně pilovité, mírně vejčité
- var. spathulatum - Venezuela; výška 1 - 2,5m; povrch holý; listy úzce lopatkovité; semeníky ochlupené
- var. subcrenulatum - Venezuela, Guyana; výška 0,5 - 3,5m; povrch holý; listy mírně obvejčité, dlouhé 3 - 11cm, oboustranně špičaté
- var. tepuiense - Venezuela, Guyana; výška 1 - 4m; povrch ochlupený; listy bývají celokrajné

Vaccinium pubicalyx

synonyma: V. pubicalyx var. pubicalyx, V. spicigerum

oblasti: Guizhou, Myanmar (Barma), Sichuan, Yunnan

Roste v Číně a Myanmaru v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou řídké, plstnaté, vejčité až kopinaté, jemně pilovité, ocasovité, mírně kožovité, řídce ochlupené, dlouhé 2 - 6cm, široké 0,7 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, dlouhé 1 - 4cm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopky, kališní laloky 3úhlé, dlouhé 0,8 - 1,2mm, koruna je bílá nebo narůžovělá, trubkovitá až mírně urnovitá a dlouhá 5mm. Plodem je tmavě růžově fialová bobule průměru 5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. anomalum - Yunnan; listy na spodní straně kolem centrální žilky tečkované
- var. leucocalyx/Pieris esquirolii var. leucocalyx - Guizhou; listy na spodní straně plstnaté spolu s kalichem
- var. pubicalyx/V. spicigerum/Myrica mairei - Čína, Myanmar; listy na obou stranách kolem centrální žilky ochlupené, kalich ochlupený

Vaccinium pubicarpum

Vaccinium pugionifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Větve jsou na konci ochlupené. Listy jsou dlouze kopinaté, zašpičatělé, kožovité, holé, dlouhé 0,6 - 1,1cm, široké 2mm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1mm. Kvete samostatnými převislými úžlabními květy na 5 - 7mm stopce, koruna je široce baňkovitá, růžová, dlouhá 6mm a široká 4mm.

Vaccinium pullei
synonyma: V. hatamense

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného zpravidla pozemního keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou dlouze obvejčité, bývají mírně vykrojené, holé, kožovité, celokrajné, dlouhé 1,4 - 3cm, široké 0,7 - 1,4cm, báze klínovitá, spodní strana hrbolatě žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 2- 4mm. Květenství je úžlabní, prakticky přisedlé, vlastní květy mají stopky délky 1 - 2mm, korunu široce baňkovitou, červenou až bílou, dlouhou 5mm a širokou 4- 5mm. Plodem je modře černá kulovitá bobule.

Vaccinium pumilum

oblasti: Myanmar (Barma)

Roste v Myanmaru.

Vaccinium puxophyllum

Vaccinium pyriforme

Vaccinium quercinum
synonyma: Polycodium quercinum

Vaccinium quinquefidum
synonyma: V. nycteroides

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromu nebo hustého keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou husté, vejčité, prakticky ocasovité, tupě špičaté, kožovité, tuhé, částečně ochlupené, celokrajné, mohou být podvinuté, dlouhé 1,5 - 2,7cm, široké 0,6 - 1cm, spodní strana žláznatě hrbolatá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je úžlabní či terminální hrozen vyrůstající po 3 - 5ti ks, je 10 - 20tičetný, vřeteno dlouhé 1,2 - 2cm, vlastní květy mají 7 - 9mm stopky, korunu vejčitou, ochlupenou, bílou nebo narůžovělou, dlouhou 0,9 - 1,2cm a širokou 5mm. Plodem je kulovitá načervenalá bobule velikosti 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. oranjense - květenství žláznatě ochlupené
- var. quinquefidum

Vaccinium racemosum
synonyma: Andreusia guadalupensis, Hornemannia alainii, Hornemannia hederifolia, Hornemannia martinicensis, Hornemannia racemosa, Peyrusa royenoides, Symphysia alainii, Symphysia racemosa, Tauschia hederifolia, V. guadalupense, V. imrayi

oblasti: Dominikánská Republika, Haiti, Jamajka, Návětrné ostrovy, Portoriko, Závětrné ostrovy

Roste v Dominikánské Republice, Haiti, Jamajce, Portoriku, Závětrných a Návětrných ostrovech.

Vaccinium raiateense

Vaccinium randaiense
synonyma: V. bracteatum var. lanceolatum, V. hancockiae

oblasti: Guangdong, Guangxi, Guizhou, Japonsko, JV Čína, Tchaj-wan

Roste v Číně a Japonsku v podobě stálezeleného hustého keře. Dorůstá výšky 3 - 6m. Listy jsou řídké, kopinaté, kožovité, holé, celokrajné, špičaté, dlouhé 3 - 7cm, široké 1,5 - 2cm, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Květenství je terminální, hroznovité, 10tičetné, dlouhé 1 - 4,5cm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopky, kališní laloky 3úhlé, dlouhé 0,8 - 1mm, koruna bílá, trubkovitá a dlouhá 5,5 - 7,5mm. Plodem je tmavě růžově fialová kulovitá bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium rapae

oblasti: Tichý oceán

Roste na ostrově Tubuai.

Vaccinium reptans

oblasti: Kostarika, Panama

Roste v Kostarice a Panamě.

Vaccinium reticulatovenosum
synonyma: V. reticulato-venosum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře (i šplhavého) nebo stromu. Dorůstá výšky až 12m. Větve jsou na koncích hranaté. Listy jsou řídké, mírně vejčité, ocasovité, na okraji žláznaté, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 4 - 10cm, široké 2 - 4cm, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je několik úžlabních řídkých 5 - 8mičetných hroznů, vřeteno má délku 2 - 4cm, vlastní květy mají stopku délky 1 - 1,5cm, koruna je dlouze baňkovitá, uvnitř ochlupená, červená, dlouhá 1 - 1,1cm a široká 3mm. Plodem je tmavě růžově fialová bobule průměru 4mm.

Vaccinium reticulatum
synonyma: V. berberidifolium, V. macraeanum, V. pahalae, V. peleanum

oblasti: Havajské ostrovy

Roste na Havajských ostrovech v podobě stálezelené rostliny. Dorůstá výšky 0,1 - 1,3 (i 2)m. Listy vyrůstají ve spirále, mají kožovitý povrch a obvejčitý tvar délky 1 - 3cm. Okraje se zbarvují do červena. Kvete zvonkově tvarovanými červenými, žlutými nebo růžovými květy velikosti kolem 1cm. Plodem je jedlá bobule průměru 0,9 - 1,4mm barvy modré, fialové, červené nebo i oranžové.

Vaccinium retivenium

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 8m při průměru kmene 4 - 10cm. Větve jsou v mládí hranaté. Borka je šedě hnědá, svrasklá. Listy jsou řídké, mírně vejčité, špičaté, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 8 - 14cm, široké 3 - 7cm, báze zakulacená, žilnatinu tvoří 7- 9 žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní 6 - 10tičetné hrozny s vřetenem délky 3 - 11cm, vlastní květy mají stopky délky 1,3 - 2cm, koruna je baňkovitá až zvonovitá, bílá, dlouhá 6mm a široká 5mm. Plodem je široce vejčitá zeleně růžová bobule délky 6 - 8mm a šířky 6 - 7mm.

Vaccinium retusifolium

oblasti: Melanésie

Roste na Moluckých ostrovech v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 6m. Borka se odlupuje a je červenohnědá. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou husté, mírně obvejčité, kožovité, celokrajné, podvinuté, dlouhé 1,4 - 3,6cm, široké 0,6 - 1,6cm, spodní strana hrbolkatě žláznatá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní 8 - 11tičetné laty s 1,5 - 2,5cm vřetenem, vlastní květy mají 4 - 6mm stopky, koruna je dlouze baňkovitá, tmavě růžová až červená, dlouhá 1 - 1,2cm a široká 4mm. Plodem je kulovitá modře černá bobule průměru 5mm.

Vaccinium retusum
synonyma: Thibaudia retusa

oblasti: Ásám, Bhútán, Čína, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, V Himálaj, Vietnam

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Vietnamu a Nepálu v podobě stálezeleného, obvykle i epifytického, keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou mírně obvejčité, kožovité, holé, tupé až mírně vykrojené, mírně podvinuté, celokrajné, dlouhé 2 - 2,5cm, široké 0,9 - 1,4cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je 12tičetný hrozen délky 3 - 5cm, listeny jsou vejčitě kulaté, dlouhé 1,1cm,vlastní květy mají kališní laloky délky 0,8 - 1mm, baňkovitou korunu délky 5mm a stopku délky 3mm. Plodem je kulovitá tmavě růžově fialová až černá bobule průměru 5mm.

Vaccinium rigidifolium

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře v podobě keře. Listy jsou husté, mírně vejčité, tupě zaoblené, kožovité, na okraji ochlupené, z obou stran žláznatě hrbolaté, celokrajné, mohou být mírně podvinuté, dlouhé 3 - 6,5cm, široké 2 - 3,3cm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenstvím je bohatý úžlabní hrozen, vřeteno je dlouhé 4 - 8cm, vlastní květy jsou převislé, mají 2 - 3mm stopku, korunu dlouze baňkovitou, růžovou, dlouhou 6 - 7mm a širokou 2 - 3mm. Plodem je zploštělá bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium robustum

Vaccinium rollisonii

Vaccinium roraimense

oblasti: Guyana, Venezuela

Roste v Guyaně a Venezuele.

Vaccinium roseiflorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, holé, matné, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 2,4 - 4cm, široké 1,3 - 2,2cm, báze zašpičatělá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství tvoří 1 - 2 úžlabní vystoupavé jednostranné 7 - 9tičetné hrozny s 3 - 4cm vřetenem, vlastní květy mají 5 - 7mm stopky, korunu dlouze baňkovitou, dužnatou, růžovou, holou, dlouhou 6 - 7mm a širokou 2,5 - 3mm.

Vaccinium rubescens

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 1 - 2m. Listy jsou přeslenité po 3 - 8mi ks, úzce kopinaté až úzce vejčité, špičaté, dlouhé 7,5 - 12cm, široké 2 - 4cm, báze tupě zaoblená až mírně srdčitá a žilnatinu tvoří 15 párů žilek. Květenství je hroznovité, bohaté, dlouhé 7 - 12cm, vlastní květy mají červené stopky délky 1,5cm, kališní laloky jsou 3úhlé, dlouhé 1mm, koruna je oranžová až růžová a dlouhá 7 - 8mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm a má 2cm stopky.

Vaccinium rubroviolaceum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy

jsou kopinaté, ocasovité, kožovité, dlouhé 3 - 4,5cm, široké 0,5 - 1cm, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek, spodní strana řídce žláznatě tečkovaná a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní prakticky vzpřímené 4 - 8mičetné hrozny s vřetenem délky 0,5 - 4cm, vlastní květy mají stopky délky 1,3 - 1,8cm, koruna je dlouze baňkovitá, červeně růžově fialová, dlouhá 9mm a široká 2,5mm. Plodem je kulovitá tmavě růžově fialová bobule o průměru 4mm.

Vaccinium rubrum

Vaccinium sandsii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium sanguineum (Brusnice krvavá)

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného vzpřímeného epifytického keře. Dorůstá výšky 40 - 60cm. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou bohaté, obkopinaté až lopatkovité, kožovité, holé, dlouhé 0,9 - 1,4cm, široké 4 - 6mm, okraje zakřivené, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5mm. Květy jsou samostatné, úžlabní, převislé, mají stopky délky 3 - 5mm, koruna je široce baňkovitá, červená, dlouhá 5mm a široká 3 - 4mm.

Vaccinium santafeenis

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky do 3m. Listy jsou eliptické, špičaté, dlouhé 5 - 8cm, široké 2 - 3cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,1cm. Květenství je krátce hroznovité, chocholičnaté, 2 - 8mičetné, vřeteno dlouhé 5 - 9mm, vlastní květy mají 0,8 - 1,2cm stopky, korunu válcovitou, dlouhou 8 - 9mm a širokou 4mm.

Vaccinium santafeense
synonyma: Symphysia perardua

oblasti: Panama

Roste v Panamě v podobě epifytického keře. Dorůstá délky 3m. Listy jsou eliptické, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 5 - 8cm, široké 2 - 3cm, řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,1cm a široké 1,5 - 2mm. Květenstvím je 2 - 8mikvětý hrozen, listeny jsou vejčité, kýlnaté, špičaté, dlouhé 1 -1,2mm, vlastní květy jsou 5tičetné, mají kalich délky 3,5mm, trubka je dlouhá 2mm, široká 2,5mm, kališní laloky zvonkovité, dlouhé 1mm, korunní laloky jsou světle růžové, 3úhlé, špičaté, vzpřímené a dlouhé 2 - 2,5mm.

Vaccinium sarawakense

oblasti: Sarawak

Roste na Borneu. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. montanum
- subsp. sarawakense

Vaccinium saxatile

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru.

Vaccinium saxicola

oblasti: Guangdong

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 13 - 17cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, obvejčité, kožovité, holé, podvinuté, celokrajné, dlouhé 1,9 - 2,4cm, široké 1 - 1,3cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, samostatné nebo párovité, vřeteno má délku 4 - 5mm, vlastní květy mají stopky délky 5mm, kališní laloky jsou rozdvojené, 3úhlé, dlouhé 2mm, koruna je bílá, zvonkovitá a dlouhá 6 - 7mm. Plodem je kulovitá bobule o průměru 8 - 9mm.

Vaccinium saxicolum

Vaccinium scandens

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě šplhavého keře nebo liány. Listy jsou řídké, kopinaté, ocasovité, prakticky kožovité, celokrajné, dlouhé 7 - 15cm, široké 1 - 3cm, spodní strana řídce žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Květenství tvoří 2 - 3 úžlabní řídké 6 - 10tičetné prakticky jednostranné hrozny s 3 - 10cm vřetenem, vlastní květy mají 6 - 8mm stopky, korunu vejčitou, dužnatou a bílou až červeně zelenou.

Vaccinium schimperi

Vaccinium schlechterianum
synonyma: Disiphon papuanum, Disiphon papuanus

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou husté, vejčité, ocasovité, prakticky kožovité, celokrajné, dlouhé 3 - 6cm, široké

1,5 - 3cm, spodní strana řídce ochlupená, báze zaoblená až mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 3mm. Květenství tvoří úžlabní 2 - 5tičetné hrozny s vřetenem délky 1 - 1,5cm, vlastní květy mají 1,3 - 2cm stopky, korunu baňkovitou, ochlupenou, bělavě průsvitnou a dlouhou 1,4cm.

Vaccinium schoddei

oblasti: Papua-Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromu nebo keře. Listy jsou husté, částečně střechovité, vejčité, špičaté, u báze ouškaté, objímavé, celokrajné, kožovité, dlouhé 3 - 8cm, široké 2- 5cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní prakticky jednostranné hrozny s vřetenem délky 1 - 5cm, vlastní květy mají 0,8 - 1,5cm stopky, koruna je dlouze baňkovitá, dužnatá, červená, dlouhá 1,1 - 1,2cm a široká 4 - 5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium schultzei

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vzpřímeného nižšího keře. Listy jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, mírně vejčité, tupě špičaté, kožovité, holé, na okraji mírně zakřivené, dlouhé 2,5 - 4,3cm a široké 1 - 1,8cm. Kvete samostatnými úžlabními převislými květy na 0,8 - 1cm stopce, koruna je široce baňkovitá, drobně vrásčitá, uvnitř ochlupená, narůžovělá, dlouhá 7mm a široká 5mm.

Vaccinium sciaphilum

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného epifytického keře. Dorůstá výšky 50 - 60cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, ochlupené, vejčité, kožovité, podvinuté, celokrajné, dlouhé 1,3 - 2cm, široké 0,6 - 1,4cm, spodní strana žláznatě ochlupená, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2mm. Kvete samostatnými nebo párovými úžlabními květy, stopky jsou dlouhé 3mm, koruna je zeleně růžově fialová, zvonkovitá a dlouhá 5mm. Plodem je kulovitá ochlupená bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium sclerophyllum

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě hustě větveného keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou obvejčité, tupě špičaté, kožovité, tuhé, celokrajné, podvinuté, dlouhé 1,2 - 2,5cm, široké 0,5 - 1,1cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství je hroznovité, samostatné nebo párovité, 3 - 6tičetné, vřeteno je dlouhé 1cm, vlastní květy převislé, mají 6mm stopky, koruna dužnatá, trubkovitá, červená, dlouhá 2cm a široká 3 - 4mm.

Vaccinium scoparium

synonyma: V. erythrococcum, V. microphyllum, V. myrtillus var. microphyllum, V. scoparium

oblasti: Alberta, Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Utah, Washington, Wyoming

Roste v USA a Kanadě v alpinském pásmu v podobě opadavého metlovitého trsovitého keře. Dorůstá výšky více 10 - 20 (i 50)cm. Listy jsou eliptické až kopinaté, jemně pilovité, dlouhé 0,7 - 1,1 (I 1,5)cm a široké 4 - 6mm. Květe růžovými květy, kalich je světle zelený, koruna má délku i šířku 3 - 4mm. Plodem je červená jedlá bobule o mají 4 - 6mm a obsahuje semena délky 1mm.

Vaccinium scopulorum

oblasti: Bhútán, Myanmar (Barma), V Himálaj, Yunnan

Roste v Číně, Myanmaru a Bhútánu v podobě stálezeleného (i epifytického) keře. Dorůstá výšky 1,2 - 2 (i 5)m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou husté, kopinaté až obkopinaté, holé, mohou být jemně pilovité, špičaté až tupé, dlouhé 2,5 - 4,5cm, široké 0,6 - 1,7cm, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou velmi krátké. Květenství je úžlabní, hroznovité, dlouhé 2 - 5cm, 5tičetné, vlastní květy mají 0,8 - 1,2cm stopky, kališní laloky vejčitě 3úhlé, dlouhé 0,8 - 1mm, koruna je žlutě zelená až nazelenalá, baňkovitá a dlouhá 5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium scortechinii

oblasti: Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově v podobě keře nebo stromu. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou eliptické (až téměř okrouhlé), zaoblené, kožovité, tuhé, holé, celokrajné, dlouhé 0,8 - 1,5cm, široké 0,4 - 1cm, spodní strana řídce tečkovaná, báze široce zúžená, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1mm. Květenství tvoří samostatné nebo párovité úžlabní vzpřímené bohaté hrozny délky 2 - 4cm, vlastní květy mají až 1mm stopky, koruna válcovitá, bílá až růžová a ochlupená. Plodem je kulovitá ochlupená bobule průměru 5mm.

Vaccinium scyphocalyx

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Větve jsou v mládí řídce ochlupené. Listy jsou husté, obvejčité, kožovité, celokrajné, podvinuté, dlouhé 0,7 - 1cm, široké 4 - 7mm, spodní strana žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1mm. Kvete samostatnými přisedlými květy, koruna je baňkovitá, růžová, uvnitř chlupatá, dlouhá 4mm a široká 2mm. Plodem je kulovitá fialově červená bobule průměru 5mm.

Vaccinium secundiflorum

Vaccinium secundum

oblasti: Guatemala, Honduras, Panama

Roste v Guatemale, Hondurasu a Panamě.

Vaccinium selerianum
synonyma: Pernettya seleriana, V. haematinum, V. hondurense, V. minarum, V. quicheanum

oblasti: Guatemala, Honduras, J Mexiko, JV Mexiko, JZ Mexiko, Salvador

Roste v Mexiku, Salvadoru, Guatemale a Hondurasu v podobě i epifytického keře (i stromu). Dorůstá výšky (0,5 -) 1 - 3 (I 4,5)m. Listy jsou eliptické až eliptické, dlouhé 2 - 4,5 (i 6,5)cm, široké (0,8 -) 1,2 - 2,5 (i 5)cm a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 5mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, 6 - 12tikvěté, dlouhé 0,3 - 1,2cm, listeny jsou dlouhé (1,5 -) 2 - 7mm, vlastní květy jsou 5tičetné, kalich má velikost 3 - 4,5mm, trubka je dlouhá 1,5 - 2,2mm, lem 1 - 3mm, laloky jsou 3úhlé a dlouhé (0,8 -) 1,2 - 1,8mm, koruna je růžová až bílá, dlouhá 5 - 7,2 (i 9)mm, široká 3mm a laloky jsou dlouhé 1 - 2mm.

Vaccinium sempervirens

Vaccinium sericeum
synonyma: Polycodium sericeum, V. melanocarpum var. sericeum

Vaccinium serrulatum

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, eliptické, jemně pilovité, špičaté, dlouhé 3 - 4,5cm, široké 1,3 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 6 - 8 párů žilek, báze zaoblená až klínovitá a řapíky jsou dlouhé 4mm. Květenství je úžlabní, hroznovité, 8 - 12tičetné, dlouhé 1,5 - 3cm, vlastní květy mají 1mm stopky, kališní laloky jsou široce vejčitě 3úhlé, koruna bílá nebo růžová, baňkovitá a dlouhá 5 - 6mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 3 - 4mm.

Vaccinium setipes

oblasti: Myanmar (Barma), V Himálaj

Roste v Myanmaru a východním Himálaji.

Vaccinium shaferi

oblasti: Kuba

Roste na Kubě.

Vaccinium shastense

oblasti: Kalifornie

Roste v USA.

Vaccinium shikokianum

oblasti: Šikoku

Roste v Japonsku.

Vaccinium shoddei

Vaccinium siamense

Vaccinium sieboldii

oblasti: Japonsko

Roste v Japonsku.

Vaccinium sikangense

Vaccinium sikkimense

synonyma: V. oreotrephes, V. viburnoides

oblasti: Myanmar (Barma), Nepál, Sichuan, V Himálaj, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně, východním Himálaji, Nepálu a Myanmaru v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,3 - 0,7 (i 1)m. Větve jsou v mládí hustě šedě hnědě ochlupené. Listy jsou mírně vejčité až obvejčité, kožovité, špičaté, drobně pilovité, dlouhé 1 - 5cm, široké 0,9 - 2,7cm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek, báze klínovitá až zaoblená a řapíky jsou dlouhé 3mm. Květenstvím je úžlabní nebo terminální 6 - 8mičetný hrozen délky 1 - 3cm, vlastní květy mají 2 - 6mm stopku, kališní laloky jsou z 1/2 rozdělené, laloky široce 3úhlé, velikosti 0,3 - 0,6mm, koruna je růžová a dlouhá 4 - 6mm. Plodem je tmavě modrá bobule délky 0,5 - 1cm a šířky 5 - 8mm.

Vaccinium simulans

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě stromu nebo keře (i epifytického). Dorůstá výšky 10 - 15 (i 30)m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou řídké, eliptické, tupé, kožovité, tuhé, mírně lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 4 - 8cm, široké 2 - 4,5cm, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Květenství tvoří 4 - 6 úžlabních hustých bohatých hroznů, vřeteno je dlouhé 4 - 11cm, vlastní květy mají 1 - 3mm stopky, koruna baňkovitá, bílá nebo růžová, dlouhá 4 - 5mm a široká 2,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. leptopodum - stopky až nitkovité, dlouhé 3 - 6mm, koruna dlouhá 5mm
- var. simulans

Vaccinium simulatum

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Kentucky, Ohio, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Vaccinium singularis

oblasti: Kolumbie

Roste v Kolumbii.

Vaccinium sinicum

oblasti: Fujian, Guangdong, Guangxi, Hunan

Roste v Číně v podobě stálezeleného (i epifytického) bohatě větveného keře. Dorůstá výšky 0,4 - 2m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou obvejčité, celokrajné, kožovité, podvinuté, dlouhé 0,9 - 2cm, široké 0,8 - 1,1cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, 3 - 7mičetné, vřeteno má délku 0,6 - 1,2cm, listeny jsou podlouhlé, dlouhé 6 - 7mm, vlastní květy mají 2 - 3mm stopky, kališní laloky 3úhlé, zašpičatělé, dlouhé 1,5 - 2mm, koruna bílá, zvonkovitá, dlouhá 5mm a laloky velmi krátké. Plodem je kulovitá tmavě růžově fialová bobule průměru 3 - 6mm.

Vaccinium smallii (Brusnice Smallova)

synonyma: V. kansaiense, V. versicolor

oblasti: Japonsko, Sachalin

Roste v Japonsku a Sachalinu v podobě opadavého široce kulovitého pravidelného keře. Dorůstá výšky do 1,5m. Větve jsou holé. Listy jsou mírně kopinaté, špičaté, dlouhé 3 - 6cm, spodní strana je na centrální žilce ochlupená a báze je klínovitá až zaoblená. Kvete po 1 - 3ks 1/2převislými květy se zvonkovitou bílou až červenou korunou délky 5 - 6cm. Plodem je temně modrá bobule šířky 5 - 7mm.

Je zimovzdorná.

Vaccinium sororium

synonyma: V. cryptodon

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě vystoupavého keře. Dorůstá výšky 10 - 40cm. Větve jsou na konci hranaté a ochlupené. Listy jsou eliptické, zašpičatělé, kožovité, tuhé, v mládí brvité, celokrajné (i mírně podvinuté), dlouhé 0,7 - 1,4cm, široké 3 - 7mm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Kvete samostatnými úžlabními květy, stopky jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm, koruna je široce baňkovitá, načervenalá až růžová, dlouhá 6 - 7mm, široká 5mm. Plodem je kulovitá černá bobule.

Vaccinium sorsogonense

Vaccinium spaniotrichum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného keře. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, oboustranně lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 1 - 1,6cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenstvím je úžlabní 3 - 6tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé 0,5 - 1cm, vlastní květy mají 0,7 - 1,2cm stopky, koruna je dlouze baňkovitá, dužnatá, dlouhá 8 - 9mm a široká do 3mm.

Vaccinium sparsicapillum

oblasti: Nová Guinea, Západní Papua

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného keře. Větve jsou v mládí hranaté, ochlupené a jemně bradavčité. Listy jsou husté, eliptické, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 5 - 8mm, široké 3 - 4mm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete samostatnými úžlabními květy na 2 - 4mm stopce, koruna je dužnatá, baňkovitá, červená, dlouhá 4mm a široká 2,5mm.

Vaccinium sparsum

oblasti: Papua-Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 4m. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, celokrajné, dlouhé 5 - 7cm, široké 2,5 - 4cm, na spodní straně žláznatě ochlupené, báze je široce zúžená, žilnatinu tvoří několik párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenství tvoří 2 - 3 úžlabní 6 - 10tietné hrozny, vlastní květy mají stopky délky 1cm, koruna je široce baňkovitá, růžová, dlouhá 9mm a široká 4 - 5mm.

Vaccinium spathulatum

Roste v podobě středně velkého keře. Větve jsou v mládí hranaté, šedě ochlupené, později válcovité, černající a holé. Listy jsou úzce obvejčité až lžičkovité, zakulacené až mělce vykrojené, úzce podvinuté, hnědě zelené, zprvu ojíněné, dlouhé 3 - 4,5 (i 6)cm, širok= 0,8 - 1,5 (i 2)cm, báze úzce klínovitá, sbíhavá v 1/2válečkovitý úzce křídlatý řapík délky 3 - 4,5mm. Květenství je vrcholové nebo úžlabní (i mírně latnaté), dlouhé 4 - 6 (i 10)cm, větve ochlupené, listen má drobný hrot, spodní strana ochlupená, vlastní 5tičetné květy mají 4 - 5 (za plodu 5 - 6)mm ochlupenou stopku, kalich má laloky při vrcholu řídce ochlupené, laloky špičaté, dlouhé 1mm, koruna je tlustá, kulovitě baňkovitá, dlouhá 4mm, laloky vně řídce ochlupené, dlouhé 1mm a stočené zpět. Plodem je masitá kulovitá zprvu ojíněná bobule průměru 6 - 8mm.

Vaccinium sphyrospennoides
synonyma: V. sphyrospermoides

oblasti: Peru

Roste v Peru.

Vaccinium sphyrospermoides
synonyma: Sphyrospermum myrtifolium

Vaccinium spicatum

Vaccinium spiculatum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu v podobě stálezeleného epifytického bohatě větveného keře. Větve jsou v mládí hnědě ochlupené. Listy jsou husté, eliptické až mírně vejčité, mohou být kožovité, špičaté, holé, mírně podvinuté, na okraji mají 3 - 5 zoubků, dlouhé 0,7 - 1cm, široké 4 - 6mm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 1 - 3 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1mm. Květe samostatnými úžlabními 4četnými květy na 0,5mm stopce, kališní laloky jsou 3úhle kopinaté, dlouhé 1mm, koruna je trubkovitě baňkovitá, dlouhá 5,5mm a ochlupená. Plodem je eliptická bobule průměru 2 - 3mm.

Vaccinium sprengelii
synonyma: Agapetes sprengelii, Epigynium affine, Epigynium donianum, Epigynium sprengelii, V. affine, V. donianum, V. forrestii, V. glabrum, V. harmandianum, V. pedicellatum

oblasti: Ásám, Kambodža, Laos, Myanmar (Barma), Střední Čína, Thajsko, V Himálaj, Z Čína

Roste v Indii, Indočíně a Číně v podobě stálezeleného vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 3m. Větve mohou být v mládí jemně ochlupené. Listy jsou kopinaté, oboustranně špičaté, drobně pilovité a dlouhé 3 - 7cm. Květenstvím je úžlabní hrozen délky 3 - 10cm, vlastní květy jsou dlouze baňkovité, bílé až růžové a dlouhé 6mm. Plodem je temně červená kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium stamineum (Brusnice tyčinkovitá)
synonyma: Arbutus myrtilloides, Picrococcus elevatum, Picrococcus floridanus, Picrococcus stamineus, Polycodium ashei, Polycodium caesium, Polycodium candicans, Polycodium depressum, Polycodium depressum var. minus, Polycodium elevatum, Polycodium floridanum, Polycodium floridanum var. caesium, Polycodium floridanum var. molle, Polycodium floridanum var. revolutum, Polycodium glandulosum, Polycodium interius, Polycodium interius var. commune, Polycodium interius var. subglandulosum, Polycodium langloisii, Polycodium lautum, Polycodium leptosepalum, Polycodium macilentum, Polycodium melanocarpum, Polycodium multiflorum, Polycodium multiflorum var. uniquum, Polycodium neglectum, Polycodium neglectum var. harbisonii, Polycodium oblongum, Polycodium oliganthum, Polycodium parvum, Polycodium quercinum, Polycodium revolutum, Polycodium stamineum, Polycodium stamineum var. affine, Polycodium stamineum var. austromontanum, Polycodium stamineum var. virginianum, V. arenicola, V. bellum, V. caesium, V. concoloratum, V. depressum, V. depressum var. minus, V. elevatum, V. floridanum, V. floridanum var. caesium, V. floridanum var. molle, V. floridanum var. revolutum, V. glandulosum, V. harbisonii, V. interius, V. interius var. commune, V. interius var. subglandulosum, V. langloisii, V. lautum, V. leptosepalum, V. macilentum, V. melanocarpum, V. neglectum, V. neglectum var. harbisonii, V. oblongum, V. oliganthum, V. parvum, V. quercinum, V. revolutum, V. semipersistens, V. semipersistens var. uniquum, V. stamineum var. affine, V. stamineum var. austromontanum, V.

stamineum var. melanocarpum, V. stamineum var. stamineum, V. stamineum var. virginianum

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína , Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Pochází v Kanadě a USA v podobě hustého keře. Dorůstá výšky 0,8 (i 1,5)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až mírně vejčité, špičaté až zašpičatělé, oboustranně řídce ochlupené, dlouhé (2 -) 3 - 8 (i 10)cm, široké 0,9 - 3,2cm a spodní strana bývá namodralá. Květenstvím je úžlabní 2 - 7mikvětý hrozen délky do 6cm, vlastní květy jsou zvonkovité, žlutě zelené a občas růžově fialově žilkované a s 5ti laloky. Plodem je žlutozelená kulovitá či hruškovitá bobule průměru 0,8 - 1cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. neglectum/V. neglectum - výška 1,5m; větve holé; listy eliptické až obvejčité, špičaté, dlouhé 2,5 - 8cm, celokrajné, holé, báze zaoblená; koruna růžová až bílá, dlouhá 6mm; plody průměru 6mm

Vyhovuje ji písčitá nebo kamenitá půda.

Vaccinium stanleyi

oblasti: Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Rwanda, Uganda

Roste v Ugandě, Burundi, Rwandě a Demokratické Republice Kongo v podobě hustého keře. Dorůstá výšky 0,3 - 2,4 (i 4)m. Listy jsou eliptické až mírně vejčité, špičaté až zašpičatělé, drobně pilovité, zelené, dlouhé 1 - 3,3 (i 5,5)cm, široké 0,5 - 1,7 (i 2,3)cm, báze je sbíhavá a řapíky jsou ochlupené. Květenstvím je vrcholový 5 - 15tikvětý hrozen délky do 3,5cm, listeny jsou vejčité, špičaté, dlouhé 1 - 2,2mm, široké do 1,4mm, vlastní květy mají 1,5 - 3,5 (i 9)mm stopku, koruna je bílá, růžová nebo červená, zvonkovitá, dlouhá 2,5 - 4,2mm a široká 2,5 - 5,5mm. Plodem je kulovitá tmavě modrá nebo růžově fialová bobule průměru 6 - 7mm.

Vaccinium stapfianum

synonyma: V. buxifolium

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře (i epifytického) až stromu. Dorůstá výšky do 7m. Větve jsou v mládí narůžovofialovělé. Listy jsou střechovité, obvejčité, tupé až zaoblené, kožovité, tuhé, celokrajné, dlouhé 0,8 - 2cm, široké 4 - 8mm, spodní strana řídce žláznatě hrbolatá nebo tečkovaná, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní vzpřímené prakticky jednostranné husté hrozny s vřetenem délky 1,5 - 4cm, vlastní květy mají 1 - 2mm stopky, korunu dlouze baňkovitou, červenou až bílou, dlouhou 5 - 6mm a širokou 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. minus - obvykle epifytický keř; listy řidší, obvejčité; květy prakticky přisedlé, dlouhé 2,5 - 3mm
- var. stapfianum

Vaccinium staufferianum

Vaccinium steinii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Listy jsou mírně vejčité, ocasovité, prakticky srpovité, tupě špičaté, mírně kožovité, holé, lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 5 - 8,5cm, široké 2,5 - 4cm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 6mm. Květenstvím je úžlabní 10 - 12tičetný hrozen s 2 - 2,5cm vřetenem, vlastní květy mají 4mm stopky, korunu baňkovitou a dlouhou 4,5mm.

Vaccinium stellae-montis

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 0,3 - 3m. Větve jsou v mládí řídce ochlupené. Listy jsou husté, eliptické, tupě kulaté, kožovité, holé, lesklé, celokrajné, dlouhé 1,5 - 2,3cm, široké 0,8 - 1,5cm, na spodní straně řídce žláznatě tečkované, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství tvoří 2 - 3 úžlabní 2 - 4četné hrozny s 0,5 - 1,5cm vřetenem, vlastní květy mají stopku délky 0,8 - 1,1cm, koruna je široce baňkovitá, tmavě růžová, dlouhá 0,8 - 1,2cm a široká 6 - 8mm.

Vaccinium stenanthum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Listy jsou řídké, obvejčité, tupě zaoblené, kožovité, celokrajné, dlouhé 3,5 - 6,5cm, široké 1,5 - 5cm, žilnatinu tvoří 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je řídký hrozen s vřetenem délky 3 - 4 (i 8)cm, vlastní květy mají 2 - 3mm stopky, korunu dlouze trubkovitou, dužnatou, dlouhou 8mm a širokou 2 - 3mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium stenolobum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě stromu. Dorůstá výšky 12 - 20cm. Povrch je holý. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, celokrajné, mírně zvlněné, mírně podvinuté, dlouhé 5 - 8cm, široké 2 - 3cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenství tvoří 2 - 3 úžlabní 8 - 14tičetné hrozny s vřetenem délky 4 - 5cm, vlastní květy mají 0,7 - 1cm stopky, koruna je baňkovitá, růžová, holá, dlouhá 1cm a široká 6mm.

Vaccinium stenophyllum

synonyma: Cyanococcus angustifolium, V. angustifolium, V. glaucescens, V. gonzalezii

oblasti: Guatemala, Honduras, J Mexiko, JV Mexiko, JZ Mexiko, S Mexiko, SV Mexiko, SZ Mexiko, V Mexiko, Z Mexiko

Roste v Mexiku, Guatemale a Hondurasu.

Vaccinium steyermarkii

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele v podobě keře. Dorůstá výšky 1,5m. Listy jsou eliptické, kožovité, zašpičatělé, celokrajné, dlouhé 2 - 4,5cm, široké 1,5 - 2,5cm, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Kvete po 1 - 3ks v úžlabí, listeny jsou dlouhé 5 - 8mm, koruna je trubkovitá, červená a dlouhá 1,9 - 2,2cm.

Vaccinium striicaule

synonyma: V. blepharocalyx, V. longiporum

oblasti: Papua-Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, holé, mírně lesklé, celokrajné, dlouhé 3,5 - 6cm, široké 1 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek, báze široce zúžená až zaoblená a řapíky jsou dlouhé 3 - 4mm Květenství tvoří 2 - 3 úžlabní prakticky vzpřímené 8 - 12tičetné hrozny, vřeteno je dlouhé 2 - 4cm, vlastní květy mají stopku délky 6 - 8mm, koruna je široce baňkovitá, tmavě růžová až růžově fialová, dlouhá 6 - 7mm a široká 3mm. Plodem je kulovitá temná bobule průměru 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. adenodes - výška 1,5 - 5m; kališní laloky min. částečně na vrcholu žláznaté, koruna větší
- var. pubiflorum - krátce ochlupený kalich
- var. striicaule

Vaccinium subcordatum

Vaccinium subdissitifolium

synonyma: V. scalarinervium, V. vacciniaceum f. hispidum, V. vacciniaceum var. hispidum, V. venosum var. hispidum

oblasti: Ásám, Bhútán, Nepál, Sikkim, V Himálaj, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Bhútánu, Nepálu a Indii v podobě stálezeleného epifytického keře. Dorůstá výšky 0,4 - 2m. Listy vyrůstají v řidších přeslenech, jsou obvejčité až kopinaté, špičaté, mohou být kožovité, dlouhé 4 - 10cm, široké 1 - 4cm, žilnatinu tvoří 6 - 10 párů žilek, báze je klínovitá, okraj tupě zubatý a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je hroznovité, úžlabní, bohaté, dlouhé 5 - 15cm, listeny jsou vejčitě kopinaté, dlouhé 3,5mm, vlastní květy mají 1 - 1,5cm stopky, koruna je žlutě zelená, baňkovitá a dlouhá 6mm. Plodem je zeleně bílá kulovitá bobule průměru 3mm.

Vaccinium subfalcatum

oblasti: Guangdong, Guangxi, Vietnam

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 7m. Listy jsou řídké, kopinaté, mírně kožovité, celokrajné, špičaté, dlouhé 4 - 11cm, široké 1 - 3cm, žilnatinu tvoří 7 - 8 párů žilek, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je terminální a úžlabní hrozen délky 4 - 6mm, vlastní květy mají 4 - 6mm stopky, koruna je bílá, trubkovitá a dlouhá

8mm. Plodem je tmavě růžově fialová kulovitá ochlupená bobule průměru 5 - 6mm.

Vaccinium subobovatum

Vaccinium subulisepalum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky 3m. Větve jsou převislé, v mládí ochlupené a bohatě větvené. Listy jsou husté, vejčité, ocasovité, kožovité, tuhé, v mládí řídce ochlupené, podvinuté, dlouhé 2,7 - 4,1cm, široké 1,2 - 2,3cm, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenství tvoří úžlabní 3 - 5tičetné krátce stopkaté hrozny, vřeteno má délku 0,7 - 1,5cm, vlastní květy mají stopku délky 0,8 - 1,2cm, koruna je trubkovitá a dlouhá 1cm. Plodem je kulovitá bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium sulawesiense

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi.

Vaccinium sulcatum

synonyma: Rigiolepis sulcata

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky do 5m. Větve jsou na koncích v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, ocasovité, kožovité, krátce ochlupené, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 9 - 21cm, široké 4 - 10cm, žilnatinu tvoří 7 - 9 žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenství tvoří 2 - 4 úžlabní 10 - 20tičetné hrozny délky 4 - 6cm, vlastní květy mají 5 - 7mm stopky, koruna je baňkovitá, nažloutlá, dlouhá 4 - 4,5mm a široká 2,5 - 3mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 4mm.

Vaccinium sumatranum

oblasti: Sumatra

Roste na Sumatře.

Vaccinium summifaucis

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě šplhavého nebo epifytického keře. Větve jsou v mládí hranaté, mohou být ochlupené. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 1,8 - 3,5cm, široké 1,1 - 2cm, spodní strana je řídce žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 2- 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenství tvoří 1 - 3 chudé řídké hrozny s 1 - 1,5cm vřetenem, vlastní

květy jsou převislé, dlouhé 0,9 - 1,2cm, koruna je baňkovitá, nažloutle plstnatá, dlouhá 6,5mm a široká 3mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 6 - 7mm.

Vaccinium superum

Vaccinium supracostatum

oblasti: Guangxi, Guizhou

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 0,7 - 2 (i 7)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně obvejčité, celokrajné, kožovité, holé, dlouhé 3 - 7cm, široké 1,2 - 4cm, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 3 - 4cm, 8mičetné, vlastní květy mají 3 - 4mm stopky, korunu nazelenalou, narůžověle fialovou, zvonkovitou a dlouhou 5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium sylvaticum
synonyma: V. mearnsii

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře (i epifytického) nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 10m. Vytváří více vystoupavých kmínků. Listy jsou mírně obkopinaté, ocasovité, kožovité, holé, lesklé, mírně podvinuté, dlouhé 5 - 10cm, široké 2 - 4cm, žilnatinu tvoří 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1cm. Květenství tvoří 3 - 4 úžlabní 8 - 15tičetné hrozny s vřetenem délky 3 - 8cm, vlastní květy mají 4 - 7mm stopky, korunu baňkovitou, červenou, dlouhou 7 - 8mm a širokou 3,5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 7mm.

Vaccinium symplocifolium
synonyma: Agapetes arborea, Agapetes salicifolia, Agapetes symplocifolia, Andromeda symplocifolia, Epigynium leschenaultii, Epigynium rotundifolium, V. leschenaultii, V. rotundifolium

oblasti: Indie

Roste v Indii.

Vaccinium talamancense
synonyma: Macleania talamancensis

oblasti: Kostarika

Roste v Kostarice v podobě keře. Dorůstá délky 0,5 - 1m. Listy jsou obvejčité až úzce eliptické, špičaté nebo zakulacené, pilovité, dlouhé 2,5 - 4,7cm, široké 1,2 - 1,8 (i 2,3)cm, báze je zakulacená, spodní strana je hnědě červená, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je úžlabní přisedlý 10 - 15tikvětý hrozen s vřetenem délky 1 - 2 (i 4)cm, listeny jsou čárkovité až kopinaté, dlouhé 3 - 4mm, listence jsou čárkovité až úzce kopinaté, dlouhé 2 - 3mm, vlastní květy mají 0,6 - 1cm stopku, kalich má velikost 4,5 - 5mm, trubka je dlouhá 2,5 - 3mm, koruna je světle růžová až bělavá, dlouhá 0,8 - 1,3cm a široká 4 - 6mm. Plodem je kulovitá temně modrá bobule průměru 0,8 - 1cm.

Vaccinium tallapusae

Vaccinium tanjungii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium taquetii

Vaccinium taxifolium

oblasti: Nová Guinea, Západní Papua

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, podlouhlé, prakticky kožovité, tuhé, holé, celokrajné, mohou být mírně podvinuté, dlouhé 0,9 - 1,8cm, široké 2 - 4mm, spodní strana žláznatě tečkovaná, báze uťatá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je úžlabní, převislé, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopky, koruna je baňkovitá, červená, dlouhá 6 - 8mm a široká 3 - 5mm.

Vaccinium tectiflorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium tenellum

synonyma: Cyanococcus tenellus

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Mississippi, Severní Karolína, Virginie

Roste v USA v podobě opadavého (i stálezeleného) keře. Dorůstá výšky (10 -) 20 - 45 (i 75)cm. Listy jsou eliptické až mírně lopatkovité, pilovité, dlouhé (1,3 -) 2 - 3 (i 4)cm, široké 0,3 - 1,7cm a spodní strana je žláznatě ochlupená. Kvete bílými nebo načervenalými květy, kalich je světle zelený, občas ochlupený, koruna je růžová až červená a dlouhá 6 - 8mm. Plodem je lesklá černá bobule průměru 6 - 8mm obsahující semena délky 1mm.

Vaccinium tenerellum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě šplhavého keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, mírně kožovité, mírně lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 4 - 6cm, široké 1,5 - 2,3cm, spodní strana řídce žláznatě hrbolatá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenstvím je úžlabní 8 - 12tičetný hrozen s vřetenem délky 3 - 5cm, vlastní květy mají 3 -

4mm stopky, koruna je baňkovitá, dlouhá 4mm a široká 2,5mm.

Vaccinium tentaculatum

oblasti: Melanésie

Roste na Moluckých ostrovech v podobě keře. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, lesklé, celokrajné, dlouhé 4,2 - 7cm, široké 1,7 - 2,6cm, žilnatinu tvoří 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 6 - 8mm. Květenstvím je řídký hrozen s vřetenem délky 3,5cm, vlastní květy mají 2cm stopky s listenem délky 1,5cm, vlastní květy mají baňkovitou dužnatou korunu bílé barvy s načervenalou částí u báze, má délku 8mm a šířku 3mm.

Vaccinium tenuiflorum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře, který může být i popínavý. Větve jsou v mládí hranaté a žláznatě ochlupené. Listy vyrůstají v 9 - 10tičetných zdánlivých přeslenech, jsou kopinaté, kožovité, holé, řídce pilovité, špičaté, dlouhé 4 - 11cm, široké 0,9 - 2cm, báze klínovitá až zakulacená, žilnatinu tvoří 12 - 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 5 - 6cm, bohaté, listeny jsou kopinaté, dlouhé 2 - 3mm, vlastní květy mají 5 - 6mm stopky, kališní laloky jsou 3úhlé, mírně ochlupené, koruna je bílá, dlouze trubkovitá a dlouhá 4 - 5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 3mm.

Vaccinium tenuipes

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky do 3m. Větve jsou v mládí ochlupené (i žláznatě). Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, žláznatě ochlupené, celokrajné, podvinuté, dlouhé 3 - 5cm, široké 1 - 2,5cm, na spodní straně žláznatě tečkované, báze zakulacená a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství tvoří 1 - 2 úžlabní 3 - 10tičetné hrozny délky 2 - 5cm, vřeteno má délku 1 - 2cm, vlastní květy mají stopky délky 1 - 2cm, koruna je baňkovitá, bílá až červeně růžově fialová, a dlouhá 1cm. Plodem je kulovitá načernalá bobule průměru 4mm.

Vaccinium tepuiense

Vaccinium teysmannii

Vaccinium thibaudifolium

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 4m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, ocasovité, kožovité, celokrajné, dlouhé 6 - 9cm, široké 2,5 - 4cm, báze přechází v řapík, žilnatinu tvoří 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenstvím je úžlabní 6 - 8mičetný hrozen s vřetenem délky 4 - 9cm, vlastní květy mají 1 - 2cm stopky, listen délky 0,6 - 1cm, koruna je široce

baňkovitá, růžová až zeleně bílá, dlouhá 3,5 - 4mm a široká 2,5mm. Plodem je kulovitá růžově fialová bobule.

Vaccinium thiniorum

Vaccinium thysanocalyx

Vaccinium timonioides

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, mírně vejčité, prakticky ocasovité, tuhé, celokrajné, dlouhé 2 - 3,5cm, široké 0,8 - 1,3cm, spodní strana přitiskle žláznatě ochlupená, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství tvoří řídké 3 - 5tičetné hrozny s vřetenem délky 0,5 - 1cm, vlastní květy mají korunu dlouze baňkovitou, dlouhou 6 - 7mm a širokou 2 - 2,5mm.

Vaccinium timorense

synonyma: V. timorense var. denticulatum

oblasti: Malé Sundy, Sulawesi (Celebes)

Roste na Malých Sundách a Sulawesi v podobě keře (i stromu). Dorůstá výšky 1 - 2 (i 8)m. Větve jsou v mládí hranaté a jemně ochlupené. Listy jsou podlouhlé, kožovité, holé, lesklé, celokrajné, dlouhé 2 - 4cm, široké 0,5 - 1,5cm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm. Květenstvím je úžlabní 8 - 20tičetný hrozen, vřeteno je dlouhé 1 - 5cm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopky, koruna je dlouze baňkovitá, bílá až červená, uvnitř drobně ochlupená, dlouhá 6 - 7mm a široká 2,5 - 3mm. Plodem je kulovitá temně modrá bobule průměru 5mm.

Vaccinium tomicipes

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě epifytického keře. Dorůstá výšky 50cm. Větve jsou v mládí ochlupené a kyjovitě žláznaté. Listy jsou vejčité, špičaté, prakticky kožovité, ochlupené, celokrajné, dlouhé 0,8 - 1,3cm, široké 4 - 7mm, báze kulatá až mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 3 - 5 žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5mm. Kvete samostatnými úžlabními květy na 0,6 - 1,5cm stopce, koruna je dlouze baňkovitá, ochlupená, bílá nebo narůžovělá, dlouhá 6mm a široká 2 - 3mm.

Vaccinium tonkinense

oblasti: Vietnam

Roste ve Vietnamu.

Vaccinium trichocarpum

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě stromu. Dorůstá výšky 2 - 4m. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou eliptické, tupé (i mírně vykrojené), holé, prakticky kožovité, matné, celokrajné, dlouhé 2 - 2,8cm, široké 0,8 - 1,3cm, báze zúžená až zaoblená, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2mm. Květenstvím je téměř terminální 2 - 4četný hrozen, vřeteno je dlouhé 1 - 4cm, vlastní květy mají 0,5mm stopky, koruna je dlouze baňkovitá, růžová, dlouhá 4mm a široká 2mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium trichocladum

synonyma: V. trichocladum var. trichocladum

oblasti: Fujian, Jiangxi, Zhejiang

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 5 - 8m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, vejčité, kožovité, špičaté, zubaté až celokrajné, dlouhé 4 - 9cm, široké 2 - 3cm, žilnatinu tvoří 8 - 10 párů žilek, báze zaoblená až mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je úžlabní či terminální bohatý hrozen délky 4 - 8cm, vlastní květy mají 3 - 4mm stopky, kališní laloky jsou 3úhle vejčité, dlouhé 1mm, koruna bílá, dlouze baňkovitá a dlouhá 5 - 6mm. Plodem je červená kulovitá bobule průměru 5 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. glabriracemosum - Fujian, Jiangxi, Zhejiang; větve řídce žláznatě ochlupené; květenství holé
- var. trichocladum/V. iteophyllum var. hispidum - větve v mládí žláznatě ochlupené; listy zubaté; květenství ochlupené

Vaccinium triflorum

synonyma: Pieris buxifolia, V. buxifolium

oblasti: Guizhou, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stálezeleného keře. Dorůstá výšky 0,6 - 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické, kožovité, podvinuté, celokrajné, tupě zakulacené, dlouhé 1,4 - 2,3cm, široké 0,7 - 1,4cm, žilnatinu tvoří 1 pár žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je hroznovité, (1 -) 2 - 3 (i 5ti)květé, vřeteno má délku 3 - 4mm, listeny jsou 3úhle kopinaté, dlouhé 1,5 - 2mm, vlastní květy mají 6 - 9mm stopky, koruna je tmavě červená, zvonkovitá a dlouhá 5mm.

Vaccinium truncatocalyx

oblasti: Guangdong

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2,6 - 8m. Větve jsou v mládí šedohnědé. Listy jsou řídké, eliptické, mírně kožovité, špičaté, holé, dlouhé 3 - 5cm, široké 1,2 - 1,5cm, báze klínovitá a řapíky jsou dlouhé 3 - 4mm. Květenství je hroznovité, úžlabní i terminální, dlouhé 1,5 - 2cm, vlastní květy mají 1,5 - 2mm stopky, koruna je růžově fialová, dlouze baňkovitá a dlouhá 4 - 5mm.

Vaccinium tubiflorum

oblasti: Nová Guinea

Roste v Nové Guineji v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3,5m. Větve jsou hranaté. Listy jsou eliptické, špičaté, kožovité, celokrajné, podvinuté, dlouhé 3 - 7cm, široké 1,3 - 3cm, spodní strana řídce žláznatě tečkovaná, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní 2 - 4četné hrozny s vřetenem délky 0,7 - 1cm, vlastní květy mají 6 - 9mm stopky, koruna je trubkovitá, dužnatá, růžová, dlouhá 2cm a široká 5 - 6mm.

Vaccinium turbinatum

Vaccinium turfosum

oblasti: Nová Guinea, Západní Papua

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky až 5m. Listy jsou vejčité, ocasovité, kožovité, lesklé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 3,5 - 7cm, široké 1,5 - 2,3cm, báze zaoblená a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Květenství tvoří 2 - 3 úžlabní 12 - 20tičetné jednostranné hrozny, vřeteno je dlouhé 3 - 8cm, vlastní květy mají stopky délky 0,5 - 1,2cm, koruna je dlouze baňkovitá, dlouhá 1,2 - 1,4cm a široká 4 - 5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 6mm.

Vaccinium uliginosum (Vlochyně bahenní)

synonyma: Myrtillus grandis, Myrtillus uliginosa, Myrtillus uliginosus, Myrtillus uliginosus var. pubescens, V. gaultherioides, V. occidentale, V. pedris, V. pubescens, V. uliginosum f. pubescens, V. uliginosum subsp. gaultherioides, V. uliginosum subsp. occidentale, V. uliginosum subsp. pubescens, V. uliginosum var. album, V. uliginosum var. gaultherioides, V. uliginosum var. occidentale, V. uliginosum var. pedris, V. uliginosum var. pubescens

oblasti: Albánie, Alberta, Aljaška, Alpy, Andalusie, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Gruzie, Idaho, Island, Itálie, J Rusko, J Sibiř, Japonsko, Jugoslávie, JV Rusko, JV Sibiř, JZ Rusko, JZ Sibiř, Kalifornie, Katalánsko, Kazachstán, Korea, Labrador, Litva, Lotyšsko, Maine, Manitoba, Michigan, Minnesota, Mongolsko, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Oregon, Polsko, Pyreneje, Quebec, Řecko, Rumunsko, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Slovensko, Střední Rusko, SV Čína, SV Rusko, SZ Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Utah, V Rusko, V Sibiř, Velká Británie, Vermont, Vnitřní Mongolsko, Washington, Wyoming, Yukon, Z Rusko

Pochází z alpinského pásma hor severní polokoule. Roste v podobě rozložitého plochého keře. Dorůstá výšky 0,1 - 0,9 (i 1)m. Větve jsou šedě hnědé až červeně hnědé, okrouhle ohnuté. Listy jsou střídavé, eliptické s mírně podvinutým okrajem, sivě zelené, okraje mohou být načervenalé, dlouhé 0,5 - 3 (i 4)cm, široké 0,2 - 1,5cm, báze uťatá, žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek, spodní strana je namodralá až ojíněná a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5mm. Kvete narůžovělými převislými květy ve 2 - 4četných hroznech na 5mm stopkách, koruna je baňkovitá, zeleně bílá až narůžovělá, dlouhá (3 -) 3,5 - 4 (i 6)mm a široká 2,5mm. Plodem je jedlá tmavá modře černá až modře fialová bobule průměru 0,5 - 0,8 (i 1)cm ale ve větším množství může vyvolávat nevolnost. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. alpinum - nízké keře; listy obvejčité až eliptické, dlouhé 0,6 - 1,5cm, široké 4 - 9mm; tundra
- var. genuinum - výška do 1m; listy vejčité až okrouhlé, dlouhé 1,1 - 3,8cm, široké 0,7 - 2,4cm; lesy
- subsp. microphyllum - arktické oblasti; poléhavé keře; listy dlouhé 0,6 - 1,5cm; květy mají stopky

délky 1 - 3mm
- subsp. occidentale
- subsp. uliginosum (Vlochyně bahenní pravá) - výška 0,75 - 1m; větve vzpřímené; listy dlouhé 1 - 2,5 (i 3,5)cm; květy mají stejně dlouhé stopky jako korunu, cípy koruny ohnuté
- var. vulcanorum/V. vulcanorum - Kamčatka; bohatě větvený polštářovitý keř; listy husté, vytrvávají 1 - 2 roky; tundra

Vyhovují ji vlhčí arktické půdy, rašeliniště, kosodřeviny, vlhká kyselá půda.

Vaccinium uniflorum (Brusnice jednokvětá)

synonyma: Rigiolepis uniflora

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě epifytického keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, tupě ocasovité, prakticky kožovité, celokrajné, dlouhé 2,5 - 8cm, široké 0,8 - 1,7cm, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek, spodní strana přitiskle ochlupená a řapíky jsou dlouhé 2mm. Kvete samostatnými (i párovými) úžlabními květy na 2,7mm stopkách, koruna je široce baňkovitá, uvnitř ochlupená a dlouhá 3,2mm.

Vaccinium urceolatum

synonyma: V. urceolatum var. urceolatum

oblasti: Guizhou, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře (i epifytického) nebo stromu. Dorůstá výšky (0,4 -) 1 - 5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, vejčité, špičaté, kožovité, v mládí ochlupené, mírně podvinuté, dlouhé (5 -) 6 - 13cm, široké (2 -) 2,5 - 5,5cm, žilnatinu tvoří 2 - 5 párů žilek, báze je zakulacená až mírně srdčitá a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 3 - 9cm, bohaté, vlastní květy mají 2 - 6mm stopky, kalich má velikokst 1mm, laloky jsou široce 3úhlé, dlouhé 1 - 1,5mm, koruna je narůžovělá až žlutě zelená, baňkovitá až zvonkovitá, dlouhá 4 - 6mm. Plodem je tmavě růžově fialová až černá kulovitá bobule průměru 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. pubescens - Yunnan; plody, vřeteno a stopky květů ochlupené, vřeteno dlouhé 5 - 9cm
- var. urceolatum - Sichuan, Yunnan; vřeteno a stopky květů ochlupené, vřeteno dlouhé 3 - 5cm

Vaccinium uroglossum

oblasti: Borneo

Roste na Borneu v podobě epifytického až mírně šplhavého keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 5m. Větve jsou převislé, v mládí ochlupené. Listy jsou husté, vejčité, mírně tupě ocasovité, mírně kožovité, v mládí ochlupené, dlouhé 3 - 6,5cm, široké 1,4 - 2,2cm, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,5mm. Květenství tvoří úžlabní jednostranné 10 - 20tičetné hrozny, vřeteno má délku 4 - 6mm, vlastní květy mají 2 - 4mm stopky, koruna je baňkovitá, béžová až žlutá, řídce ochlupená a dlouhá 4mm. Plodem je žlutá u báze červená bobule průměru 3mm.

Vaccinium urubambense

oblasti: Peru

Roste v Peru.

Vaccinium usneoides

Vaccinium utteridgei

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji.

Vaccinium vacciniaceum

synonyma: Agapetes serrata, Ceratostema vaccinaceum, Epigynium serratum, Gaylussacia serrata, Thibaudia serrata, Thibaudia vaccinacea, V. serratum, V. vacciniaceum subsp. vacciniaceum, V. venosum

oblasti: Ásám, Bhútán, Myanmar (Barma), Nepál, Sikkim, V Himálaj, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Indii a Myanmaru v podobě stálezeleného občas epifytického keře. Dorůstá výšky 50cm. Větve jsou v mládí krátce ochlupené. Listy vyrůstají ve zdánlivých 5 - 8mičetných přeslenech, jsou kopinaté, špičaté, řídce pilovité, dlouhé 3,5 - 5cm, široké 0,9 - 1,4cm, báze klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 11 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 4mm. Květenství je hroznovité, dlouhé 1,5 - 6cm, listeny jsou úzce 3úhlé, dlouhé 3mm, vlastní květy mají 5 - 9mm stopky, kališní laloky jsou 3úhlé, dlouhé 1mm, koruna je žlutě zelená, baňkovitá a dlouhá 4 - 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. glabritubum - Čína, Bhútán, Sikkim, Nepál; keř (i epifytický); výška 1 - 2m; listy eliptické, špičaté, vroubkované, dlouhé 4 - 9cm, široké 1,5 - 3cm, řapíky dlouhé 1 - 3mm; hrozny 10 - 25tičetné, dlouhé 2,5 - 9cm, vlastní květy mají 0,8 - 1,5cm stopky; koruna zelenobílá, dlouhá 5 - 9mm, široká 3,5mm; plody velikosti 3 - 5mm
- subsp. vacciniaceum/V. serratum/Agapetes serrata/Agapetes vacciniacea/Ceratostema vacciniacea/Epigynium serratum/Gaylussacia serrata/Thibaudia serrata - Čína, Indie, Myanmar; listy na bázi klínovité, řapíky dlouhé 2 - 4mm

Vaccinium vacillans

synonyma: V. torreyanum

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v USA v podobě široce polokulovitého pravidelného hustého keře. Dorůstá výšky do 50cm. Větve jsou v mládí zelené či žlutozelené. Listy jsou mírně lžičkovité, tupé, celokrajné nebo drobně pilovité a dlouhé 1,5 - 3cm. Květenstvím je několikačetný hrozen, koruna je žlutozelená, mírně načervenalá a dlouhá 5 - 7mm. Plodem je kulovitá, modrá a ojíněná bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium varingiaefolium

synonyma: Agapetes varingiaefolia, Agapetes vulgaris, Diplycosia erythrina, Epigynium varingiaefolium, Thibaudia varingiaefolia, V. ellipticum, V. erythrinum, V. obversum, V. schimperi, V. varingiaefolium f. parvifolia, V. varingiaefolium f. sublanceolata, V. varingiaefolium var. angustifolium , V. varingiaefolium var. erythrinum

oblasti: Bali, Jáva, Malajský poloostrov, Sumatra

Roste na Sumatře, Malajském poloostrově, Jávě a Bali v podobě keře o výšce 1 - 5m nebo stromu o výšce 8 (i 20)m s průměrem kmene do 50cm. Větve jsou v mládí narůžovofialovělé a mohou být ochlupené. Listy jsou vejčité až obvejčité, báze může být mírně lopatkovitá nebo zaoblená, v mládí jsou červené, jinak tmavě zelené, dlouhé 1,5 - 6cm, široké 0,5 - 2,5cm, spodní strana je řídce žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 5 - 8 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je úžlabní až terminální hrozen s vřetenem délky 3 - 8,5cm, vlastní květy mají stopky délky 5 - 9mm, koruna je dlouze baňkovitá, bílá, béžová nebo růžová, uvnitř ochlupená, dlouhá 0,7 - 1,1cm a široká 3 - 7mm. Plodem je kulovitá tmavě růžovofialová až černomodrá bobule průměru 8mm, která může být ochlupená. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. orientale/V. lucidum var. orientale/Vaccinium schimperi - Jáva; listy hustší, téměř střechovité, eliptické, dlouhé 1 - 2cm, široké 0,5 - 1cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek; květenství ochlupené kromě koruny květů
- var. varingiaefolium

Vaccinium varingifolium

Vaccinium varingiifolium

synonyma: Agapetes varingiifolia, Diplycosia erythrina, Epigynium varingiifolium, Thibaudia varingiifolia, V. erythrinum, V. varingiaefolium

oblasti: Jáva, Malajsie, Malajský poloostrov, Malé Sundy, Sumatra

Roste na Jávě, Malých Sundách, Malajsii a Sumatře.

Vaccinium veldkampii

Vaccinium venosum

synonyma: Epigynium venosum

oblasti: Ásám, Bhútán, V Himálaj, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, Bhútánu a Indii v podobě stálezeleného epifytického keře. Dorůstá výšky 60cm. Větve mohou být ochlupené. Listy jsou mírně 5 - 6tičetně přeslenité, prakticky přisedlé, dlouze kopinaté, kožovité, holé, zvlněně vroubkované, špičaté, dlouhé 6 - 10cm, široké 2 - 4cm a žilnatinu tvoří 4 - 10 párů žilek. Květenství je hroznovité, bohaté, dlouhé 3,4 - 4cm, vlastní květy mají až 2,5mm stopky, kališní laloky jsou 3úhlé, dlouhé 1mm, koruna je dlouze baňkovitá a dlouhá 4 - 5mm.

Vaccinium versteegii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě bohatě větveného keře, který může být i epifytický nebo šplhavý. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou mírně obvejčité, dužnaté, kožovité, podvinuté, dlouhé 0,7 - 2,3cm, široké 0,6 - 1,1cm, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2mm. Kvete samostatnými úžlabními květy na 1mm stopce, koruna je baňkovitá, tmavě červená až nahnědlá, dlouhá 3,5mm a široká 3mm. Plodem je polokulovitá ochlupená růžově fialově červená bobule průměru 5 - 7mm.

Vaccinium vidalii

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 2,5 - 5 (i 10)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou mírně vejčité, ocasovité, kožovité, dlouhé 2,5 - 4cm, široké 0,8 - 1,5cm, spodní strana řídce žláznatá, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství tvoří 2 - 3 úžlabní řídké 3 - 8mičetné hrozny s 1 - 4cm vřetenem, vlastní květy mají 1 - 1,5cm stopky, korunu baňkovitou, holou, dlouhou 4 - 5mm a širokou do 3,5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 4 - 5mm.

Vaccinium vietnamense
synonyma: V. vietnamensis

oblasti: Thajsko, Vietnam

Roste ve Vietnamu a Thajsku.

Vaccinium villosiflorum
synonyma: V. pilosiflorum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě mnohokmenného keře (i epifytického). Listy jsou husté, tupě ocasovitě špičaté, mírně vejčité, v mládí ochlupené, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 1 - 4cm, široké 0,6 - 2cm, žilnatinu tvoří 1 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3mm. Kvete samostatnými nebo párovitými úžlabními květy (i v terminálním 3 - 4četném hroznu), stopky jsou dlouhé 1 - 3mm, koruna je baňkovitá, červená až růžová, dlouhá 6 - 9mm a široká 3 - 4mm. Plodem je kulovitá světle fialové bobule průměru 6mm.

Vaccinium virgatum (Brusnice prutovitá)
synonyma: Cyanococcus amoenus, Cyanococcus virgatus, V. amoenum, V. corymbosum var. amoenum, V. parviflorum, V. virgatum var. ozarkense, V. virgatum var. speciosum

oblasti: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Louisiana, Mississippi, Severní Karolína, Texas

Roste v USA podobě opadavého řídkého keře. Dorůstá výšky 0,4 - 1 (i 4)m. Větve bývají v mládí ochlupené. Listy jsou obkopinaté až eliptické, špičaté, pilovité, dlouhé 3 - 6cm, na horní straně žláznaté a jsou uspořádány na stoncích ve spirále. Kvete bílými baňkovitě až trubkovitě tvarovanými

květy délky 5mm v hroznu. Plodem je tmavěmodrá bobule průměru 5mm.

Vaccinium viridiflorum (Brusnice zelenokvětá)

oblasti: Nová Guinea, Západní Papua

Roste na Nové Guineji v podobě šplhavého keře až liáně. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, ocasovité, na okraji žláznaté, kožovité, holé, celokrajné, dlouhé 4,5 - 8cm, široké 2 - 4cm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 6 - 8mm. Květenství tvoří 2 - 3 úžlabní vzpřímené hrozny s vřetenem délky 6 - 8cm, vlastní květy mají 5mm stopky, korunu zelenou, dlouhou 9mm a širokou 3mm.

Vaccinium viscifolium

synonyma: V. decorum, V. perakense, V. subobovatum, V. teysmannii, V. viscifolium var. minus

oblasti: Kambodža, Malajsie, Malajský poloostrov, Thajsko, Vietnam

Roste v Thajsku, Kambodži, Vietnamu a Malajském poloostrově v podobě keře (i epifytického) až stromu. Dorůstá výšky do 6m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou mírně obvejčité či lopatkovité, kožovité, tuhé, holé, na spodní straně řídce žláznatě tečkované, celokrajné, mohou být mírně podvinuté, dlouhé 4 - 10cm, široké 2 - 7cm, žilnatinu tvoří 2 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 8mm. Květenství tvoří 2 - 5 úžlabních vzpřímených hustých hroznů s 2 - 11cm vřetenem, vlastní květy jsou převislé, mají 3 - 6mm stopku, korunu tmavě růžovou až bílou, dlouhou 6 - 7mm a širokou 2,5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. bicalcaratum - Malajský poloostrov; listy jsou na vrcholu krátce tupě zúžené
- var. viscifolium

Vaccinium vitis-idaea (Brusinka obecná)

synonyma: Myrtillus exigua, Rhodococcum vitis-idaea, Rhodococcus vitis-idaea, V. buxifolium, V. idaeum, V. jesoense, V. minus, V. nemorosum, V. pulchellum, V. punctatum, V. punctifolium, Vitis-idaea punctata, Vitis-idaea punctifolia, Vitis-idaea vitis-idaea

oblasti: Albánie, Alberta, Aljaška, Anglie, Archangelsk, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Irsko, Island , Itálie, J Rusko, J Sibiř, Jugoslávie, JV Rusko, JV Sibiř, JZ Rusko, JZ Sibiř, Katalánsko, Kavkaz, Kazachstán, Kola, Korea, Labrador, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Michigan, Minnesota, Německo, New Hampshire, Newfoundland, Nizozemí, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Polsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Ruská Kalérie, S Japonsko, S Mongolsko, S Sibiř, Sachalin, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Skotsko, Slovensko, Střední Rusko, Střední Sibiř, SV Čína, SV Evropa, SV Rusko, SV Sibiř, SZ Sibiř, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, V Karpaty, V Rusko, V Sibiř, Vermont, Vnitřní Mongolsko, Wisconsin, Yukon, Z Rusko, Z Sibiř

Vyskytuje se v mírném pásu severní polokoule v podobě stálezelené nízkého občas poléhavého až plazivého keře. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Listy jsou střídavé, husté, kožovité, eliptické až vejčité, bývají vykrojené, zvlněně vroubkované, lesklé, tmavězelené, dlouhé 0,7 - 3cm, široké 0,4 - 1,2cm, žilnatinu tvoří 5 - 6 párů žilek a spodní strana je hnědě tečkovaná. Květenstvím je 1 - 1,5cm hrozen, objevuje se 2 - 8mi ks, listeny jsou opadavé, dlouhé 3mm, kališní laloky jsou široce 3úhlé, dlouhé 1mm, koruna je zvonkovitá, bílá až růžová, dlouhá 5 - 8mm, kalich 4laločný a tyčinek má

8ks. Plodem je červená bobule průměru 0,3 - 0,5 (i 1)cm obsahující vitamín A a C. Využívá se v lékařství. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Albovariegata'
- 'Coralle'/'Koralle' - výška 20 - 30cm; listy obvejčité, lesklé, kožovité, tmavězelené, dlouhé 1,5 - 2,5cm; bohaté květy i plody (průměru 7 - 9mm po 5 - 12ti ks); plodenství bohaté na dlouhém hroznu; dobře odnožuje
- var. genuinum - výška 10 - 25cm; listy mírně obvejčité, dlouhé 1,1 - 2,7cm, široké 0,6 - 1,2cm, řapíky dlouhé 1,5 - 3mm; květenstvím je 4 - 8mičetný hrozen, vlastní květy mají světle růžovou korunu délky 4,5 - 6,5mm
- 'Ida' - výška 10 - 20cm; řidší vzpřímený keř; listy velké; plodenství středně bohaté, červené, v krátkém hroznu
- 'Leucocarpum' - plody špinavě bílé barvy
- 'Linnea' - výška 20 - 25cm; lisy lesklé, velké; plodenství v hustých hroznech, tmavě červené, odolné
- var. majus - listy dlouhé až 4cm; květy větší
- 'Masovia' - výška 10 - 15cm; velké množství velkých plodů
- var. minus/subsp. minus/var. punctatum/'Nana' - sever Severní Ameriky; husté koberce; výška 5 - 15cm; listy dlouhé 0,4 - 0,8 (i 1,5)cm; hrozny 2 - 5tičetné, koruna růžová až červená; plody průměru 5 - 8mm; pomalejší růst
- var. pumilum/var. microphyllum - výška 2,5 - 7cm; listy drobné, téměř kulaté, řapíky dlouhé do 1,5mm; hrozny 1 - 4četné, koruna růžová až červená, dlouhá 4 - 5mm
- 'Red Pearl' - výška do 35cm; listy lesklé, tmavězelené; plodenství méně bohaté, ale velké, tmavěji červené, sklizeň 2x/rok; dobře a rychle se rozrůstá
- 'Runo Bielawskie' - kompaktní vzpřímený keř; výška 25 - 30cm; listy lesklé, tmavě zelené, drobně jemně zoubkované; plody tmavě červené, průměru 0,6 - 1,2cm, seskupené do hroznů; sklizeň 2x/rok; dobře odnožuje
- 'Sanna' - výška 20 - 30cm; listy kulaté; plody bohaté, tmavě červené, hrozen hustý, větší, odolné na zahnívání
- 'Sussi' - výška 15 - 25cm; vzpřímený keř; listy zaoblené, lesklé, zelené; plody velké, bohatší, seskupené do hroznů, sklizeň 2x/rok
- 'Variegata' - listy s béžově bílými okraji
- var. vitis-idaea - listy dlouhé 1 - 2,5cm, široké 6 - 5mm, žilky na spodní straně vyniklé; hrozny 3 - 8 (i 15)tičetné, koruna bílá nebo narůžovělá; plody průměru 0,8 - 1cm

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín a kyselá písčitá sušší půda chudší na živiny. Roste ve smíšených nebo jehličnatých světlejších lesích, vřesovištích, křovinách. Odolává až -40°C mrazům.

Vaccinium vomicum

Vaccinium vonroemeri

oblasti: Nová Guinea, Západní Papua

Roste na Nové Guineji v podobě keře, který může být i epifytem. Dorůstá výšky 0,5 - 1m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou husté, obvejčité, kožovité, v mládí řídce ochlupené, celokrajné, podvinuté, dlouhé 1 - 2cm, široké 0,7 - 1,3cm, spodní strana řídce tmavě tečkovaná, žilnatinu tvoří 1 - 2 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2mm. Kvete samostatnými úžlabními květy, stopky jsou dlouhé 0,5 - 1cm, koruna je baňkovitá, uvnitř ochlupená, červená až růžová, dlouhá 6 - 7mm a široká do 3mm.

Vaccinium vulcanorum

Vaccinium warburgii

oblasti: Sulawesi (Celebes)

Roste na Sulawesi v podobě keře nebo stromu. Listy jsou vejčité, ocasovité, prakticky kožovité, dlouhé 5 - 8cm, široké 3 - 4,5cm, báze je zaoblená, žilnatinu tvoří 5 - 7 žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Květenstvím je úžlabní 4 - 7cm dlouhý prakticky jednostranný hrozen, vlastní květy mají stopky délky 4 - 7mm, koruna je dlouze baňkovitá, dlouhá 7mm a široká 2mm. Plodem je modře černá kulovitá bobule.

Vaccinium whiteanum

oblasti: Melanésie, Tichý oceán

Roste na Šalamounových ostrovech, Fidži a Vanuatu v podobě epifytického či šplhavého keře. Větve jsou na konci hranaté a ochlupené. Listy jsou husté, eliptické, oboustranně zaoblené, prakticky kožovité, v mládí růžové, celokrajné, dlouhé 1,1 - 1,8cm, široké 4 - 8mm, žilnatinu tvoří 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1mm. Kvete samostatnými úžlabními květy s 2 - 3mi listenci, stopky jsou dlouhé 1cm, koruna je baňkovitá, červená, dlouhá 6 - 7mm a široká 3 - 4mm.

Vaccinium whitfordii

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře (i epifytického) nebo stromu. Dorůstá výšky 0,7 - 5m. Větve jsou v mládí ochlupené a hranaté. Listy jsou husté, mírně obvejčité, kožovité, holé, na okraji vroubkované, dlouhé 0,9 - 1,8cm, široké 4 - 8mm a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Kvete samostatnými úžlabními prakticky přisedlými květy, koruna je dlouze baňkovitá, červená, dlouhá 6 - 8mm a široká 2 - 4mm. Plodem je široce vejčitá, růžově fialová až prakticky černá bobule o průměru 5mm.

Vaccinium whitmeei

synonyma: V. antipodum

oblasti: Tichý oceán

Roste na ostrově Samoa.

Vaccinium whitmorei

oblasti: Malajsie, Malajský poloostrov

Roste v Malajsii.

Vaccinium wilburii

oblasti: Guerrero

Roste v Mexiku v podobě epifytického keře. Dorůstá délky do 2m. Vytváří hlízovité kořeny o průměru do 20cm. Listy jsou kopinaté, vroubkované, zašpičatělé až špičaté, dlouhé 0,5 - 4,4cm, široké 0,5 - 1,3cm, báze je špičatá a řapíky jsou dlouhé 1 - 5mm. Květenstvím je (4 -) 7 - 10 (i 14)tikvětý hrozen délky 2,5 - 3,5cm, listeny jsou dlouhé 1 - 2mm, široké 0,75 - 1mm, vlastní květy mají 1 - 1,4cm stopku, jsou 5tičetné, kalich je dlouhý 1,5mm, laloky 3úhlé, vzpřímené, dlouhé 1,5mm, široké 1mm, koruna je válcovitě urnovitá, růžová, dlouhá 0,9 - 1,1cm, laloky vzpřímené, zakulacené, dlouhé i široké 1,5mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium wisselianum

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2,5m. Větve jsou v mládí žlutě plstnaté. Listy jsou prakticky střechovité, vejčité, špičaté, kožovité, v mládí ochlupené, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 2 - 3cm, široké 1,5 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2mm. Květenstvím je terminální hrozen s vřetenem délky 4 - 6cm, vlastní květy mají 3 - 5mm stopky, korunu dlouze baňkovitou, tmavě červenou až růžově fialovou, dlouhou do 1cm a širokou 2,5mm. Plodem je kulovitá ochlupená černá bobule průměru 5mm.

Vaccinium wollastonii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě keře. Větve jsou v mládí jemně ochlupené. Listy jsou husté, kopinaté, špičaté, kožovité, pilovité, dlouhé 5 - 7mm, široké 2 - 4mm, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5mm. Kvete úžlabními samostatnými převislými květy na 5 - 6mm stopce, koruna je baňkovitá, uvnitř řídce ochlupená, červená, dlouhá 5 - 6mm a široká 3 - 4mm.

Vaccinium wondiwoiense

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v podobě epifytického keře. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké, eliptické, tupě zúžené, kožovité, holé, celokrajné, mírně podvinuté, dlouhé 2,5 - 3cm, široké 0,8 - 1cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5mm. Kvete samostatnými úžlabními květy na prakticky chybějící stopce, koruna je baňkovitá, červená, dlouhá 5 - 6mm a široká 3mm.

Vaccinium woodianum

synonyma: V. banksii

oblasti: Filipíny

Roste na Filipínách v podobě keře. Dorůstá výšky 1m. Větve jsou v mládí hranaté. Listy jsou eliptické, kožovité, podvinuté, dlouhé 2 - 3,5cm, široké 1 - 1,5cm, spodní strana je žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Květenství tvoří 1 - 2 úžlabní

řídce 3 - 5tičetné hrozny, vřeteno má délku 1 - 2cm, vlastní květy mají 7mm stopky, korunu baňkovitou, červenou, holou, dlouhou 5mm a širokou 2,5mm.

Vaccinium wrightii

synonyma: V. bracteatum var. wrightii, V. wrightii var. wrightii

oblasti: J Japonsko, JV Čína, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu a v Japonsku v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 5m. Větve mohou být řídce ochlupené. Listy jsou řídké, pilovité, špičaté, mírně vejčité, kožovité, dlouhé 1,5 - 5cm, široké 1 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek, báze klínovitá až prakticky okrouhlá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2mm. Květenství je prakticky terminální, hroznovité, dlouhé 7cm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopky, kališní laloky jsou 3úhlé, koruna baňkovitá až trubkovitá a dlouhá 5 - 7mm. Plodem je kulovitá bobule průměru 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. formosanum/V. bracteatum var. formosanum/V. formosanum - Tchaj-wan; malý keř; listy eliptické, dlouhé 1,5 - 2cm, široké 1 - 1,5cm
- var. wrightii/V. bracteatum var. wrightii - Tchaj-wan, Japonsko; nízké stromy; listy eliptické, dlouhé 3 - 5cm, široké 1,5 - 2,5cm

Vaccinium x atlanticum (Brusnice atlantská)

oblasti: Massachusetts, New York

Roste v USA. Kříženec V. angustifolium a V. corymbosum. Výška 1m. Listy eliptické až mírně kopinaté, drobně pilovité, brvité, dlouhé 3 - 5cm, na spodní straně obvykle na centrálním žebru ochlupené. Kvete baňkovitými květy. Plodem je modrá ojíněná bobule.

Vaccinium x brunoense

oblasti: Kalifornie

Roste v USA.

Vaccinium x carolinianum

oblasti: Severní Karolína, Virginie

Vaccinium x dobbinii

oblasti: New York

Vaccinium x hybridum

synonyma: Rhodococcum x hybridum

Vaccinium x intermedium (Brusnice prostřední)

synonyma: XRhodocinium intermedium

oblasti: Česká republika, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie

Kříženec V. myrtillus a V. vitis-idaea. Roste v severní Evropě v podobě stálezeleného (někdy pouze v zimě zeleného) přízemního rozložitého nepravidelného řidšího keře. Dorůstá výšky do 30cm. Větve jsou mírně hranaté a v mládí ochlupené. Listy jsou mírně obvejčité, oboustranně špičaté, drobně zoubkované, zelené, dlouhé 1,5 - 2,5cm a spodní strana je světlejší. Kvete samostatnými květy nebo v několikačetných skupinách či vrcholových hroznech, koruna je kulovitě zvonkovitá a růžová. Plodem je kulovitá tmavě fialová bobule průměru 6mm.

Vaccinium x margarettiae

oblasti: Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Virginie

Vaccinium x marianum

oblasti: Jižní Karolína, Maryland, New York, Severní Karolína, Virginie

Vaccinium x nubigenum

oblasti: Newfoundland, Quebec

Vaccinium xerampelinum

oblasti: Nová Guinea, Západní Papua

Roste na Nové Guineji v podobě stromu či keře. Dorůstá výšky 3 - 4m. Větve jsou v mládí tupě hranaté. Listy jsou řídké, eliptické, celokrajné, kožovité, mohou být mírně podvinuté, dlouhé 3 - 5,5cm, široké 1,5 - 2,5cm, spodní strana žláznatě tečkovaná, žilnatinu tvoří 2 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní vzpřímené bohaté prakticky jednostranné hrozny, vřeteno je dlouhé 3 - 8cm, vlastní květy mají 0,5 - 1cm stopky, koruna je dlouze baňkovitá, růžově fialová, ojíněná, dlouhá 1,2cm a široká 6 - 8mm.

Vaccinium yakushimense

oblasti: Japonsko

Roste v Japonsku.

Vaccinium yaoshanicum

synonyma: V. yaoshanicum var. megaphyllum, V. yaoshanicum var. yaoshanicum

oblasti: Guangdong, Guangxi

Roste v Číně v podobě stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 13m. Listy jsou řídké,

mírně vejčité až kopinaté, mírně kožovité, řídce žláznatě zubaté, špičaté, dlouhé 9 - 18cm, široké 2 - 9cm, žilnatinu tvoří 7 párů žilek, báze je klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství je úžlabní, hroznovité, dlouhé 2 - 10cm, bohaté, listeny dlouhé 3mm, vlastní květy mají 3 - 6mm stopky, kališní laloky dlouhé 1mm, koruna bílá, zvonkovitá a dlouhá 4mm. Plodem je tmavě růžově fialová kulovitá bobule průměru 5mm.

Vaccinium yatabei

oblasti: Japonsko, Sachalin

Roste v Japonsku, Sachalinu a Kurilských ostrovech.

Vaccinium youngii

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě keře. Dorůstá délky do 2m. Listy jsou střídavé, vejčité až eliptické, dlouhé 1 - 2,5cm, široké 0,4 - 1cm, báze je kulatá až uťatá a řapíky jsou dlouhé 1,1 - 2,7 (i 3,4)mm. Květenství je 2květé, listeny vejčité až eliptické, zašpičatělé, dlouhé 0,8 - 1,5mm, široké 0,6 - 1,3mm, vlastní květy jsou přisedlé, 5 - 7mičetné, kalich zvonkovitý, dlouhý 3,8mm, široký 3mm, trubka dlouhá 2 - 2,8mm, lem široký 1,5 - 1,9m, laloky 3úhlé, špičaté, dlouhé 1,3 - 1,5mm a široké 0,3 - 1,5mm, koruna je světle zelená, dlouhá 2,7 - 3,2mm, průměru 2,7 - 3mm, laloky vejčité, špičaté, dlouhé 1,7 - 2,1mm a široké 1,8 - 2,7mm. Plodem je kulovitá tmavě růžově fialová bobule průměru 5,5 - 7,5mm a obsahuje mnoho semen.

Vaccinium zhangzhouense

oblasti: JV Čína

Roste v Číně.

Vaccinium zollingeri

Vaccinium × brunoense

Vaccinium × intermedium
synonyma: Rhodocinium intermedium, Vitis-idaea kablikiana

Další informace:
http://botanika.wendys.cz/kytky/K458.php
http://botany.cz/cs/vaccinium-vitis-idaea/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brusnice_%28rod%29
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=71
http://www.ceskestavby.cz/rostliny/boruvka/

https://www.rostliny.net/