

Parthenocissus (Loubinec)

čeleď: Vitaceae

Velmi dekorativní pnoucí rostlina pocházející ze Severní Ameriky a východní Asie. Na jaře a v létě zkrášluje zdi a pergoly zelenými rozstřapenými listy, které na podzim přechází do zářivé červené. K podkladu se zachycuje přísavnými destičkami na větvených úponcích. Na zimu listy opadávají. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, dlanitě laločnaté, jednoduché nebo 3četné a lístky jsou hrubě zubaté. Kvete oboupohlavními květy ve vrcholcích či latách, kalich je drobný, korunních lístků je 5 (i 4), tyčinek 5 a semeníky jsou 2pouzdré se 2mi vajíčky. Plodem je 1 - 4semenná nejedlá bobule barvy tmavěmodré až načernalé. Semena jsou obvejčitá.

Je vhodné pěstovat na slunci, ale roste i ve stínu. Tam ale neroste tak rychle. Pokud potřebujete zachovat tvar, není problém rostlinu dle potřeby sestřihávat. Vyrovnává se s tím velice dobře.

Množí se dřevitými nebo i zelenými řízků nebo hřížením.

Parthenocissus chinensis (Přísavník čínský)

oblasti: Sichuan

Roste v Číně v podobě dřevité liány. Větvě jsou kulaté a holé, úponky mívají 5 větví. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé 1 - 4cm, vlastní lístky jsou krátce řapíčkaté až přisedlé, holé, centrální obvejčitě eliptické, zašpičatělé, dlouhé 2,5 - 5cm, široké 1,5- 3cm, báze klínovitá, okraj má 3 - 5 tupých zubů, postranní lístky vejčitě eliptické, zašpičatělé, dlouhé 1,5 - 4cm, široké 1,2 - 2,5cm, téměř kulaté, okraj má 3 - 7 tupých zubů, báze asymetrická, téměř kulatá a žilnatinu tvoří 3 - 5 párů žilek. Květenství je dlouhé 1 - 2cm, stopky má holé, dlouhé 2 - 7mm, poupata vejčitě eliptická, holá, kalich celokrajný, korunní lístky vejčitě eliptické, velké 1mm a semeníky jsou vejčitě kuželovité. Plody mají v průměru 6mm a obsahují jediné obvejčité semeno.

Parthenocissus cuspidifera

oblasti: Thajsko, Vietnam, Yunnan

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. pubifolia - Čína, Thajsko, Vietnam; dřevnatá liána; větve kulaté a holé; listy 3četné, řapíky dlouhé 2,5 - 11cm, řapíčky dlouhé 0,5 - 2,5cm, centrální lístek obvejčitě eliptický, špičatý, dlouhý 11 - 11,5cm, široký 6,5 - 7,5cm, báze klínovitá, okraj má 16 - 19 párů zubů, postranní lístky eliptické, báze mírně srdčitá, asymetrická, žilnatinu tvoří 6 - 11 párů žilek na spodní straně ochlupených; květenství má 3 - 4,5cm holé stopky; plody obvejčité, zaoblené, dlouhé 5 - 6mm, široké 4 - 5mm, obsahuje 2 - 3 obvejčitě eliptická semena

Parthenocissus dalzielii

synonyma: Landukia landuk, P. landuk, Vitis landuk

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě dřevnaté liány. Větvě jsou kulaté, holé a úponky mají 5 - 8 ramen.

Listy jsou 2jího typu, bývají 3četné nebo jednoduché, jednoduché oválné, dlouhé 3 - 7cm, špičaté, široké 2 - 5cm, báze srdčitá, okraj má 4 - 5 párů zoubků, u 3četných je centrální podlouhlý, dlouhý 6 - 21cm, široký 3 - 8cm, báze klínovitá, okraj má 3 - 8 párů zoubků, konec zašpičatělý, postranní lístky přisedlé, vejčitě eliptické, dlouhé 5,5 - 19cm, široké 3 - 7,5cm, zašpičatělé, báze asymetrická, téměř kulatá, okraj má 5 - 8 zoubků, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry žilek, řapíky jsou dlouhé 5 - 20cm a středový řapíček je dlouhý 0,3 - 1cm. Květenství je dlouhé 3 - 12cm, stopky jsou dlouhé do 3cm, listence vejčité, dlouhé 1,5 - 2mm, široké 1 - 2mm, květy mají 1 - 2mm stopky a semeníky jsou kulovité, Plody mají průměr 0,8 - 1cm, jsou černorůžovofialové a obsahují max. 4 obvejčitá semena.

Parthenocissus feddei

synonyma: Vitis feddei

oblasti: Guangdong, Guizhou, Hubei, Hunan

Roste v Číně v podobě dřevnaté liány. Větve jsou kulaté a úponky mají 6 - 11 větví. Listy jsou 3četné (i jednoduché), řapíky jsou dlouhé 7,5 - 15cm, zatímco řapíčky pouze 0,5 - 2,5cm, centrální lístek je obvejčitě eliptický, dlouhý 6 - 17cm, široký 3 - 7cm, báze zaoblená, okraj má 6 - 9 párů tupých zubů, postranní lístky jsou zašpičatělé, vejčitě eliptické, báze asymetrická, okraj má 11 - 15 tupých zubů na vnější straně a 5 - 7 uvnitř a žilnatinu tvoří 6 - 7 párů žilek. Květenství má 2 - 3cm stopky, stopky květů jsou dlouhé 2 - 3mm, poupata mají délku 2,5 - 3mm, korunní lístky jsou eliptické, holé, dlouhé 2,3 - 2,8mm a semeníky jsou vejčité. Plodem je kulovitá bobule o průměru 0,8 - 1cm obsahující 1 - 2 obvejčitě eliptická semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. feddei - Guangdong, Guizhou, Hubei, Hunan - povrch holý nebo téměř holý
- var. pubescens - Hubei, Hunan - větve a listy na spodní straně hustě rezavě ochlupené

Parthenocissus henryana (Přísavník Henryův)

synonyma: Ampelopsis henryana, Cissus henryana, P. henryi, P. multiflora, Psedera henryana, Vitis henryana, Vitis henryi, Vitis thomsonii

oblasti: Střední Čína

Roste ve střední Číně v podobě opadavého pnoucího keře. Dorůstá výšky až 5m. Větve jsou hranaté a úponky mají 4 - 7 ramen. Listy jsou dlanité, 3 - 5tičetné, řapíky dlouhé 2,5 - 8cm, řapíčky jsou dlouhé pouze 0,3 - 1,5cm, lístky jsou obvejčitě až vejčité, dlouhé 3 - 12cm, široké 1,5 - 5,5cm, špičaté nebo tupé, matné, zelené, při rašení červené, na okraji má 2 - 6 zubů, žilnatinu tvoří 3 - 7 párů žilek, žilnatina bílá, na spodní straně červená a mírně ochlupená, konec zubatý a podzimní barva je červená. Kvete v tenkých latnatých květenstvích s délkou 2 - 15cm, stopky jsou dlouhé 1,5 - 9cm, květy mají eliptická nebo kulovitá poupata, korunní lístky eliptické délky 0,8 - 2mm, stopky dlouhé 0,5 - 2mm a semeníky jsou vejčitě eliptické. Plodem je tmavěmodrá bobule průměru 0,8 - 1cm obsahující 1 - 3 obvejčitá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. henryana/Vitis henryana - větve holé; listy mohou být řídce ochlupené
- var. hirsuta - listy na spodní straně ochlupené

Parthenocissus heptaphylla

synonyma: Ampelopsis heptaphylla, Psedera heptaphylla, Vitis heptaphylla

oblasti: Texas

Roste na jihu USA v podobě opadavého popínavého keře. Dorůstá délky až 9m. Větve jsou červenohnědé, mírně hranaté až oblé a úponky jsou dlouhé. Listy bývají 7mičetné, lístky dlouze obvejčité, dlouhé 3 - 6cm, hrubě pilovité, tmavězelené, na spodní straně bledší a báze je klínovitá. Kvete v řídkých 3 - 7cm širokých zelenavých vrcholících. Plodem je kulovitá modročerná bobule o průměru 0,8 - 1,2cm.

Parthenocissus heterophylla

oblasti: Čína

Roste v Číně. Listy jsou dlouze řapíkaté, zpeřené, tvořené (1 - 2 -) 3mi páry lístků, jsou dlouhé 6 - 25cm, vroubkovaně pilovité, střední jsou podlouhlé, řapíčkaté, holé nebo na spodní straně ochlupené a postranní lístky jsou vejčité podlouhlé.

Parthenocissus himalayana (Přísavník himálajský)

synonyma: Ampelopsis himalayana, Cissus Himalayana, Cissus neilgherrensis, Vitis himalayana

oblasti: Himálaj, Z Čína

Roste v Himálaji v podobě vysokého popínavého keře. Větve jsou holé. Listy jsou 3četné, lístky krátce řapíčkaté, dlouhé 5 - 15cm, centrální lístek je vejčitý, oválný až obvejčitý, postranní jsou asymetricky vejčité, na konci zúžené, tmavězelené, hrubě pilovité, holé, na spodní straně centrální žebro mírně ochlupené, báze kulatá až mírně srdčitá. Květenství je dlouhé 5 - 15cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. rubrifolia/P. sinensis/Vitis rubrifolia - západní Čína; listy menší, širší, v mládí narůžovofialovělé; květenství menší

Parthenocissus hirsuta

Parthenocissus inserta (Loubinec popínavý)

synonyma: Ampelopsis quinquefolia var. vitacea, P. quinquefolia var. vitacea, P. vitacea, Psedera vitacea, Vitis inserta, Vitis vitacea

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Dorůstá délky 1 - 3m.

Parthenocissus laetevirens

synonyma: P. henryana

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě dřevnaté liány. Větve jsou kulaté, podélně rýhované, v mládí ochlupené, později holé a úponky mají 5 - 10 větví. Listy jsou dlanité, 5tičetné, řapíky dlouhé 2 - 6cm, ochlupené, vlastní lístky jsou krátce řapíčkaté až téměř přisedlé, obvejčité až eliptické, z obou stran žlutozelené, dlouhé 2 - 12cm, široké 1 - 5cm, špičaté, báze klínovitá, na okraji mají 5 - 12 zubů, horní strana je puchýrnatá, žilnatinu tvoří 4 - 9 párů žilek, které jsou na spodní straně ochlupené. Květenství je latnaté, dlouhé 6 - 25cm, stopky jsou dlouhé 0,5 - 4cm, je ochlupené, květy mají eliptická poupata velikosti 2 - 3cm, korunní lístky eliptické, velké 1,6 - 2,6mm, stopky dlouhé 2 - 3mm a semeníky jsou kulovité. Plodem je kulovitá tmavěmodrá bobule šířky 6 - 8mm obsahující obvejčitá semena.

Parthenocissus quinquefolia (Loubinec pětिलistý)

synonyma: Ampelocissus cirrhata, Ampelocissus major, Ampelopsis hederacea, Ampelopsis hederacea var. dumetorum, Ampelopsis hederacea var. murorum, Ampelopsis heptaphylla, Ampelopsis himalayana, Ampelopsis hirsuta, Ampelopsis latifolia, Ampelopsis quinquefolia, Ampelopsis quinquefolia var. angustifolia, Ampelopsis quinquefolia var. dumetorum, Ampelopsis quinquefolia var. graebneri, Ampelopsis quinquefolia var. heptaphylla, Ampelopsis quinquefolia var. hirsuta, Ampelopsis quinquefolia var. laciniata, Ampelopsis quinquefolia var. latifolia, Ampelopsis quinquefolia var. murorum, Ampelopsis quinquefolia var. pubescens, Ampelopsis quinquefolia var. radicansissima, Ampelopsis quinquefolia var. spaethii, Ampelopsis radicansissima var. graebneri, Ampelopsis radicansissima var. saint-paulii, Ampelopsis roylei, Ampelopsis saint-paulii, Ampelopsis virginiana, Cissus hederacea, Cissus hirsuta, Cissus quinquefolia, Hedera carnosae, Hedera quinquefolia, P. dumetorum, P. engelmannii, P. heptaphylla, P. quinquefolia f. engelmannii, P. quinquefolia var. murorum, Psedera heptaphylla, Psedera quinquefolia, Psedera quinquefolia var. murorum, Quinaria hederacea, Quinaria quinquefolia, Vitis hederacea, Vitis quinquefolia

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Mexiko, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Severní Americe v podobě opadavé dřevité liány. Dorůstá délky 6 - 12m. Úponky mají 5 - 12 ramen s přísavnými destičkami. Mladé větve i s pupeny jsou načervenalé. Listy jsou dlanité, 3 - 7mičetné nebo zpeřené, vlastní lístky eliptické až obvejčité nebo podlouhlé, zašpičatělé, vroubkované až téměř celokrajné, tmavě zelené, na podzim červené, dlouhé (2,5 -) 3 - 7 (i 15)cm, široké 2 - 4 (i 9)cm, přisedlé či téměř přisedlé, báze klínovitá, spodní strana světle zelená, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek, řapíčky jsou dlouhé 3 - 5mm a řapíky jsou dlouhé (3 -) 5 - 8 (i 14,5cm). Květenstvím je vrcholová lata na 1,5 - 2cm stopce, vlastní 5tičetné květy mají stopku délky 1,5 - 2,5 (i 3)mm, kalich má průměr 2mm, korunní lístky eliptické až kopinaté, dlouhé 1,7 - 2,7 (i 3)mm. Plodem je modrá až modře černá bobule šířky (0,6 -) 1 (i 1,2)cm obsahující 2 - 3 obvejčitá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. engelmannii/'Engelmannii'/P. engelmannii/Ampelopsis engelmannii - východ USA; větve tenké, okrouhlé, holé, úponky mají 4 - 6 (i 7) ramen; řapíky holé, načervenalé, dlouhé do 15cm, lístky dlouhé do 12cm, vejčité, ostře pilovité, tmavězelené, na spodní straně modře ožíněné; květenství dlouhé do 4cm
- var. hirsuta/Ampelopsis graebneri/Ampelopsis hirsuta/Ampelopsis pubescens - východ Severní Ameriky až Mexiko; úponky mají 2 - 3 ramen; větve i listy červené, jemně ochlupené; lístky dlouhé 12 - 18cm, řapíky 1cm, okraj tupě pilovitý
- 'Minor'/Ampelopsis hederacea minor - úponky mají 10 - 12 krátkých ramen; lístky širší, menší, okrouhle vejčité až eliptické, báze zaoblená, řapíky dlouhé 0,5 - 1cm

- var. murorum/var. latifolia/'Murorum'/Ampelopsis hederacea var. murorum/Ampelopsis latifolia/Ampelopsis muralis/Ampelopsis radicansissima/var. murorum - větve holé, okrouhlé, úponky mají 6 - 12 ramen; lístky kratší, širší, více tlusté, vnější lístky na bázi kulaté, na spodní straně v mládí řídce ochlupené; květenství dlouhá i široká 10cm
- var. saint-paulii/P. saint-paulii/Ampelopsis saint-paulii - Iowa až Texas; velký; větve mívají vzdušné kořínky, jsou v mládí ochlupené, úponky mají 8 - 12 dvouřadých ramen; lístky eliptické, dlouhé 12 - 15 (i 20)cm, hluboce ostře pilovité, krátce řapíkaté
- 'Star Showers'/'Monham' - délka 9 - 15m; listy menší, pestré, v mládí zelenobílé až růžové, na podzim zelenočervené; nekvete
- 'Troki' - délka 10 - 20m; listy zelené, na podzim červené; plody modré

Je velmi odolný. Po vysazení roste zejména do výšky. Nemá tak dobré krycí účinky jako L. trojhratý (P. tricuspidata).

Parthenocissus semicordata

synonyma: P. cuspidifera var. pubifolia, P. himalayana, P. himalayana var. rubrifolia, P. himalayana var. vestita, P. semicordata var. rubrifolia, Psedera himalayana, Vitis himalayana, Vitis himalayana var. semicordata, Vitis rubrifolia, Vitis semicordata, Vitis semicordata var. himalayana

oblasti: Guizhou, Hubei, Myanmar (Barma), Pákistán, Shaanxi, Sichuan, Sikkim, Thajsko

Roste v Číně, Indii, Pákistánu, Myanmaru a Thajsku v podobě dřevnaté liány. Větve jsou kulaté, v mládí řídce ochlupené a úponky mají 4 - 6 větví. Palisty jsou kopinaté, přitisklé, opadavé a dlouhé 4mm. Listy jsou 3četné, řapíky dlouhé (3,5 -) 5 - 15cm, řídce ochlupené, lístky téměř přisedlé, centrální obvejčité, ostře špičaté, zubaté, dlouhé 6 - 12 (i 13)cm, široké 3 - 6 (i 7)cm, báze klínovitá, postranní lístky vejčité eliptické, dlouhé 5 - 10cm, široké 3 - 5cm, báze asymetrická, zakulacená, žilnatinu tvoří 4 - 7 párů žilek, které jsou na spodní straně ochlupené. Květenství má 1,5 - 2,5 (i 3,5)cm stopku, vlastní žlutě zelené 5tičetné květy mají délku i šířku 2mm, stopky dlouhé 2 - 3mm, korunní lístky vejčité a dlouhé 2,5mm. Plodem je kulatá bobule průměru (4 -) 6 (i 8)mm a obsahuje 1 - 2 (i 4) obvejčitá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. rubifolia - Guizhou, Hubei, Sichuan a Shaanxi; poupata a listy v mládí růžové
- var. semicordata/Ampelopsis himalayana/P. himalayana/P. himalayana var. vestitus/Psedera himalayana/Vitis himalayana/Vitis semicordata - Čína, Indie, Myanmar, Thajsko, Sikkim; poupata zelenavá

Parthenocissus suberosa

synonyma: P. tricuspidata var. ferruginea

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě dřevnaté liány. Větve jsou kulaté, hnědě ochlupené, u starších exemplářů dokonce křídlaté a úponky mají 5 - 9 ramen. Listy jsou jednoduché, 3laločné (i celistvé), řapíky dlouhé 2 - 9cm, hustě rezavě ochlupené, obvejčité, dlouhé 6 - 20cm, široké 5 - 16cm, laloky 3úhlé, špičaté, báze srdčitá, okraj hrubě zubatý, z obou stran ochlupené (na spodní straně rezavě) a žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek. Květenství je dlouhé 1,5 - 5cm, stopky dlouhé 0,7 - 2,5cm, rezavě ochlupené, květy mají 2mm stopky, poupata obvejčité eliptická, velká 3 - 4mm, korunní lístky eliptické, velké 2,7 - 3,7mm a semeníky jsou eliptické. Plodem je kulatá bobule průměru 0,8 - 1,1cm obsahující 1 - 2 obvejčitá semena.

Parthenocissus thomsonii (Přísavník Thomsonův)

synonyma: *Ampelopsis thomsoni*, *Cayratia thomsonii*, *Cissus thomsonii*, *P. henryi* var. *glaucescens*, *Vitis thomsonii*

oblasti: Himálaj, Střední Čína

Roste v Himálaji a Číně. Větve jsou načervenalé, jemně ochlupené, hranaté a úponky mají 3 - 5 ramen. Listy jsou 5tičetné, v mládí červené, eliptické až vejčité, špičaté, dlouhé 2,5 - 11cm, na konci ostře zubaté, na horní straně matné, načervenalé, na spodní straně holé, centrální žebro mírně ochlupené, podzimní barva červená. Kvete na dlouhých stopkatých vrcholících. Plodem je černá bobule.

Parthenocissus tricuspidata (Loubinec trojlaločný)

synonyma: *Acer nikoense*, *Ampelopsis haponica*, *Ampelopsis minima*, *Ampelopsis tricuspidata*, *Ampelopsis veitchii*, *Cissus thunbergii*, *Cissus tricuspidata*, *Crula nikoense*, *Crula nikoensis*, *Negundo nikoense*, *P. thunbergii*, *Psedera thunbergii*, *Psedera tricuspidata*, *Vitis inconstans*, *Vitis taquetii*, *Vitis tricuspidata*

oblasti: Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Japonsko, Jižní Karolína, Kentucky, Korea, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Ontario, Pákistán, Pennsylvania, Severní Karolína, Tchaj-wan

Roste v Japonsku, Číně, Koreji a Dálného východě v podobě popínavé dřevité liány. Dorůstá délky až 20m. Větve jsou kulaté, téměř holé, úponky krátké, bohatě větvené. Listy jsou střechovité, obrysem kulaté až vejčité, 3laločné, oboustranně lesklé, zelené, na podzim červené, dlouhé 5 - 6cm, široké 10 - 20cm, báze srdčitá, spodní strana na žilkách ochlupená, žilnatinu tvoří 5 žilek, řapíky dlouhé 4 - 12cm a laloky jsou špičaté hrubě pilovité. Kvete ve vrcholících kratších listů na stopce délky 1 - 3,5cm, vlastní květy jsou 5tičetné, mají 2 - 3mm stopku a korunní lístky eliptické. Plodem je modře černá ojněná bobule šířky (0,6 -) 0,8 - 1,2cm obsahující 1 - 2 (i 3) obvejčitá či hruškovitá semena délky 6 - 8mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Atropurpurea' - listy bývají jednoduché, velké, na horní straně modře zelené, narůžověle fialové, na podzim červené, mezi žilkami nafouklé; rychlý růst a často se zvrhává do původního druhu
- 'Aurata' - listy, žlutozelené, mírně zeleně mramorované a na okraji červené a drsné
- 'Beverly Brook' - listy velké do 10cm, v mládí bronzové, na podzim tmavě červené
- 'Beverly Park Form' - listy malé
- 'Fenway Park' - v 10ti letech délka 3m; listy žluté
- 'Gloire de Boskoop' - celoročně červenohnědé listy
- 'Green Showers' - listy větší a tmavší
- 'Green Spring'/'Printemps Vert'/*Ampelopsis veitchii* - výška 10m; větve v mládí načervenalé; listy jednoduché, dlouhé do 25cm, hladké, zelené, lesklé, na spodní straně matné, jemně síťnaté, v mládí načervenalé
- 'Lowii'/var. *lowii*/*Ampelopsis lowii* - výška 8m; listy dlouhé 2 - 3cm, jednoduché až 3četné, širší než delší, zastříhovaně pilovité, zelené, rašící červené, podzimní barva také červená
- 'Minutifolia' - výška 8m; listy o něco větší než 'Lowii', zelené, řapíky dlouhé 7 - 15cm, u starších exemplárů lesklé, na podzim růžovofialové a červené
- 'Purpurea'/var. *purpurea* - větve červené; listy červené, nezelenají, na podzim brzy zbarvené
- 'Robusta' - listy široce 3laločné, široké 10 - 20cm, dlouze řapíkaté, lesklé, na podzim červené a oranžové; rychlý růst
- 'Veitchii'/var. *veitchii*/*P. veitchii*/*Ampelopsis veitchii*/*Vitis veitchii* - výška 10m; mladé listy červené, menší, vejčité, max. 3četné, lístky na vnějším okraji s 1 - 3mi zuby, vnitřní strana celokrajná

Parthenocissus vicaryana

synonyma: *Vitis vicaryana*

Parthenocissus vitacea (Přísavník révovitý)

synonyma: *Ampelopsis inserta*, *Ampelopsis quinquefolia* var. *vitacea*, *Cissus quinquefolia*, *P. dumetorum*, *P. inserens*, *P. inserta*, *P. laciniata*, *P. quinquefolia*, *P. quinquefolia* var. *vitacea*, *P. spaethii*, *Psedera vitacea*, *Quinaria quinquefolia*, *Vitis inserta*, *Vitis vitacea*

oblasti: Arizona, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Dakota, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste v Severní Americe v podobě popínavého keře. Borka je žlutošedá. Větve jsou zelené, zakulacené a úponky mají 3 - 5 ramen bez terčíků. Listy jsou 5 (i 3)tičetné, lístky eliptické až kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 5 - 13cm, hrubě ostře pilovité, báze klínovitá, horní strana tmavězelená, lesklá, spodní bledší, lesklá, holá, řapíčky dlouhé 0,8 - 1,2cm a podzimní barva je červená. Květenství má 3 - 7cm stopky. Plodem je modročerná silně ožíněná bobule šířky 6 - 8mm obsahující obvykle 3 - 4 šedohnědá široce srdčitá semena. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *dubia*/*P. hirsute* - větve hustě drsně až štětinatě ochlupené; řapíky štětinaté, lístky široké 5 - 8cm, hruběji pilovité, z obou stran tmavěji zelené, matnější, na spodní straně na žilkách drsně ochlupené; květenství hustší a také drsně ochlupené
- var. *laciniata* - lístky menší, žlutozelené, hlouběji zastříhovaně pilovité
- 'Macrophylla' - v mládí řídce drsně ochlupené; lístky větší, eliptické, dlouhé až 18cm a široké do 10cm

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=44>

<http://www.garten.cz/e/cz/569-parthenocissus-quinquefolia-prisavnik-petilisty-psi-vino/>

http://www.zahradyzelen.cz/ZaZ_pages/tipy.htm

<https://www.rostliny.net/>