Vaccinium angustifolium (Brusnice úzkolistá)

synonyma: Cyanococcus angustifolius, Cyanococcus angustifolius var. laevifolius, Cyanococcus pensylvanicus, V. f. angustifolium, V. f. chiococcum, V. f. leucocarpum, V. f. nigrum, V. var. angustifolium, V. var. hypolasium, V. var. laevifolium, V. var. nigrum, Vaccinium brittonii, Vaccinium humile, Vaccinium lamarckii, Vaccinium minutiflorum, Vaccinium multiflorum, Vaccinium nigrum, Vaccinium pensylvanicum, Vaccinium pensylvanicum var. angustifolium, Vaccinium ramulosum

čeleď: Ericaceae
oblasti: Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Roste v Kanadě a USA v podobě opadavého keře. Dorůstá výšky (10 -) 35 - 50 (i 60)cm. Větve jsou mírně ochlupené. Listy jsou kopinaté, pilovité, modře zelené, lesklé, zelené a na podzim fialové, dlouhé 1,5 - 4,1cm, široké (0,5 -) 0,6 - 1,6 (i 2)cm. Kvete bílými květy zvonkovitého tvaru o průměru 5mm a délce 6 - 7mm v hustých svazcích. Plodem je sladká tmavě modrá kulovitá ojíněná bobule průměru 0,6 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Top Hat' - výška 30 - 50cm, šířka 90cm; listy na podzim červené; květy bílé, bohaté; plody bleděmodré
- var. laevifolium/V. pensylvanicum - výška 50 - 60cm; listy dlouze eliptické, dlouhé 1,5 - 3,5cm; květy bílé, mírně trubkovité, dlouhé 6mm; plody bleděmodré průměru 1 - 1,2cm

Roste v lesích s dobře propustnou půdou s kyselým pH. Je odolná vůči požárům.

https://www.rostliny.net/